



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

3 2044 106 420 409

P467m

Sectio 3, copy 2

Harvard University



**FARLOW
REFERENCE LIBRARY
OF
CRYPTOGAMIC BOTANY**

MONOGRAPHIA AGARI- CORUM,

**COMPREHENDENS ENUMERATIONEM
OMNIUM SPECIERUM HUC USQUE
COGNITARUM.**

LABORATA

C. H. P E R S O O N.

CUM TABULIS VIII COLORATIS.

**ERLANGAE
IN LIBRARIA PALMII
MDCCLXXVIII.**

MYCOLOGIA EUROPaea

SEU

COMPLETA OMNIUM FUNGORUM IN
VARIIS EUROPAEAE REGIONIBUS DE-
TECTORUM ENUMERATIO,

METHODO NATURALI DISPOSITA;

DESCRIPTIONE SUCCINCTA, SYNONYMIA
SELECTA ET OBSERVATIONIBUS
CRITICIS ADDITIS.

ELABORATA

A

C. H. P E R S O O N.

SECTIO TERTIA.

PARTICULA PRIMA.

CUM TABULIS VIII COLORATIS.

Præfatio ad eam

ERLANGAE
IN LIBRARIA PALMIL.
clio ccxxviii.

P 467 m. Cop. 2
Est. of Dr. Edwin C. Estate
1948, Nov. 28, 1948.

Errata corrigenda.

- Pag. 17. lin. 10. leg. *coccodes*.
— 19. — 19. — *languescente*.
— 28. — 12. — *scobiæna*.
— 24. — 18. — *tubulam*.
— 51. — 16. — *Ascalo*.
— 54. — 29. — *plena*.
— 63. — 15. — *Rhymoxis*.
— 64. — 4. loco sequente leg. antecedente.
— 71. — 10. leg. *melizeus*.
— 73. — 27. — *orta*.
— 81. — 24. ante *parilis* add. 125. b.
— 83. — 25. leg. *connati*.
— 84. — 9. loc. antecedente leg. *streptopo*.
— 86. — 14. leg. ob loc. ab.
— 96. — 3. ante *Marzuola* add. *
— 102. — 12. leg. *opacus*.
— 107. del. numerum 170, ab 162 non diversum.
— 107. lin. 2. ab infer. leg. *rivulosus*.
— 122. — 4. ab infer. leg. *epirhizas*.
— 125. — 2. leg. *raris*.
— 135. — 26. — *picta*.
— 136. — 23. — *putillas*.
— 138. — 9. — *subumbonato*.
— 145. — 4. — *Pseudomouceron*.
— 157. — 1. — *subadnexis*.
— 174. — 2. loc. *prateo*, leg. *protoe*.
— 176. — 4. leg. *dignas*.
— 219. — 22. ante *Stilbopus* add. *
— 235. et 237. lin. 6, leg. *connexae*.
— 252. lin. 6. leg. *argenteo*, *caesio*.
— 255. — 8. loco *Meudon* leg. *Boulogne*
-

¶¶¶ AEGRICINI (*Phyllodermei*) divisionem, hoc in ordine, omnium maximam, quoad specierum (non generum) numerum, sistentes, distinguuntur laminis complanatis (*lamellis*), ex centro aut e latere pilei (tunc dimidiati), radiatim divergentibus. Lamellae plerumque simplices, alternatimque maiores sunt, brevioribus semper in ambitu pilei incipientibus; in paucis, praesertim coriaceis, dichotomae, aut reticulatim connexae: intersticiis (*sinulis*) tamen elongatis, dissepimentoque crassiore a veris tubis vel poris diversis. In sat pluribus speciebus sub fungi maturitatem colorem (e rubello ad fuscum) commutant, et in aliquibus totae diffluunt; talem mutationem a sporulis esse ortam, constat.

Pileus hac in tribu ut plurimum carnosus, aut membranaceus est, rarius coriaceus, insuper integer horizontalis, vix unquam resupinato-effusus, (paucis speciebus fodinalibus aut subterraneis exceptis). *Stipes* plerumque centralis, rarius excentricus vel marginalis; in plurimis denudatus, in aliis *annulo* vel *cortina* cinctus, in quibusdam basi *volva* inclusus, et nonnullae (*Amanitae*) volvam et annulum simul habent.

Hi fungi plerumque terrestres et autumnales sunt, magnitudine et colore, sed non forma, varii; in sylvis et pratis, etc. vegetant, et brevi quidem gaudent vita, sed indi-

Sectio tertia.

A

viduorum redivivorum abundantia compensanda.

LXXVII. DAEDALEA. *Pileus coriaceus* (dimidiatus vel effusus). *Lamellae adnatae, ramoso - dichotomae, aut reticulatim anastomosantes* (labyrinthiformes).

* *Resupinatae.*

1. *vermicularis*, resupinata carneo-rufescens, sinulis brevibus utrinque attenuatis, margine poriformibus.

Boletus resupinatus. Sowerby Engl. Fung. vol. 3. tab. 424.

Singularis, sed parum dubia species reperta est in Anglia, in horreo quodam apperto ad terram, cui fibris radiciformibus adhaerbat. Magnitudine, ex ione a 4 ad 6 unc. est, latitudine biunciali. Sinuli vermiculiformes flexuosi, vel rimis similes, aspectum particularem offerunt.

2. *lirellosa*, resupinata umbrinogrisea, margine libera, sinulis minutissimis linearibus porisque intermixits. *Tab. XVII. Fig. 2-3.*

Rarissime in ramo exsiccato Populi nigrae detecta. Thelephorae similis ob superficiem inaequalem tuberculisque subglobosis sparsis conspicuam. Sinuli ipsi, primo obtutus adspicti, rimulas mentiuntur, sed organici sunt, et sub lente observati, plures apparent furcati, alii simplices nonnulli poriformes.

3. *Sesia*, suborbicularis glabra tota alba, sinulis angustis flexuosis contextis.

Merulius Sesia, suberosus albus, minime lobatus. *Scop. Fung. subterr. p. 101. t. 18. f. I.*

Species fodinalis „conjugere videtur Agaricos cum Meruliis, in medio enim plicatus est, margine vero lamellas potius, quam venas emittit, simplices et ramosas.“ *Scop.*

4. *serpens*, effusa tenuis confluens ligneo-pallens, margine villoso, sinulis magnis poriformibus inaequalibus. *Fries Syst. p. 340.*

Cresc. in Suecia. Inter corticis Quercum mortui rimas per lineas elongatas seriatas et confluentes serpit, margine tenuis, pubescens. *L. c.*

5. *latissima*, effusa crassa undulata ligneo-pallens, sinulis subrotundis longissimisque flexuosis. *Fries L. c. †*

Ad truncos muscosos Fagi: ab unc. 5 ad 2 pedes lata extensa, margine hinc inde libero. Pori primo nulli, mox ut puncta sparsa superficialia apparent, dein conferti varii. Substantia dura lignea, intus-subzonata. *Fr.*

6. *heteromorpha*, submembranacea sordide lutescens, margine albicante byssino, sinulis irregularibus flexuosis. *Fries L. c.*

Ad truncos pineos, in Suecia. Sequenti forsitan proxima. Sinuli longi, obliqui, sed non plicato-dentati, ut in Meruliis. *Fr.*

** *Dimidiatae*, pileo plerumque horizontali.

7. *ferruginea*, effuso - refléxa coriacea flavo-ferruginea: juniore margineque villoso alba, sinulis difformibus. *Fries l. c. p. 339. Schum. Flor. Seeland. p. 373.*

Hyeme in ligno subputrido Fagi sylvaticae, in Dania crescit. Ab initio est resupinata, et dilute incarnato - rosea, margine subbysoidea, demum reflexa horizontalis, unc. 3 lata, colore flavo - ferruginea, zonis obscurioribus, margine flexuoso albo - villoso. Lamellae angustae, flexuosae, anastomosantes; sinulis satis amplis difformibus. *Schum.*

8. *rubescens*, pileo laevi subtenui zonato reniformi rufescente, sinulis subconcoloribus rectis: centralibus subporiformibus. *Consp. fung. p. 238. t. XI. f. 2.*

Crescit in Lusatia, ad truncos ramosque emortuos Salicis capreae in sylvis opacis, autumno. Initio tota, praesertim subtus, pruina alba obducta, qua ablata color appareat, qui in recentibus est roseo - rubescens vel subpurpurascens; dein opacior. Pileus plerumque exacte semicircularis, junior vix tomentosus, adultus laevis, zonatus, aut veluti radiato - striatus. *Consp. l. c.*

9. *angustata*, magna subimbricata pubescens fuscescente - coccinea margine albido, sinulis simplicibus rectis subconcentricis.

Boletus angustatus *Sowerb. 2. t. 131.*

Ad pedem Populi cujusdam, in Anglia,
nata. Latitudine palmari, subimbricato-lobata.
Subtus sordide lutescens.

10. *alba*, pulvinata laevis inciso-lobata alba,
sinulis oblongis. †

Boletus albus. *Bolt. Funguss. t. 78.*

Ad radices populneas in Anglia. Pil. 6
unc. latus, et ab apice ad basin 4 unc., albus,
basi rubicundus. Sinuli pallidi, inaequales
rotundi, oblongi, alii undulati, alii angusti.
Affinis videtur antecedenti.

11. *albida*, alba, pileo tenui subglabro, sinu-
lis subelongatis angulatis. *Fries. Syst. I.*
p. 338. Ejusd. observ. I. p. 107.

Ad Betulas in Suecia. Inodora, junior
sericea, dein glabra rugulosa, subtus concava,
variat zonis concoloribus.

12. *saligna*, albida, pileo coriaceo - suberoso
pubescente azono, sinulis elongatis angustis
flexuosis. *Fries. l. c. p. 337. Batarr. Fung.*
Arimin. p. 72. t. 38. fig. E et F?

Ad Salices vetustas, hyeme. Inodora
imbricata, mollis, dilatato-reniformis laevis et
prope marginem strigosum depressa. *Fries.*

Ad Salices oritur, dicit Batarra de suo
fungo, festucas circumpositas illaqueat. Su-
perne hirsutie molli brevi, albida obtegitur,
monticulis vel tuberculis variis extuberat, in-
ferne cretacei coloris est. Substantiam suberis
aemulatur.

13. *cinerea*, pileo zonato tomentoso cinereo, sinulis angustis, aliis poriformibus, aliis longissimis flexuosis: *Fries*, p. 336. *Batt.* p. 72. t. 38. f. G. (Agaricus).

Rarius ad Fagi truncos in Suecia. *Fr.*

Ad palos in foveis defixos circa Sabinium provenit. *Batt.*

Superne hispidus, villosus, coloris cinerei; in singulis squamis zona fere bilinearis, brevi mollique hirsutie obsita, cernitur.

Inferne coloris saturatioris cinerei est. *Batt.*

Imbricata, lignosa, subundulata, 2-3 unc. lata, zonis paucis latis subconcoloribus. Hymenium valde compactum ob sinulos perangustos, sed valde tortuosos et intricatos, qui cinerei vel albidi, semper integerrimi. *Fries.*

14. *aurea*, gregaria, pileo subtriquetro zonato velutino aureo, sinulis parvis angustis flavis.

Fries, l. c. p. 339.

Agaricus aureus daedaleis sinubus. *Battar.* p. 72. t. 35. fig. F.

In truncis caesis quercuum oritur, magnitudine biunciali, margine tumido, forma Polypori cuiusdam.

15. *suaveolens*, pileo coriaceo-suberoso glabro & niveo subfulvo, pores elongatis irregulibus rufescensibus. *Fries* l. c. p. 337. *Syn. fung.* p. 502.

Boletus suaveolens. *Bull. champ. I.* p. 342.

t. 320.

Hab. in Suecia et Gallia, ad Salices vetustas, odore aniseo facile dignoscenda. Junior alba, dein rufescens, superne scabra, zonata, intus sordide lutescens. Aliquando inodora est: ex *Bull.*

16. *confragosa*, pileo coriaceo-suberoso conato-scabro lateritio-fusco, sinulis labyrinthiformibus cinereis. *Syn. fung. p. 601.*
Bolt. Fung. t. 160. (sub Boleto).

Boletus labyrinthiformis. *Bull. p. 357.*
t. 491. f. I.

In truncis Sorbi terminalis. Subimbricata, zonis concoloribus. Sinuli, qui ex *Bolt.* rubicundi, et ex *Bull.* grisei, sat magni sunt formaque varii.

17. *gibbosa*, subimbricata, utrinque planiuscula, obsolete zonata albido-pallens, basi gibbosa porrecta, sinulis pallidis angustis rectis. *Syn. fung. p. 338.* *Boletus suberosus.* *Linn. B. imberbis Bull. t. 445. f. I.* (mala, nimis tenuis picta).

Hab: in variis regionibus ad truncos, quibus basi in formam manubrii est affixa, non nunquam spithamam lata, plerumque vero latitudine palmaris, $\frac{1}{2}$ unc. crassa, substantia dura, sicca. Superficies in vetustis individuis virescit.

Sinuli ad basin pilei fere ita sunt ut in *D. quericina*, et versus ambitum subporiformes.

Obs. Sequentes fungi diversi videntur.

* *torulosa*, pileo convexo glabriusculo laevi albido, margine toruloso undulato, sinulis brevissimis, nonnullis poriformibus.

Daedalea gibbosa. *Trattinn. Fung. austr.* *Fasc. I.* p. 150. t. 15. f. 31. (excluso synonymo).

Cresc., circa Vindobonam Austriae, ad quercus adhuc vigentes, aestate.

Pileus directione verticali extensus, superficie valde gibbosa, et zonis destituta, margine obturissimo, 3-4 unc. latus. Sinuli albi, recti, angustiores. *Tratt.*

* *sinuosa*, magna crassissima subimbricata, pileo convexo inaequali tuberculoso tomentoso, late zonato, sinulis simplicibus aequalibus directione variis.

Boletus sinuosus. *Sowerb.* t. 194.

Lecta in Anglia, autumno ad radicem vetustae populi. Quoad iconem, spithamam lata, et unc. 3 alta; primo pallens, sed demum fere nigricans, ac glutine piciformi obducitur, praesertim ad marginem; interne alba est et texura fibroso-villosa. *Sowerb.*

18. *polyzona*, magna imbricata depressa, pileo tenui opaco tomentoso pallescente - griseo, zonis multis fasciato, sinulis aequalibus brevissimis subtenuibus ligneo-pallidis.

Lecta in Gallia (Bretagne). Utra spithamam lata, ad tactum mollis. Superne visa

D. betulinæ similis (*cont. Bull. t. 537. f. 2.*), nec Polyporo lutescenti dissimilis ob formam, colorem et pileum zonatum tomentosumque, sed sinulis valde discrepat. Hi sinuli, subnientes, cum *D. gibbosa* convenient, sed dissepimento multo tenuiore differunt. Zonae in pileo numerosae sunt, concentricæ, et alternatim prominentes.

19. quercina, pallide fuscescens, pileo duro ruguloso subglabro, sinulis varie implexis crassis. *Syn. fung. p. 500.* *Agaricus L.* *Sowerb. t. 181.* *Trattin. Fung. Austr. p. 19.* *t. 2. f. 3.* (colore obscuriore).

β. flexilis, pileo dimidiato convexo obsoleto zonato glabro basi scabro, lamellis latissimis plerisque simpliciter ramoso-dichotomis, horizontalibus. *Syn. fung. var. I.*

Rarius occurrit in Germania et Gallia. Forsitan distincta est species. Ad tactum valde levis, et formam habet aequalem, nec non colore obscuro est sordide fuscescente, zonae angustae, fere evanidae. Laminae basi, ubi pileo affixus est, ultra unciam latae, flexiles.

γ. platypora, lata albicans, resupinata crassa, sinulis latis subrotundis.

Ratissime in Gallia. *Polyporum simulat.*

δ. ovata, parva resupinata convexa utrinque subattenuata, sinulis subaequalibus, e centro divergentibus. *Tab. XVIII. f. 1.*

Ex Calabria missa a b. Thomas.

Hic fungus (var. *eius vulgaris*) in pluribus regionibus occurrit, sed nullibi rarus, nullibi communis est, ceteroquin et jam antiquitus notus. Pileus juniorum pubescens, tuberculosus, dein glaber, vix zonatus. Sinuli oblique decurrent, basi nonnunquam dentiformes sunt.

Quoad usum, secundum D. Trattinnick, praeparatur ad fomitem, ad maculas scripturasque (calamo cerussato sine dubio pictas) delendas. Ex cl. St. Amans (*Flor. Agen.* p. 559.) olim in Italia usui erat ad caput iis detergendum, qui balnea frequentabant; etiam nunc in nonnullis Galliae regionibus ruri habitantes, hunc fungum strigilis loco ad equos defricandos adhibent, unde Adanson ei nomēn *Striglia* imposuit. Bulliardo observante, nunquam (?) ab insectis laeditur aut devoratur, uti D. *betulina*.

* *trabea*, subimbricata coriacea subglabra, sordide fuscescens opaca, lamellis subsimplicibus carneo - rutilis. *Syn. fung. add.* p. 29. sub *Agarico*.

In Germania rarius occurrit ad ligna fabrifica. Pileus rugulosus, tomento tenuissimo obtectus, magnitudine ceterum fere et forma D. *quercinae*. — Hunc fungum denuo nullibi vidi.

20. *sepiaria*, coriacea dura utrinque plana, pileo strigoso - tomentoso rugoso spadiceo,

margine subtusque lutescente. *Syn. fung.*

p. 487. Fries syst. p. 333. Martius Flor.

Crypt. Erlang. p. 422. (descr. bona).

Agaricus hirsutus. Schaeff. t. 76.

Agaricus boletiformis. Sowerb. Fung. 3.

t. 418.

a. cinnamomea, pileo obsolete zonato unicolo spadiceo, laminis simpliciter ramosis cinnamomeo-nitidis.

b. pileo integro orbiculari, subtus centro affixo. Vaill. Bot. Paris p. 3. t. I. f. I. et 2. (quoad formam).

d. undulata. Ag. undulatus, resupinatus inferne fasciatus rufus, superne lamellatus, lamellis margineque undulatis. Hoffm. Vegetab. in Hercyniae subteran. collecta. p. 7.

t. 4.

Specimina sub diu crescentia, ad ligna pinea et abietina, in Hercynia frequenter inveniuntur. Juniora magis rubiginosa, fasciis seu zonis impressis distincta, vetusta, fusco-brunnea, praesertim basi, inferne lutescentia aut cervina.

De varietate & subterranea, b. Hoffmann l. c. sequentia attulit: Hab. in semiputridis lignis et trabibus (pineis) fodinarum Hercyniae, profunditate saepe 100 pedum. Cespites plerumque efformat ex multis inter se connexis et superimpositis pileis, adeo ut ex communi radice oriri videantur, latitudine bipol-

licares aut palmares, forma et situ valde inaequales. Adnotatione digna est ea varietas prolifera, ubi alter ex alterius margine, quasi e pedunculo peculiari, infundibuli acquirit formam, lamellis externe decurrentibus.

* *tricolor*. Ag. *tricolor*, perennis coriaceus dimidiatus sessilis, supra zonatus versicolor glaber, subtus tubuloso-lamellosus: lamellis ramoso-furcatis. *Bull. Hist. d. champ.* vol. 2. p. 380. t. 541. f. 2.

Hab. supra Pruni avium trunco; nunc solitarius, nunc imbricatus. Pagina superior glabra, veluti sericea et fasciis subalbescentibus, aliis vinoso-miniaceis, aliisque lateritio-nigricantibus laete picta. Pagina inferior primo porosa est et nivea, deinde substramineo-rufida et lamellosa, demum rufo-fuliginea. Caro lamellis concolor. B.

a1. *abietina*, gregaria oblongo-linearis basi effusa, pileo coriaceo subtenui, juniore sub-tomentoso, dein glabro laevi umbrino (arius rutilante), lamellis rectis subdistantibus glauco-cinereis.

agaricus abietinus. *Bull. l. c. p. 379. t. 442. f. 2. et 541. f. 1.*

Daedalea abietina. *Fries Syst. 2. p. 339.*

B. *resupinata*, major, lamellis ex centro divergentibus, saepe laceris.

Cresc. ad ligna, palos et trabes abietinas,

in hortis et sylvis. Ab antecedente differt substantia tenuiore, pileo non lacunoso - rugoso, vix fasciato, unicolor, fere glabro. Lamellae simpliciter ramosae, cinereo - pruinosa. Magnitudine quoad locum variat, uti et colore.

22. betulina, pileo coriaceo tomentoso zonato versicolore, plerumque pallido, lamellis albicantibus pallentibus simpliciter ramosis aut sinuosus.

Agaricus betulinus. *Linn. Sowerb. t. 182.*

Daedalea Fries. l. c. Flor. Dan. t. 1555.

Agaricus coriaceus. *Bull. Hist. des champ. p. 373. t. 537. figg. 13. c. 8. F. G. K. et M.?*
(exclusis pluribus synonymis). *Syn. fung. p. 486. Bolton t. 158.*

Cellularia cyathiformis. *Bull. t. 414.* (ex ipso autore).

β. Ag. versicolor, pileo coriaceo villoso fusco, cinereo et dilute virescente griseoque fasciato, lamellis obtusis rectis. *Bergamaschi in Biblioth. Italiana. Octob. 1823. p. 73.* Alia var. *versicolor* apud Planer et Syn. l. c.

Species communis ad truncos caesos in sylvis, passim quoque ad trabes in viridariis. Magnitudine plerumque duarum unc., sed et latitudine palmari invenitur, substantia tunc magis flexili et lamellis simplicibus. Hae in paucis individuis, praesertim junioribus, labyrinthiformes (conf. Sow. tab. cit. fig. dextra.) sunt. Color, quoad situm fungi, et aetatem,

totus albicans, passim cinerascens, pallens, fuscus, et variegatus. Lamel. juniorum albae.

Obs. In Tab. citata Bulliardj *Fig. G.* etiam videtur Daedaleae species. *Fig. P.* *Daedalea*, vel *Polyporus*. *Fig. I. L.* et *N.*? est *B. versicolor*. Linn. et *Fig. H.* ejusdem speciei varietas?

LXXVIII. SCHIZONIA. *Pileus coriaceus, dimidiatus. Lamellae demum longitudinaliter bifidae, revolutae.*

1. vulgaris, gregaria parva tomentosa albida, margine saepius inciso, lamellis griseopurpurascientibus.

*Schizophyllum commune. Fries Syst. I.
p. 330.*

Agaricus alneus. Linn. Bull. t. 346. et t. 581. f. 1. Sowerb. t. 183. Hoffm. Nomencl. fung. t. 1. A. multifidus. Batsch. t. 24. f. 126. Micheli t. 65. f. 4.? Batarra t. 38. f. D.

Non equidem ad species communes pertinet, et ipse hunc fungum nunquam ad trunacos alneos inveni, sed praeamare videtur tiliaeos, passim quercinos, ceterum per totum terrarum orbem obvenit, et specimina exotica majora sunt, sed plerumque multipartita. Junior fungus (an semper?) ab ullo auctore memoratus, quantum scib, integer est, resupinatus, orbicularis pezizaeformis, et totus niveocandidus. Substantia sicca, excarnis. De lamellis Bulliardus dicit p. 381., quod primum

margine canaliculatae sint (*t. 346. f. c.*), de-mum apertae et revolutae (*t. 581. f. h.*), ceterum sunt simplices et vix ramosae, et quod singulare, in specimini bus subterraneis, Scopolio affirmante, pileo concolores sunt.

Obs. An forsitan huc referenda tanquam varietas *resupinata*, *lamellis ex centro radian-tibus*, LITHODERMOMYCES *Batar.* *p. 62. t. 24.* *B.* de quo auctor sequentia adnotat: peculiaris hic fungus supra saxum tophaceum, in lateritia fornace excoctum inventus est, absque pe-dunculo, tenacissime saxo conjunctus. Pars inferior (pileus) tota tomentosa et cinerea, su-perior erat sulcata (*lamellata*), sulci crebri pa-rum profundi et amethystini coloris. Tota substantia erat medium inter lapideam et co-riaceam tenens.

LXXIX. AGARICVS. *Volva nulla. Pileus carnosus aut membranaceus, integer aut dimidiatus. Lamellae longitudine inaequales, marcescentes, exsuccae.*

† *PETRONIA, pileo dimidiato.*

* *Apodes, pileo sessili.*

1. *Epixylon*, gregarius pusillus caesio-umbri-nus, pileo glabro suborbiculari basi effuso, dorso adnato, lamellis radiantibus concolo-ribus.

A. *epixylon*, exiguis tenellus sessilis di-midiatus squamiformis glaber, superne cae-sio plumbeus, lamellis latis crassiusculis, basi

declivibus. *Bull. Hist. d. champ.* 2. p. 382.
t. 581. f. 2.

Ag. applicatus, acaulis orbicularis saturate
cinereus nigrescens horizontalis, dorso verti-
caliter adnatus, laminis ab omni margine ver-
sus centrum impresso - adnatum tendentibus.

Batsch. El. fung. Cont. I. p. 171. t. 29. f. 125.
Sowerb. fung. t. 301.

B. pezizoides, minutus fusco nigricans, pileo
integro verticali aut horizontali ruguloso,
basi villo albo adnato.

Ag. pezizoides cyathiformis sessilis oliva-
ceo-fuscus, lamellis intra cupulam inaequali-
bus didymis. *Nees ab Esenb. in N. Actis
Academ. Caesqr.* vol. IX. p. 249. t. 17. f. 18.
Fries l. c. p. 276. (juvenilis).

γ. carpineus, cinerascens glaber, primo pezi-
zoideus, deinde dimidiatus horizontalis, re-
flexus, lamellis distantibus cinereis. *Tab.*
XXVI. Fig. 8. a, b.

Species sat rara, ad trunços et salices ca-
riosas crescit, *β.* in Helvetia frequentior in
ligno præsertim abietino reperitur, *δ.* una so-
lummodo vice in trunco putrescente Carpini
Betuli mihi obvia, et *A. striatulo* sat affinis
videtur, magis cinerea est præsertim in la-
mellis.

Ag. epixylon, quoad Bulliard, prima aeta-
te cupulam inversam refert, margine circa
basin saepe ciliato, aetate profecta squamifor-
mis

mis fit. Lamellae, pro pilei diametro, latissimae, cinereas, caesioplumbeas, nonnunquam dilute rufidae. — Color fungi, ex Batsch, est ex nigro fusco-cinereus. Superficies tota quasi pruinata, et dorso subtomentosa. Ex observatione b. Sowerbei color est griseo-viridis vel glaucus, et pileus dorso in petiolum productus, quo saepe cyathi — vel campanulae formis evadit.

* *cocordes*, sparsus cinerascens, pileo glabro convexo, ab initio subresupinato concavo: ore obliquo, dein truncato-dimidiato, lamellis albido-cinereis. *Tab. XXV. Fig. 3. et a.*

In caule exsiccato Pteridis aquilinae repertus et pictus a D. Petit.

Obs. Crescendi modo, item et habitu cum A. *epixylo* similitudinem habet, nonnullis interea notis ab illo dissentit, et ulterius examinandus.

2. *merulinus*, gregarius substipatus exiguis pileo dimidiato, basi subeffusa affixo, striato subtomentoso, lamellis latiusculis distantiibus albis, simpliciter dichotomus.

Rarissime inveni pulchellam hanc speciem ad basin truncorum in viridario quodam. Magnitudine Ag. *applicato*. B. similis, sed lamellis ramosis, nec tamen plicaeformibus quam maxime differt; etiam hoc peculiare habet, quod color pilei in eadem grege fuerit pallidus et aeruginosus.

Sectio tertia.

B

3. *trichotis*, dimidiatus exiguum, pileo nigricante toto hirto, lamellis fusco-cinerascen-tibus. *Tab. XXVI. f. 9.*

Agaricus striatulus, *B. hirsutulus*. *Consp. fung. p. 232.*

Ad truncos rarissime provenit, magnitudine *Ag. variabilis*, pileo explicato, non convoluto ejusque hirsutie sat densa, ab antecedente differt.

4. *striatulus*, pusillus dilute cinereus, pileo membranaceo striato glabro pellucido, lamellis paucis distantibus. *Syn. fung. p. 485. Fries l. c. p. 193. Observ. Mycal. 2. p. 48.*

Hab. in Germania, et Suecia, ad ligna pinea et ad ramos aliarum arborum. Latitudine tri-quadrilineari, siccus corrugatus. Variat lamellis sordide albis; etiam totus fuscus est. *Fr.*

5. *elatinus*, gregarius violaceo-fuscus, pileo carnoso, juniore resupinato integro, basi albo-fibrilloso, adulto dimidiato horizontali-
Tab. XXIV. f. a. b.

B.? *Agaricus violaceo-fulvens*, pileo membranaceo violaceo-fulvo, lamellis-concoloribus. *Batsch. El. fung. p. 95. t. IX. f. 39. Syn. fung. p. 483.*

Fungus, de quo pictura hic affertur, crescit in Vogenia, et prope Neuchatel ad cortices Pini Abietis Linn.; quoad specimina a D. Mongeat et Chaillet communicata, ab initio fere

pezizaeformis est, et basi fibrillis curtis albidis cortici affixus, pezizam quamdam sat magnam et altam praebens, substantia est carnosa non membranacea. Pileus dein pro more dimidiatus fit et horizontalis, externe glaber, et subfarinaceus, forte exsiccatione, & unc. fere latus.

Obs. Species Elenchi fungorum quamvis concolor, diversa videtur, uti ex descriptione autoris liquet, dicit enim: Pileus est membranaceus, supra tomentosus, dimidiatus orbiculatus. Lamellae convexae (quae solummodo pictae sunt). In truncatura trabium humidarum repertus, margine rectilineo adnatus.

6. *cynotis*, dimidiatus imbricato - cespitosus sessilis, pileo (adulto) glabro subviscoso rufo - brunneo, lamellis densis lutescentibus, basi subcrispis. *Tab. XXIII. Fig. 5. a - d.*

Autumno, in trunko lignescente, inveni plura hujus speciei individua (12 — 15) cespitem efformantia, basi materie farinoso - fibrillosa unita. Juveniles subiculo albo - farinaceo insidebant, etiam toti albidi et pariter farinosi erant, primo subspathulati, dein sensim dilatantur, margine adhuc involuto, adulti glabri ac viscositate lenta, obtecti. Lamellae venis in nonnullis connexae. Substantia coriaceo - carnosa; sed tenuis. Sapor valde ingratius, sed non stypticus.

B 2

7. *byssisedus*, pileo fibrilloso suborbiculari fuligineo-canescente, lamellis incarnato-fuligineis, stipite brevissimo, radiculis byssoides. *Syn. fung. p. 482. Ic. et Descr. fung. p. 56. t. 14. f. 4. Fries. l. c. p. 276.*

Ad truncos cariosos fagineos interdum obvenit. Pil. junior integer et fere resupinatus, adultus reniformis, subumbilicatus, unc. 1 lat. Lamellae latiusculae, cinerascentes. Stipes, tentis, evanescens.

Obs. Fungus sub hoc nomine in *Flora Dan. t. 1552.* pictus, alia species est.

8. *Dictyorrhizus*, candidus, pileo semiorbiculari, margine sinuato, basi fibrilloso, radicibus tomentosis retiformibus. *Decand. Syn. pl. Gall. p. 28. Flor. Gall. 2. p. 394.*

In cubiculo quodam repertus ad argillam humidam, supra quam radiculae fibrilliformes niveae reticulatim expansae fuerunt, ex pilei basi enatae. Stipes aliquando etiam adest brevissimus. Fungus ceterum valde tener, et una cum lamellis inaequalibus pulchre albus. *l. c.*

9. *lamellirugus*, pileo dimidiato planiusculo, oblongo albicante, lamellis croceis, venis conjunctis, stipite brevissimo vel nullo. *Decand. Flor. Gall. Suppl. p. 44.*

Cresc. in Gallia meridion. ad ramos vetustos, sero autumno. Formam habet inaequalem, oblongam; pileus ab initio convexus; dein planus, margine reflexo. Lamellae basi

venoso - anastomosantes et aurantio - pallidae sunt.

10. *conchaceus*, *subterraneus*, *acaulis resupinatus* - *subimbricatus*, *linguaeformis ruber*, lamellis flavis.

Petronia *conchacea*, *multiplex ruber*, lamellis flavis. Scopoli Fung. subterr. p. 108. t. 31. f. 2.

In *Pacherstollea*. Caro pauca. Margo inflexus. Apex adscendens. Substantia flexilis. Scop.

11. *quercifolius*, *subterraneus*, *pileo submembranaceo sinuato - lobato roseo - flavoque vario subtriquetro*, lamellis densis luteis.

Petronia *quercifolia*. Scop. l. c. p. 107.

t. 30.

Ex Anton. de Padoa Stollen. Pileus 3-4 unc. longus, basi in petiolum fere porrectus, versus apicem ultra 2 unc. dilatatus, in disco roseus, ad limbum flavus. Caro vix ulla. S.

12. *porrigens*, *imbricatus candidus*, *pileo piano glabro*, basi compressa angustata compressa, lamellis longe decurrentibus. Syn. fung. p. 480. Obs. Mycol. I. p. 54.

A. *porrigens*, *candidus*, *pileo adscendente sessili auriformi subglabro*, lamellis angustis linearibus integerrimis. Fries Syst. I. p. 187. Ag. *palmatus*. Schumach. Flor. Soelland. p. 362.

Hab. in Hercynia et in Suecia, ac Dania ad truncos Pini. Latitudine biunciali; pileus subtriqueter, substantia aquosa, basi in formam stipitis appланatus. — Imbricatus, magnitudine varijs, subflaccidus, basi porrecta, saepe tomentosa, rarissime stipitem exsertens. Pileus laevis, in majoribus lobatus. Lamell. juniorum venosae, subdivisae. *Fries.*

12. b. *pinsitus*, explanatus candidus, pileo molli sessili villosa, lamellis latiusculis obscurioribus. *Fries. Syst. 1. p. 184. Schaeff. t. 213. f. 2.*

Ad truncos quercinos, autumno. Mollis laeviter carnosus, flaccidus, apice latior explanatus. Lamell. decurrentes. Odor fungi, uti farina recens. *Fr.*

12. c. *ursinus* imbricatus sessilis, pileo adscendente tenaci rubicundo, basi utplurimum fusco-tomentoso, lamellis crenatis albidis. *Fries. l. c. p. 185.*

In Suecia, ad truncos cariosos Fagi, durante autumno. Pileus difformis, sublobatus, testaceo-incarnatus; nunc glaber, nunc disco tomentosus. Lamell. usque ad basin decurrentes, 4-6 lin. latae, et lacerae. *Fr.*

13. *nidulans*, gregarius, pileo reniformi tomentoso flavescente, demum resupinato, lamellis conferti aurantio luteis. *Syn. fung. p. 482. Ic. et Descr. fung. p. 56. t. 6. f. 4. Fries. l. c. p. 189. Consp. fung: p. 231.*

In Germania, Gallia et Suecia ad truncos pineos, passim et fagineos. Junior resupinatus integer, tomento molli adnatus; adultus horizontalis, aliquando subimbricatus, unc. 1-
1½ latus.

14. *flabelliformis*, pileo planiusculo glabro cervino, margine lamellisque crenatis, stipite brevi aut nullo. *Fries*, p. 185. *Bolton*.

Fung. t. 157.

In Anglia ad truncos. 2-3 unc. latus, dilute fuscus. Lamellae latiusculae.

15. *scobigera*, pileo dimidiato oblongo subquadrangulari glabro lutescente, lamellis concoloribus.

Inventus prope Poitou a D. Delastre, super serraginem crescens situ fere erecto. Pilus basi productus, radicis 4-5 lin. longae, adinstar palvere serragineo, cui forte adhaeret, cinctus, $\frac{1}{2}$ unc. latus, apice paullo latior ibique reflexus.

16. *dubius*, magnus acaulis appланato-dilatatus subreniformis, pileo tenti, margine late crenato repandoque, dorso basi subpubescente, obscure helvolo, lamellis pallidis.

Hab. in Gallia. Magnitudine fere triangulari, sed subtenuis, forma regularis:

Obs. Ad specimen siccum et mecum communicatum iudicandum, ab Agarico molli diversus est; sed an margo semper crenulatus sit, nescio. A. *flabelliformi*. Bolt. non bene

congruit, cuius pileus - laceratus et multiformis dicitur. *Agaricum auriculae-* vel *flabelli-forma*, superne subobscureum, inferne *album*. *Mich.* p. 123. nr. 4. t. 65. f. 1. quoad magnitudinem, formam et marginem crenatum (ex iconę) non equidem distat, sed stipite distincto, et lamellarum colore differt.

17. *mollis*, gregarius aquoso-mollis, pileo glabro gibboso pallido aut lutescente, lamellis confertis subcinnamomeis. *Syn. fung.* p. 480. *Schaeff. fung.* t. 213. *Sowerb.* t. 98. *Ag. lateralis.* *Bolt.* t. 71. *A. canescens.* *Batsch.* f. 38.

Autumno ad truncos cariosos, etiam ad Salices vetustas occurrit, unc. 1-2 latus subflexuosus, substantia aquosa fere gelatinosa.

* *heteroclitus*, magnus lobatus, pileis aliis dimidiatis, lamellis integris; aliis in tuberem convolutis, lamellis longe decurrentibus venosis.

Merulius lamellosus. *Sowerb. fung.* t. 303.

Repertus in cella quadam. Pileus tener, elasticus, ex albido pallens. Lamell. glandulis stipitatis obtectae. An forsitan varietas monstrosa antecedentis? Fungus denuo observandus et melius e vivo describendus.

18. *bubalinus*, pileo glabro subflabelliformi plano opaco fusco-argillaceo, lamellis confertis strictis, stipite brevissimo. *Tab. XXIV.*

Fig. 3. a.

In Gallia a D. Cauvin repertus ad ligna, forte terra substrata, qua basis fungi erat obiecta. Latitudine biuncialis, margine sublobatus. Lamellae subpulveraceae, latere plicatae. Ex sicco.

Obs. Color genuinus forsitan parum alias, Ag. molli videtur, affinis, sed magis carnosus est.

19. *proboscideus*, ochraceus, pileo carnoso resupinato, vertice porrecto stipiti-formi, lamellis concurrentibus. *Fries. Syst. I. p. 274.*
Ejusd. obs. 2. p. 232.

A. *resupinatus*. *Flor. Danica. t. 1072.*

In cryptis, ad ligna pinea, exeunte Augusto, in Dania observatus. Extus pubescens, basi tomentosus, $\frac{1}{2}$ -1 unc. latus. *Fr.*

20. *algidus*, pileo carnoso laevi glabro umbriano, strato superiore gelatinoso, lamellis pallidis, dein lutescentibus. *Fries. L. c. p. 190.*

Agaricus lateralis. Flor. Dan. t. 1556.
f. 2. (junior). Ag. *subsessilis Flor. Dan. t. 1552.* f. 1. (evolutus). *Schum. Saell. p. 364.*

Nascitur in Dania et Suecia ad truncos Betulae. Saepe imbricatus, subreniformis, dein repandus, 2 unc. latus. Lamellae juniores albidæ. *Fr.*

21. *atrocaeruleus*, pileo carnoso villosō atrocaeruleo, strato superiore gelatinoso, lamel-

- *mellis albidis.* Fries, l. c. p. 190. Schaeff.
t. 246. f. 3. et 9?
- Raro, in Suecia, ad truncos Fagi. Octobr.
Mollis, obovatus, 1-2 unc. latus. Lam. con-
fertae, subinde flavescentes. Fr.
- 22. horridus,** cespitosus submagnus, pileis im-
bricatis villoso - squamosis et strigosis ob-
scure fuscis, lamellis ex puncto excentrico
radiantibus pallidioribus. Sowerb. t. 99. Ag.
echinatus.
- A. mastrucatus,** pileo carnoso squamoso
murino - griseo, strato superiori gelatinoso,
lamellis griseo - albidis. Fries. p. 190.
- Cresc. in Anglia ad Aceres emortuas, in
Suecia ad truncos Fagi, Sept. et Noyembr. D.
Fries suum fungum describit ut difformem, in
majoribus lobatum, flaccidum, 2-4 unc. la-
tum. Pileus ex Sowerby dorso adnatus inte-
ger carne crassa, subtremulosa.
- 22. fluxilis,** subsessilis, pileo gelatinoso fluxili
reniformi umbrino, lamellis distantibus al-
bidis, paucissimis integris. Fries. Syst. 1.
p. 189.
- Ad truncos muscosos Fagi. Solitarius,
inodorus, substantia tenui viscidia molliissima
diaphana. Pileus puncto laterali leviter adfi-
xus, reniformis, junior membrana fugaci tec-
tus, dein glutinosus. Lamell. persistentes, pau-
cissimae solummodo integrae, reliquae brevio-
res aut dimidiatae sunt, uti 10 ad. 1. Fr.

23. *haustellaris*, pileo reniformi villoso alutaceo-pallido, lamellis rotundatis ferrugineis, stipite laterali sursum attenuato albo. *Fries.* p. 274. *Ag. flurstedtiensis.* *Batsch.* *El. fung.* *Cont.* 1. p. 171. t. 24. f. 124. (icon mala dicitur).

In ramis putridis Pop. tremulae, in Suecia; in cortice Salicis prope Jenam lectus. Parvus, leviter carnosus $\frac{1}{2}$ unc. et ultra latus. Stip. 2 - 4 lin. longus, villosus, junior adscendens. Sporulae ferrugineae. *Fr.*

24. *translucens*, pileo membranaceo pellucido orbiculari ex albido rutilante, lamellis primo pallidis, dein subviolaceis, tandem ferrugineis, stipite vix ullo laterali. — *Decand. Flor. Gall. Suppl.* p. 43.

Cresc. prope Montpellier ad vetustas Salices, ubi in cibum colligitur. Pileus irregularis.

25. *violaceo-ruber*, subimbricatus, pileo subcarnoso violaceo, dein appланato rubro, margine substrato, lamellis dilutioribus, stipite subnullo. *Consp. fung.* p. 230.

Crescit in Lusatia supra lignum fagineum vetustum. Pileus junior amoene convexus et pulchre violaceus, adultus prorsus appланatus et ruber, $\frac{3}{4}$ unc. latus, fragilis. Stipes perbrevis; interdum vix ullus, interea tomentum niveum circa pilei basin constanter adest. *Consp.*

26. *variabilis*, gregarius aut sparsus, pileo submembranaceo, primo resupinato, dein horizontali tomentoso albo, lamellis albido-rubiginosis. *Syn. fung.* p. 483. *Obs. Mycol.* 2. p. 46. t. 5. f. 12.

Agaricus sessilis. *Bull. champ.* p. 384. t. 581. f. 2. A niveus. *Sawerb.* t. 97. (bona).

Aestate et autumno frequens, ad stipites et ramulos, (passim et ad gramina) ad terram dejectos, colore niveo mox perceptibilis: Nascens integer, pezizaeformis, saepius stipitem tenuem ex centro emittens, deinde dimidiatus fit et horizontalis, stipite evanido. Lamellae ab initio albae fere, deinde rutilantes, sporulis onustae.

* *chioneus*, candidus subresupinatus pusillus, pileo tenui villoso, lamell. latiusculis-concoloribus, stipite brevissimo villoso demum, evanescente. *Tab. XXVI. fig. 10. et 11.*

Rarius ad ligna crescit. Vix 2 - 3 lin. latus.

* *Hypnophilus*, sessilis dorso affixus aplana-tus albus, pileo subreniformi subglabro, lamell. simplicibus concoloribus. *Tab. XXIV.*

Fig. 5. a.

Passim ad muscos maiores, etiam in arborum foliis dejectis occurrit. An Ag. *epibryus*, pileo tenui verticali sericeo candido, lamellis confertis gilvis. *Fries. Syst.* 1. p. 275.?

Obs. Duo hi fungilli Agarico variabili

colore et habitu convenient exceptis lamellis, quae non in maturitate decolorantur, an forte a causa quadam exteriore? Hinc eos nondum ut species proprias distinguere voluerim, donec a me aut ab aliis melius observati sint. Sequens parum quoque differre videtur.

27. *septicus*, candidus, pileo e resupinato reflexo, laevi pubescente, lamellis radiantibus stipite tenui incurvo pubescente, radiculis byssoidaeis. *Fries.* p. 192.

Agaricus flabellatus. *Bolt.* t. 72. f. 2. A. pubescens. *Sowerb.* t. 321. (ex Fries).

Ad truncos putrescentes passim, Aug. — Octobr. Colore A. variabilis, sed sporidiis differt. Stipes 2 lin. fere longus, quoad insertionem peculiaris, subinde cum radiculis obsoletur. Pileus demum liber, subcarnosus, 3-5-6 lin. latus. *Fr.*

28. *depluens*, pileo tenui reniformi rubescente-cano, basi villoso albido, lamellis distinctis latiusculis rufescentibus. *Fries,* l. c. p. 275.

Batsch El. fung. *Cont.* 1. p. 167. t. 24. f. 122.

Ag. epigeus. *Syn. fung.* p. 484. *Obs. Mycol.* 2. p. 47.

Ad terram nudam orbitalium, passim ad latera rupium, etiam supra muscos (ex Fries). Substantia aquosus. Stipitis rudimentum adest in plerisque. Lamel. latae convexiusculae, pulverem copiosum lateritio fulvellum spar-

gunt. *B.* Pileus obsolete tomentosus, margine substriatus, latitudine fere uncialis. *Fr.* Stipes incurvus, 3 lin. longus. Sapor virosus, ingratus.

** *Pileo dimidiato, stipite magis distincto, persistente.*

29. *tremulus*, solitarius terrestris, pileo laevi submembranaceo albido - cinerascente, disco subdepresso, basi stipiteque brevi albo tomentosus, lamellis angustis albido - fuscescensibus. — *Schaeff.* t. 227. *Sowerb.* t. 242.

Ag. glaucus, griseus substipitatus, pileo sericeo, stipite albentiore pruinato laterali, lamellis rarioribus crassiusculis. *Batsch.* *El. fung.* *Cont.* 1. p. 170. t. 24. fig. 123.? (fungo adhuc juvenili, ut videtur).

Hab. autumno, rarius, ad terram, in sylvaticis, (etiam circa Parisios uti antecedens). Stipes ascendens, utrinque planus, albo-tomentosus. Pileus subflabelliformis, subinde parum reniformis, 4 lin. ad $\frac{1}{2}$ unc. latus. Lamellae distinctae, lineares, nec pulvere obiectae, ut in priore, cui satis similis.

30. *applanatus*, subimbricatus fragilis pileo albido, ad partem rufescente, lamellis confertis concoloribus, stipite brevi tereti tomentoso. *Obs. Mycol.* 1. p. 8. *A. planus.* *Syn. fung.* p. 480. *Consp. fung.* p. 230.

In Germaniae truncis putridis gregarie crescit. Pileus subtriqueter, planus, humidus,

unc. latus. Stipite tereti tomentoso, brevissimo ab A. porrigente differt.

31. *umbrinus*, pileo dimidiato reniformi glabro obscure spadiceo, lamellis stipiteque sublongo incurvo dilutioribus.

Initio autumni semel ad ligna emotitam mihi obvius. Pileus subcarnosus, 3-4 lin. latus subpulverulentus. Lamel. latiusculae laxae. Stipes subpubescens, 2-3 lin. longus, 1 crassus.

32. *acerosus*, *griseus*, pileo striato expallente, lamellis linearibus, stipite excentrico strigoso. *Fries Syst. 1. p. 191.*

Supra folia acerosa et ramulos Abietis in sylvis densis. Stipes 3 lin. fere longua. Pileus membranaceus, humidus striatus griseus; siccus cano-sericeus, 1-2 unc. latus, profunde lobatus, quasi plures dimidiati in uno stipite. *Fr.* — Antecedenti nimis affinis videtur.

33. *mutilus*, albus, pileo reniformi subsericeo, lamellis subdecurrentibus confertis, stipite excentrico glabro adscendente, *Fries, l. c.*

Ad terram locis umbrosis; in sylvis? autumno. Gregarius, et subiculo quodam byssaceo tenui plerumque insidens. Stipes tenax, 3-4 lin. longus. Pileus subumbilicatus, irregularis, $\frac{1}{2}$ unc. fere latus. Lamell. tenues decurrentes. *Fr.*

34. *petalodes*, albo-cinerascens, pileo tenui lato dimidiato in stipitem complanatum de-

sinente, lamellis angustis curvilineis decurrentibus albido cinereis aut lutescentibus.

Bull. Hist. d. champ. 2. p. 391. t. 226. et 557. f. 2. +

In sylvis abeunte aestate et autumno habitat. Terrestris et solitarius. Stipes obliquus, complanatus, nec raro canaliculatus. Pileus lateralis, veluti pulverulentus, (hinc non villosus) carnoso membranaceus, adultus 1-3 unc. latus. B.

35. *spathulatus*, solitarius erectus, submagnus, pileo spathulato pallescente disco spongioso - squamuoso, stipite canaliculato.

Obs: Myc. 1. p. 55. t. 4. f. 1. Syn. fung. p. 480 — 481. Consp. fung. p. 229.?

Rarissime in fagetis occurrit, ad terram, in Germania. Stipes unc. 1. longus, lin. 1 latus, superne sulcatus, villosus; inferne punctato-squamulosus. Lamellae decurrentes, pileo concolores. Pileus carnoso - membranaceus; disco depresso, margine reflexus, suborbicularis. l. c.

* *anatinus*, gregarius terrestris, pileo dimidiato in stipitem sublongum porrecto rufescente - rubro, lamellis decurrentibus albidis.

Tab. XXV. f. 5.

Hab. in graminosis sylvaticis fagineis in Gallia (Compiègne), ubi plura specimina simul crescunt. Stipes compressus albus. Lamellae primo albidae, demum pallide luteae.

Obs.

Obs. Fungum ipsum non vidi vivum, sed eum hic annotavi ex brevi descriptione, quam D. Léré, una cum pictura mecum benevolē communicavit, opinante hunc Agaricum esse *A. petalodem* Bull., a quo tamen mihi diversus videtur, cum forma, colore et crescendi modo differat.

36. *cochlearis*, cespitosus fulvus, pileo ovali convexo hirsuto, margine revoluto, stipite sublongo incrassato tereti.

Agaricum caespitosum fulvum, cochlearis — aut spathulae forma, hirsutum. *Mich. gen. pl. p. 123. nr. 20. t. 65. f. 5.*

Ad Quercum autumnali aut brumali tempore, in Italia. Habitu proprio distinctus. Pilus equidem non dimidiatus est, sed margine cum stipite, unc. 1. longo confluit.

* *conformis*, cespitosus sordide luteus, pileo ovali convexo glabro, margine revoluto, stipite elongato subaequali. *Mich. l. c. nr. 19. f. 6.*

Cum antecedente habitatione et forma convenit, sed glaber, et colore dilutior est.

37. *putatus*, terrestris submagnus albicans, pileo subcarnoso obliquo flabellato glabro, lamellis abbreviatis, stipite crassiusculo tereti glabro.

* *Omphalomyces mutilatus*. *Battarr. tab. IX. f. 2.*

In arvis circa flum. Ariminum autumno

Sectio tertia.

C

Iectus. Esculentus et Arimini sub nomine Cardarella bianca notus.

„Pedunculus albus, plenus et laevis (sat longus, basi rotundatus). Sulci (Camellae) profundi et albidi. Pileolus in limbo, non in centro, cum pedunculo conjungitur, & unc. latus, sordide albus.“ *Bat.*

38. *Ascalus*, magnus cinerascens, pileo uno latere ad basin inciso, pluribus interioribus invicem incumbentibus multiplice.

Polymyces Ascalus, i. e. fungus multiplex, pedunculo vestitus. *Batt. t. 14. f. D.*

„Haec fungi species ad aridos Populi trun-
cos pullulat, et nihil aliud est, nisi variarum
pileatorum fungorum portionum aggregatus, quae
portiones modo duae, modo plures ita dis-
positae sunt, ut rosam imitarentur. Quaelibet
pars carnosa et mollis. Sulci profundi et rari,
unionum colorem imitantes. Pulvisculus inde-
ficiens ex sulcis labitur et fungini graveolet.
Ad Flumicini ripas tempore autumnali non in-
frequens.“ *Batt.*

39. *leporinus*, pileo simplice magno infundi-
buliformi, uno latere ad basin labiato-fisso,
margine repando, lamellis albis.

Agaricum infundibulum dimidiatum imi-
tans, per oras undulatum, superne parte ob-
seurum et veluti sericum, inferne lamellatum
et album. *Micheli gen. pl. p. 123. nr. 16.*
t. 65. f. 2.

Mense Octobri, circa Florentiam, in sylvaticis repertus. Stipes nullus? Pileus infundibulum imitans; 2-3 unc. altus et latus, fere membranaceus.

* *Semiinfundibulum*, albopallens magnus, pileo carnoso? subobliquo glabro infundibuliformi, margine reflexo, lamellis confertis decurrentibus, stipite brevi crasso.

Hypophyllum seminfundibulum. *Paulet icon. fung. t. 25. f. 1. et 2.* *Ejusd. Traité des champ. vol. 2. p. 117.*

Hab. ... Pilēus in medio latitudine palmari, deorsum semitubulosus, fissura longitudinali valde aperta, margine non expanso, formam fungi dimidiati magis exhibit, quam duae antecedentes species. Species, mihi ignota, ex auctore ad usum suspecta.

40. *ostreatus*, caespitosus imbricatus, pileo glabro nigricante-cinereo, lamellis confertis albis, basi anastomosantibus, stipite laterali brevi crasso. *Syn. fung. p. 477. Fries Syst. 1. p. 182. Jacq. austr. 3. t. 288. Curt. Londin. t. 216. Sowerb. t. 241.*

Agaricus nigricans. Flor. Dan. t. 892.

Dendrosarcos nigrescens. Paull. ic. t. XXII.? (var. pileo fere integro, et stipite longo centrali.)

Ad truncos arborum, autumno praesertim pluvioso. Quoad aetatem colore differt, cfr. *Flor. Dan. t. 1616. pileo cinereo-lutescente*

squamuloso: A *dryoideus*, et Schum. Saelland. p. 362. et 365. *atro-albus*, pileo ingente et violaceo et castaneo nigro. *Consp. fung.* p. 228. Lamellae decurrentes, basi venoso-reticulatae, et stipes crassiusculus brevis, nunc glaber, nunc basi strigosus, hanc speciem distinguunt.

* *gyrinus*, simplex totus albus, pileo carnosō convexo ovali, lamellis basi venoso-reticulatis, stipite laterali longissimo fusiformi.

Tab. XXV. F. 1.

In fissura truncī cariosi repertus a D. Petit, et alia var. *lamellis dilute sulphureis* a D. Léré prope Compiègne observata.

Obs. Verosimile est huncce fungum, longe cāudatum, varietatem degeneratam esse *Ag. ostreati*: stipite intra lignum cariosum ita longe penetrante, ut basi parti ligni magis durae affigere sese possit. Adnotari tamen meretur, quod odore sit grato fere aniseo, quo *A. ostreatus* non donatus videtur.

41. *glandulosus*, sessilis, aut in stipitem brevem et crassum desinens, pileo dimidiato, lamellis glandulosis niveis curvilineis decurrentibus. *Bull. Hist. des champ.* p. 388. t. 426. *Consp. fung.* p. 228. *Fries* p. 182. ? +

Arborum emortuarum aut languentium trunco innascitur, autumno et hyeme ineunte; ut plurimum coacervatus, interdum est solitarius. Stipes lateralis, crassus et brevis, saepius fere nullus. Pileus nunc concameratus

(convexus), nunc multivarie cavus (depressus), 4-8 unc. latus. Lamellae glandulis tomentosis intervallatisque instructae. (*des houpes velues et glanduleuses placées de distance à autre*). Bull.

42. *Cornucopiae*, aggregatus caespitosus; pileo carnoso albido - pallido rufescente glabro, lamellis albidis, basi simplicibus, stipite subbrevi crassi villoso concolore.

Dendrosarcos Cornucopiae. Paull. Ic. fung. t. 28. *Ejusd. Traité*, v. 2. p. 119.

Crescit autumno ad trunco variis arborum frondosarum, nonnunquam ad 20 individua aggregatus, quorum unum alterumve, pileo gaudet integerrimo infundibuliformi. Magnitudine fungi Ag. *ostreati*, a quo satis diversum censeo. Hujus varietas videtur Ag. *conchatus*, Fries Syst. p. 181. pileo tenaci difformi incarnato-cinnamomeo, lamel. basi integris. (Ag. *conchatus* Bull. t. 298.)

Obs. Bulliardus sub nomine Ag. *dimidiati* in Hist. fung. p. 385. tab. 298., 508. et 517., exclusis fere omnibus synonymis, plures confundisse videtur species, ex ipsis figuris vix dignoscendas. Tab. 508. forte est Agar. *ostreatus*. Tab. 517. affinis aut forte eadem species, ac Ag. *gyrinus*. Fig. O. an Ag. *salignus*? Tab. 517. f. 8. formam singularem sistit sequenti modo definiendam: Ag. *proliferus*, totus lutescens, pil. infundibuliformi

ut plurimum integro, lamell. longe decurrentibus; stipitibus basi unitis, proliferis. (Pil. 3 unc. fere longus. Stip. 2 unc. longus).

43. *spodoleucus*, subsolitarius, pileo plano subaequali cinereo, lamellis simplicibus albis, stipite glabro. *Fries Syst. p. 182.* †

In Suecia ad truncos Fagi, raro. Pileus subinteger. Lamellae eglandulosae, angustae, basi non anastomosantes. *Fr.*

An satis distinctus a sequente? An stipes semper glaber?

44. *allochrous*, subimbricatus magnus, pileo dilatato convexo - plano, basi depresso tomentoso, stipite laterali brevi albo tomentoso.

Ag. salignus. *Syn. fung. p. 478.* *Fries p. 183.* *Consp. fung. p. 229.*

$\alpha.$ *ochraceus*, totus ochraceus vel flavescens.

Abbild. d. Schw. 3. Heft. ic. Trattinn. Fung.

Austr. Fasc. 2. p. 43. t. 4. f. 8.

Dendrosarcus juglandis. *Paul. Icon. fung. t. 20.* (bis). Lamellis dilutioribus, et stipite vix ullo distinctus).

$\beta?$ *avellanus*, pileo dimidiato-imbricato, pileo lato glabro nitente-flavido, lamellis albis. *Decand. Flor. Gall. Suppl. p. 44.* *Thore chlor. Landin. p. 479.*

In Gallia meridionali ad truncos caesos praesertim populneos. Pileus 6-8 unc. latus,

celore nucis Coryli Avellanae. Recens odo-rem spargit violaceum. D.

γ. fuligineus, dimidiatus solitarius magnus, pileo rufescente, fuligineo, lamellis dilute cinereis, stipite subtuberoso albido villoso.

Obs. Mycol. 2. p. 45.

Autumno ad Salices vetustas, perraro. Stipes durus substrigosus. Substantia compacta sapore subacris. An species?

44. *corticatus*, caespitosus amplius, pileo flocoso-villoso cinereo, stipite excentrico incurvo fibrilloso, velo lacero albo. *Fries L. c. p. 179. Ejusd. Obs. 1. p. 92. et 94. (Agytrophotrichus).*

Ad trunco Fagi et Coryli cariosos. Stipes 1-2 unc. longus, 1 crassus. Pileus 2-6 unc. latus, margine involutus, albicans. Lamel. latae, postice anastomosantes. Fr.

45. *Lepiota*, caespitosus, pileo lato convexo dilute fuligineo, squamis pilosia nigricantibus, lamellis candidis, stipitibus annulatis.

Consp. fung. p. 229. †

Hab. in Lusatia, et unica modo vice reperitus in disco trunci abietini, medio Septembr. Pileus semiorbicularis, 4-5 unc. latus. Stipes brevis, crassus, marginalis, sed fere perpendicularis, supra annulum laevis candidus, infra eum nigrescente-squamulosus. Annulus ipse spectabilis, fuligineus. *Consp.*

Obs. Haec species, de qua icon valde

desideranda esset, anomaliam singularem offert, stipite annulato in pileo dimidiato; annulus tunc etiam dimidiatus esse debet, quod vera haud memoratur.

46. *dryinus*, solitarius dimidiatus, pileo compacto albido, squamis fuscocentibus distincto, lamellis decurrentibus, stipite excentrico subsquamoso. *Syn. fung.* p. 478. *Nees Syst. t. 22. f. 177.*

Agaricus dimidiatus. *Schaeff. t. 233. Commentar. p. 96.*

Ad truncos Quercus, etiam Mali. Pileus 2-3 unc. latus. Lamell. subrepandae. Stip. 1½ unc. fere altus, rugulosus. Sapor non ingratus. D. Fries hac in specie velum fugax observavit.

* *gibbosus*, subgregarius majusculus fuliginosus, pileo convexo-gibboso minute sparsimque piloso, lamellis conyexis decurrentibus stipiteque brevi laterali concoloribus.

Dendrosarcus cochlearis. *Paull. ic. t. 22. Ejusd. Traité, 2. 110.*

Quoad figur. Latitudine fere palmari, et una cum lamellis arcuatis 3 unc. fere altus. Esculentus ex auctore.

47. *juglandinus*, subgregarius, magnitudine mediocri, pileo compacto glabro pallescente-nitido, lamellis distinctis rotundato-adnexis albidis, stipite excentrico incurvo squamu-
loso. *Tab. XXIII. Fig. 4.*

Rarissime his in regionibus ad truncum Jugland. regiae mihi obvius.

Pileus 2-3 unc. latus, convexo - planus non squamulosus, fere integer, aut prope stipe pitem quasi truncatus. Lamellae supra stipitem prominent, non, aut parum decurrentes. Stipes duritie fere lignosus, ad basin rimoso-squarrosus. Odor fere farinaceus, sed fortis. Ab *A. odryino* pileo glabro et stipite differt.

48. serotinus, pileo carnoso compacto subviscoso olivaceo - virente, lamellis confertis subramosis pallidis, stipite sublaterali squamis nigrescentibus obsito. *Syn. fung. p. 479.*

Abbild. d. Schw. 3. ic. Fries Syst. 1. p. 187.

Flor. Dan. t. 1293. f. 2.

In Europ. boreali non rarus; sero autumno ad Jan. usque ad truncos Alni, Fagi et Betulae inveniendus. Stipes teres, crassiusculus, lutescens (etiam obsoletus ex Fries). Lamell. angustae, plerumque flavicantes; sed etiam albidae et incarnatae in Suecia. Pil. substantia firma; variat colore viridi, olivaceo, fuscescente, et nonnunquam rubelli quid habet admixtum. *Consp. fung. p. 229.*

49. pulmonarius, pileo obovato molli glabro cinereo - alutaceo, lamellis adnatis lividis, stipite lateraliter brevissimo villoso. *Fries Syst. 1. p. 187.*

Ad Betulae truncos prostratos, in Suecia, Octobr. Pileus (dimidiatus?) etiam subreniformis

mis, 2-3 unc. latus. Lamel. latae; simplices, ob situm stipitis decurrentes apparent, sed aequaliter et determinato - desinentes (abruptae?) Fr.

50. *craspedius*, caespitosus, pileo depresso gla-
bro cinereo-fusco, lamellis adnatis stipite
que excentrico brevi albis. *Fries l. c. Flor.*
Dan. t. 892. (*Ag. fimbriatus*).

Ad truncos in Dania. Pileus imbricatus,
horizontalis, magnitudine varius, ad 3 unc.
usque. Stipes rectus, glaber crassus (quoad ic.)

51. *stypticus*, gregarius et imbricatus parvulus,
pileo reniformi alutaceo-pallido subfa-
rinaceo, lamellis venose connexis obscurio-
ribus, stipite adscendente apice dilatato.

Syn. fung. p. 481.

A. *stypticus*, coriaceus, stipite laterali,
pileo dimidiato tenui, lamellis curvilineis, in
hemicyclum basi terminatis. *Bull. Hist. p. 389.*
t. 557. f. 1. *Trattin. Fung. Austr. p. 15. t. 1.*
f. 2. *Flor. Dan. t. 1292.* *Agaricus betulinus.*
Bolt. fung. t. 72. f. 1.

Autumno et hyeme leni ad truncos cae-
sos, plerumque quercinos, satis nitida haec
species crescit, quae variat colore plus minusve
intenso, pileo integre et stipite subcentrali.

55. *farinaceus*, caespitosus pileo flexuoso fusco-
umbrino, furfure albido-caesio consperso,
lamellis distinctis liberis (separatis), stipite

brevi laterali. *Fries l. c. p. 188.*: *Schum. Saelland p. 365.* †

Autumno in truncis caesis subputridis, in Dania et Suecia. Pileus $\frac{1}{2}$ -2 unc. latus, plicatus, umbrino - cinnamomeus, farinaceus, margine acutus. Lamell. venis non connexae (quo praesertim ab antecedente differre videatur) postice rotundatae, pileo paullo dilutiores. Stipes brevissimus, vel subnnullus. *Schum.* De sapore nil dicitur.

56. *mitis*, parvus subgregarius albus, pileo subcarnoso laevi, lamellis separatis; stipite brevi dilatato. *Syn. fung. p. 481.* *Obs. Mycol. 1. p. 54. t. 6. f. 3.* *Fries l. c. p. 188.*

Hab. locis montosis, in ramis Pini Abietis et Laricis, Insipidus, $\frac{1}{2}$ unc. fere latus. Lamel. confertae, angustae pariter albae. Stipes uti in antecedente, nonnunquam squamulosus, ex Fr. Pileus non imbricatus, glaber.

†[†] *Pleuropus. Excentrici.* Pileo integre regulari, aut obliquo, ut plurimum depresso, lamellis decurrentibus. Stipite breviusculo excentrico, adscendente. (Species plerumque ad truncos arborum adhuc vivarum crescentes).

57. *fornicatus*, solitarius compactus, pileo planiusculo rufescente - livido, lamellis distinctis subdecurrentibus rutilis, stipite brevissimo tomentoso subexcentrico. *Syn. fung. p. 474.*

Agaricus carnosus Bolt. t. 146. non male refert hanc speciem.

Provenit rarius in Germania et Anglia? ad truncos, forma peculiari distinctus. Stipes fere perpendicularis, longitudine et latitudine aequalis, $\frac{1}{2}$ unc. Pileus carno - coriaceus, ultra unc. latus. Lamellae demum subcrispae. * torulosus, pileo tenaci depresso alutaceo - rubescente, lamellis subcrispatis pallidioribus, stipite brevi griseo - tomentoso. Fries. p. 181. *Consp. fung.* p. 227.

Agaricus carneo - tomentosus Batsch. El. fung. t. 8. f. 33. Nees Syst. t. 21. f. 176.

Dendrosarcos Bavarix. Paull. ic. fung. t. 26. f. 3. et 4. (icon Batschii hic repetita).

Hab. in Germania, Suecia ad truncos Betulae. Pileus colore varius, subinde maculatus, demum fere infundibuliformis. Stipes crassus, aliquando etiam violaceo - tomentosus. Fr. — Caespites hujus fungi hinc inde in nemrosis obvii, truncos semiputridos involvunt praecoces, vigent enim Junio in autumnum usque *Consp. fung.* Secundum eosdem autores color est variabilis, sed semper in rubescentem tendens. Fungus ipse mihi nondum obvius et cum antecedente nimis cognatus, ut ejus varietatem dicerem, videtur.

58. *pulvinatus*, pileo pulvinato subrepando carnoso - suberoso glabro albido, disco pallido - incarnato, lamellis confertis decurrenti-

bus albis, stipite brevissimo duro. *Syn. fung.* p. 370. *Fries* p. 280.

In Germania et Suecia perraro ad truncos. Pileus 4-5 unc. latus, planiusculus, rugulosus, laevis. Lamellae convexae, 2-3 lin. latae. Stipes $\frac{1}{2}$ longus et totidem fere crassus. Sapor gratus.

59. *candidus*, magnus albicans, pileo subdimidiato squamoso, lamellis crassis decurrentibus, stipite excentrico subperpendiculari crasso.

Agaricus candidus. *Schaeff. fung. t. 225.*

Comment. p. 92. satis convenit.

Hab. ad truncos in Germania et Gallia. Latitudine palmari, valde carnosus. Lamel. sublatae. Stip. unc. 1 longus, $\frac{1}{2}$ crassus, ab. bus, glaber.

60. *inconstans*, submagnus, pileo depresso integro aut dimidiato lobato flexuoso subrufescente, lamellis subramosis, basi crispis, ex albo rutilantibus, stipite fuligineo. *Syn. fung. p. 475.*

Agaricus flabelliformis Schaeff. t. 43-44.

Ad truncos Fagi, Stipes brevis, nunc centralis, nunc lateralis, fuligineus. Pileus substriatus saepius emarginatus, tenax.

61. *atrotomentosus*, magnus, pileo carnoso fusco-ferrugineo, lamellis lutescentibus, basi subanastomosantibus, stipite curvato firmito tomentoso. *Syn. fung. p. 472. Fries Syst.*

p. 272. Batsch. El. fung. t. 8. f. 32. Nees f. 175.

B. omphalodes, pileo infundibuliformi, stipite centrali atropurpureo. Consp. fung. p. 226.
g.? *pannoides*, luteus, pileo carnoso sessili obovato glabro, lamel. subramosis crispatis.

Fries l. c. p. 273.

Rarius ad truncos salicinos, *B.* in Lusatia et Suecia, in truncis pineis frequenter crescit. Stipes radicatus, 2 unc. circiter longus, tomento denso molli fusco-violaceo, atropurpureo vel griseo, obductus. Pileus siccus, margine involutus, resupinatus et vertice porrecto ex Fries, hinc ejus Ag. *pannoides* Syst. p. 273. mera varietas videtur.

62. *olearius*, magnus caespitosus, pileo subdepresso glabro fusco-badio aut ferrugineo, lamellis densis decurrentibus, stipite crassissimo subexcentrico, deorsum attenuato.

Agaricus *olearius*. Decand. Flor. Gall. Supp. p. 44. Fungus pernicious. Mich. gen. p. 191. nr. 3.

Dendrosarcos Oleae. Paul. Ic. fung. t. 24. f. 1. et 2. Ejusd. Dendros. phosphoreus t. 24. bis. (Figura melior). Ej. D. Illicis et Carpini, l. c. male picti, varr. vindentur.

Crescit in Italia et Gallia meridionali, ad radices denudatas Olearum. Ex Decand. passim quoque invenitur in truncis Carpini Sy-

ringae, et Querc. Ilicis. Fungus valde venenatus; et singulari est natura, in obscuritate lucere. Etiam forma variabilis, praesertim quoad situm stipitis, qui nunc lateralis est, nunc excentricus, rarius centralis, carneofibrosus et pileo concolor. Color pilei viride aureo-rufus, subtus obscurior, latitudine palmari.

* *phosphoreus*, caespitosus pileo infundibuliformi primo aequali, dein obliquo, croceo-coccineo lucido, stipite incrassato duriusculo subcavo extus intusque lateo.

Polymyces phosphorus. Battar. p. 39. et 40. t. XIV. f. E. et t. XIII. f. A. et B.

„Octobri in Italiae sylvis et agris legitur, frequentius tamen ad *Olearum* radices. Pedunculi (stipites) varii, tubiformes, carnosofibrosi, duri, externe luteo-crocei. Ludit mirum in modum forma et in sulcis est elegans phosphorus. *Esculentus*.“ Bat.

Obs. Vix dubium videtur, quin idem ac antecedens sit fungus, qui ab omnibus mycologis tamen ut perniciosus habetur, ac hicce *esculentus* praedicatur.

63. *tessellatus*, stipite pleno nudo obliquo brevi, pileo tessellatim picto, lamellis stipti continuis basi aduncis latissimis. Bull. (Venten.) Hist. d. Champ. p. 583. t. 513. f. 1.

A. *tessulatus*, pileo convexo tenaci subobliquo, guttato-marmorato dilute ferrugineo,

lamel. adnatis albis, stipite brevi excentrico.
Fries p. 186.

Innascitur trabibus et truncis arborum, praesertim Pyri Mali, ut plurimum solitarius. Stip. 2 unc. longus, 4-6 lin. crassus, arcuatus, sublateralis. Pileus 3 unc. fere latus. l. c.

B. guttatus, pileo carnoso compacto subconvexo fuligineo-pallido, maculis rotundis subobscurioribus notato, lamellis confertis albis, stipite solidō excentrico concolore.

Semel tantum inveni in trunko adhuc vivo Querc. pubescens, prope Parisios. Forte mera antecedentis varietas. Odorem habebat fortē et saporem amaricante-nauseosum.

64. *ulmarius*, caespitosus albopallescens, aut griseus, pileo carnoso duriusculo glabro, lamellis confertis latissimis, stipite duro sublongo horizontali. — Sowerb. fung. t. 67. (optima).

Inveniendus mense Novembri ad trūcos Ulmorum, sed non equidem communis est, nec facile colligendus. Ex maximis et utilibus, sapore grato praeditus. Pileus plerumque 4 unc. latus, sed tempestate favente etiam latitudine spithamea, cum lamellis, quae non decurrunt, unc. 1 crassus. Stipes 3 unc. longus, 2 fere crassus, aliquando centralis et erectus.

Obs.

Obs. Figura Buddiardi de hoc fungo, tab. 516. expressa, non bene quadrat in specimina a me observata, et forsitan varietas est Agarici pulmati ejusdem auctoris.

64. b. *palmatus*, cespitosus, pileo laevi glabro rufescente, lamellis adnatis concoloribus, stipite excentrico glabro dilutiore. Fries Syst. 1. p. 186. Bull. tab. 216. Sowerb. t. 62.

Ad truncos Quercuum, Ulmarum et ad ligna fabrefacta, sed perraro. Pileus stipes sublateralis, adscendens, sed non equidem crassus, $\frac{1}{2}$ unc. fere. Lamellae latiusculae, non decurrent. Pileus convexo-planus, latitudine palmati.

65. *austerus*, subcespitosus, pileo subcarnoso semiorbiculari glabro albo-pallente, lamellis latis rotundato-adnexis albis; stipite subexcentrico villoso.

Ad truncos Ulmeos moribundos passim inveni, mense Decembri.

Stipes, ob situm, incurvus, subhorizontalis subbrevis, 2-3 unc. longus, 3-4 lin. crassus, albus, villo sat denso obsitus. Lamel. $\frac{1}{2}$ unc. latae, planae, non decurrentes, margine erosae. Pileus 3 unc. latus, exacte hemisphaericus, unicolor, ad tactum gravis, humidus; substantia compacta, lin. 1-2 crassa, nivea. Odor fortis et sapor fastidibilis, hinc non edulis, uti Ag. *ulmarius*, a quo etiam stipite villoso differt.

Sectio tertia.

D

* *trabeus*, submagnus, compactus, pileo glabro
margin'e deflexo pallescente, lamellis conser-
tis tenuibus, postice rotundatis albis, stipite
brevissimo crasso excentrico glabro?

Ad ligna exsiccata, trabes, autumno rarius
nascitur. Stipes ultra unciam longus et cras-
sus, durus laevis, albido-pallens. Lamellae
3 lin. latae. Pileus 4-6 unc. latus. Odor sa-
porque fortes.

Obs. Ab antecedente, quocum multis no-
tis convenit, praesertim in stipite, de quo in-
certus sum an glaber sit, uti videtur, quoad
speciem discrepare videtur.

66. *dasypus*, subcaespitosus, pileo carnos'o
convexo murino, lamellis emarginato-adne-
xis candidis, stipite tenace villoso. *Syn.*
fung. p. 348-349.

Hab. in Germania ad truncos quercinos.
Stipes tomento brevi denso obtectus, durus.
Lamel. 3 lin. latae non decurrentes. Pileus
3 unc. latus, compactus, subinde tessellatus.
Odor et sapor fortis; amaricans. — Antece-
denti affinis, ab eo tamen lamel. et stipite vix
excentrico diversus.

††† *OMPHALIA*. *Pileo carnos'o aut carnos'o-meth-*
branaceo, orbiculari, integro (non dimidiate),
umbilicato aut infundibuliformi, lamellis decur-
rentibus, stipite solid'o vel subcavo (non fistu-
loso) centrali.

* *Pileo flavescente, fusc'o, squamuoso.*

67. *Auricula*, solitarius terrestris, pileo tenaci infundibuliformi, uno latere inciso, e palecente subfuligineo, lamellis congestis candidis, stipite brevissimo crasso subvilloso.

Rarissime in sylva prope St. Cloud, autumno ad terram collegi speciem hanc, forma peculiari instructam, et inter Omphalias et dimidiatas intermediate. Pileus quidem est orbicularis, sed uno latere usque ad basin incisus. Lamellae angustae, decurrentes, nonnullae subdichotomae. Stipes $\frac{1}{2}$ unc. altus et latus, villo tenui obtectus. Totus fungus simplex latitudine palmari, substantia e carnosō subcorriaceus, recens glaber quidem, sed exsiccando in disco tomento brevi compacto canescit. Cum A. *Ascaeо* affinitatem habet.

68. *cochleatus*, cespitosus, pileo infundibuliformi lobato - contorto obscure rufescente, lamellis dentato-serratis pallidis, stipitibus sulcatis basi connatis. *Syn. fung. p. 450.* Abbild. d. Schw. 3tes Heft ic. *Consp. fung. p. 218.*

Agaricus confluens. *Sowerb. t. 168.* *Ag. cornucopioides*. *Bolt. t. 8.* (mediocris).

3. *dentatus*, subgregarius, pileo umbilicato regulari integro aut dimidiato, lamellis dentatis albidis, stipite sulcato rufescente. *Syn. fung. p. 476.* *Fries p. 178.* *A. intermedius. Schum. Saell. p. 361.*

In Anglia, Germania et Suecia in truncis

fagineis aut abietinis provenit, forma pilei cochleari (in α), et odore aniso persistente facile dignoscendus.

69. *suffrutescens*, pileo subinfundibuliformi sublateritio, lamellis decurrentibus concoloribus, stipite longo ramoso sublignoso albo-virescente. *Brot. Flor. Lusit.* 2. p. 466.

Hab. in lignis humidis et putrescentibus in cellis Coimbricae in Lusitania. Stipes 4-6 unc. longus, lignosus, perennis et ramosus, ramis pileoliferis pluribus distinctus. Var. sequentis?

70. *polymorphus*, pileo compacto inaequali dilute ochraceo, squamis maculae-formibus obscurioribus, lamellis dentato-laceris, stipite valido squamoso. *Fries Syst.* p. 176. (*A. lapideus*).

Agaricus squamosus. *Schaeff. t. 29. et 30.*
B. tubdeformis, stipite elongato tereti, medio fuliginoso, basi rufo, apice pallidiore; pileo juniori convexo, demum concavo, lamellis decurrentibus laceris. *Decand. (fil.)* in *Annal. des Scienc. Naturell. Tom. 1. 1824.* p. 347. fig. 1-4. *Schaeff. t. 248-249. Sowerb. t. 382. Flor. Dan. t. 1438.*

y. ceratoides, totus ramosus absque pileis. *Flor. Dan. t. 405. Ramaria ceratoides Holmsk. Fung. Dan. p. 101. ic.*

Clavaria lignosa *Dickson. Clavaria thermalis. Decand. Syn. p. 20. nr. 266.*

3. pileo intègrō aut dimidiato, squamis ferrugineo - spadiceis, stipite curvo subferrugineo - reticulato.

Agaricus tessellatus. B. dentatus. Consp. fung. p. 226.

4. *proboscideus*, grandis regularis; stipite recto aequali glabro: aliis sterilibus proboscideis oppositis. *Battar.* p. 36. t. XII. f. A.

In Italia supra Populi putridi corticem repertus. Ex brevi descriptione spithamam latus esse debet; et „alia fungosa corpora circa eum aderant, quae proboscidem aemulabantur.“ *Battar.*

Ad truncos variarum arborum, in Eur. boreali, praesertim pineos crescit, aestate. Ex allatis varietatibus speciem valde variabilem esse liquet, praesertim si in cellis aliquique cryptis provenit. *A. tigrino* omnino similis, sed major et magis coriaceus est, etiam lamellarum natura differt.

71. *tigrinus*, gregarius, pileo umbilicato albidō, squamis pilosis nigrescentibus, lamellis confertis subdenticulatis, stipite subtereti squamułoso. *Syn. fung.* p. 438. *Sowerb.* t. 68. *Bull.* t. 70. et ejusd. *Ag. mollis*, secundum ipsum auctorem (vid. *textum*, p. 508.) *Battar.* t. XII. fig. C. et B. (stipite glabro).

8. *lepidopus*, minor, pileo inciso, stipite squamis densis imbricatis squarroso. *Batt.* l. c.

fig. D. et ejusd. Bulla caule squamoso. p. 57.
t. XXVIII. f. h.?

Provenit species sat pulchra, jam mature aestate pluviosa ad truncos, praesertim Salicis albae. Recens jam odorem spargit parum ingratum, sed putrescendo foetentem, sapore etiam substyptico est. Stipes ob situm fere excentricus, sed durus et elasticus. Pileus 2-3 unc. latus.

72. *Dunalii*, pileo inaequali albido infundibuliformi, squamulis nigricantibus, margine subrevoluto, stipite submolli albido, basi squamis nigricantibus munito. *Decand. Fl. Gall. Suppl.* p. 46. *St. Amans Fl. Agen.* p. 575. t. 12.

Crescit ad truncos Salicis in Gallia meridionali. Stipes aequalis (cylindricus). Pileus saepius excentricus, irregularis, margine revoluto nigricante. Lamellae crispae. Substantia fungi tenuis, coriacea. Odor gratus. *St. Amans.* Parum ab *A. tigrino* differt, an ejus var?

8. *dichotomus*, pileo infundibuliformi, squamis fuscescentibus, lamellis denticulatis subcrispis, stipite longo tortuoso furcato-ramoso albido, basi nigricante. *Brondeau* (ex Descr. et fig. communicatis cum Soc. Linnaeana).

Ab auctore repertus fuit in Salice quadam excavata, prope Estralle, humo plana, in qua stipes erat immersus, basi tamen trunko ad-

hercynia, unde difformis factus. An potius var. *A. polymorphi*?

73. *affricatus*, pileo albido, squamulis pilosis cinereis, lamellis latis stipiteque cavo griseus. *Fries Obs. Mycol.* 2. p. 213.

Agaricus tigrinus. *Consp. fung.* p. 220. quoad locum natalem terrestrem, secundum D. Fries.

In Sueciae paludosis frequens. Majo-Junio. Pileus profunde umbilicatus, etiam infundibuliformis, $\frac{1}{2}$ unc. latus, carnoso-membranaceus, interdum griseo-pallidus. Stipes fistulosus, glaber, unc. 1 altus, lin. 1 crassus. *l. c.*
 74. *trichaeus*, pileo carnoso alutaceo umbilicato, squamis pilosis sparsis, lamellis dentatim decurrentibus stipiteque cavo luteis. *Syn. fung.* p. 451.

Crescit ad ligna Pini putrescentis, praesertim in Hercynia. Pileus opacé ochraceus, subviscosus quasi, 1 - 2 unc. latus. Lamell. sublateæ. Stipes glaber, incurvus.

75. *bellus*, pileo carnoso-membranaceo umbilicato squamuoso aureo, lamellis dentato-connexis pulverulentis stipiteque subtenui dilutioribus. *Syn. l. c. Consp. fung.* p. 218.

Solitarius vel caespitosus nascitur in truncis cariosis abietinis, in Hercynia et Lusatia. Stipes unc. 1 longus, tenuis, sed parum tenax. Lamell. apice divisae. Pileus irregularis, unc. 2 - 3 latus, dēmum fere planus, squa-

mulis plerumque fuligine quasi afflatis distinctus.
ex Conspectu.

76. *chrysotrichus*, cespitosus, pileo carnoso-
membranaceo umbilicato albido, lamellis
distantibus sulphureis, stipite cavo albo bre-
vi. *Syn. fung. p. 457.* (excl. var. *B.*)

Etiam in Hercyniae abietinis ad truncos
crescit. Stipes quoque incurvus, ob locum,
brevis et subtenuis; in fungo juniore solidus.
Pileus subplicatus, unc. i latus, demum pal-
lescit.

77. *splendens*, pileo carnoso plano-depresso
glabro obscure helvolo splendente, lamellis
congestis tenuibus albis, stipite elastico fle-
xuoso, basi villoso. *Syn. fung. p. 452.*

Rarius in fagetis repertus ad terram. Sti-
pes solidus, parum longus, ex albido pileo
subconcolor. Pileus 2-3 unc. latus, sapidus.

78. *turundus*, solitarius, :pileo subcarnoso de-
presso luteo cinereo-squamuloso, lamellis
decurrentibus flavo albis, stipite elongato
fistuloso fulvo nitido. *Fries. Obs. Mycol. 2.*
p. 199. Ej. Syst. 106.

In Sueciae sylvis inter frutices et grami-
na, aestate et autumno. Stipes 2-3 unc. lon-
gus, aequalis, tenuis, rigidus. Pileus leviter
carnosus, unc. i fere latus, umbilicatus, ju-
nior convexus, luteus squamulis cinereis. La-
mel distantes. *Fr.*

Obs. Secundum suetorem proximus A. *coccineo* vel ejusd. *miniatu*, sed in *Obs. Myc.* l. c. cum *bello* etiam comparatus, hinc ex ob lamel. decurrentes, cet. hic insertus est.

79. *squamulosus*; pileo subtenaci late umbili-
cato minute squamuloso subincarnato aut
rutilante alutaceo, lamellis distinctis albidis;
stipite solido longo subtemuli. *Syn. fung.*
p. 450. *Fries Obs. 2. p. 197.*

Rarius in pinetis occurrit. Stipes basi
villo albo foliisque acrosis dense obtectus,
aequalis, 2 $\frac{1}{2}$ unc. longus, 3 lin. crassus, pileo
concolor. Lamel. non valde decurrenti, an-
gustae. Pileus 2 unc. et ultra latus, parum
carnosus, elasticus, in adultis subflexuosit.

80. *diatretus*, pileo subcarnoso planiusculo
subumbilicato incarnato glabro, sicco albido,
lamellis decurrentibus stipiteque farcto aequali
candidis. *Fries syst. fung. p. 83.* *Ejusd.*
Obs. Mycol. 2. p. 200.

In sylvis muscosis, pinetis passim. Pi-
leus etiam saepe convexo-planus et lamel.
minus decurrentes; ille tenax subflaccidus,
unc. 1 fere latus. Stipes 1 - 2 unc. longus,
1-2 lin. crassus, tenax. *Fr.*

81. *sinopicus*, pileo subcarnoso umbilicato te-
nui glabro subcinnabarino, lamellis decur-
rentibus candidis, stipite aequali farcto rubro.
Fries l. c. p. 83.

A. In sylvaticis humidia. Solitarius et gregarus. Stipes uncialis, fibrillaq; radicales cum perticula heterogeneis bulbum saepe formant. Pileus orbicularis, leviter carnosus, carneo-cinnabarinus, exsiccatus pallescens, tenui latus, demum irregularis. Fr. 82. *flaccidus*, gregarius subcespitosus, pileo infundibuliformi tenui flavo ferrugineo, lamellis confertis angustis dilutioribus, stipite farcto, basi incurvo repente ibique viloso. Sowerb. t. 165. Bull. t. 553. (Ag. infundibuliform.)

B. A. *flaccidus*, pileo tenaci infundibuliformi obtuso laevi flaccido, lamellis decurrentibus albidis, stipite farcto basi incrassato viloso. Fries Syst. 1. p. 81.

Hab. in Anglia, Suecia. Meum fungum non raro autumno inveni circa Parisios, inter folia decidua putrescentia, in sylvis frondosis. Pileus 3 unc. fere latus glaber, colori corii humectati similis, demum parum rutilans, tenuis. Lamellae arcuatae, primo parum albidæ, sed matutæ lutescunt. Stipes dimidia fere parte foliis obtectus, 2-3 unc. longus, 3-4 lin. crassus. Sapor styptico - nauseosus. Secundum D. Fries, colore variat candido, pallescente, ferrugineo et eleganter incarnato. 83. *gilvus*, magnus, pileo convexo obtuso dein infundibuliformi laevi rigido, lamellis decurrentibus e pallido gilvis, stipite farcto

subradicato, basi viloso. *Fries L. c. p. 80.*
Flor. Dan. t. 1606.

Agaricus subinvolutus. Batsch. El. fung.
cont. 2. p. 58, t. 37. f. 204.

Ag. cinnamomeus. Bolt. t. 22. A. cys-
thiformis. Flor. Dan. t. 1012.

Inter muscos et folia in pinetis et fagetis,
 in Suecia praesertim frequens dicitur.

Ex Fries stipes variat longus et perbre-
 vis mollis, crassitudine aequalis. Pileus sub-
 compactus, 3-4 unc. latus, submaculatus, hu-
 midus. Lamell. congestae, angustae, saepe
 ramosae. Color variat cinnamomeus, testa-
 ceus, alutaceus et incarnatus!

84. *gibbus*, pileo subtenui pallido infundibu-
 liformi umbonato, lamellis decurrentibus
 albis, stipite elasto subbulboso, pileo con-
 colore. *Syn. fung. p. 449. Consp. fung.*
p. 217. β. fuliginea.

Hab. in Germania, in pinetis et fagetis;
 etiam graminosis et muscosis, fineunte autum-
 no. Stipes 1 $\frac{1}{2}$ unc. longus, cavus. Pileus
 submollis, pallens, „nunc in flavidum, nunc
 in incarnatum subtendens. Umbo nunc valde
 distinctus et majusculus, nunc obliteratus.“
Consp.

85. *suavis*, subsilitarius, pileo carnoso-sub-
 coriaceo pallide helvolo umbilicato umbone-
 que subacuto distincto, lamellis planis decur-
 rentibus angustis, stipiteque sublongo pleno

*candidis. Agaricus cyathiformis. Bull. t. 948.
f. 13.?*

Frequens his in sylvaticis una cum Merchantarelo apparet. Odore est gratus, ut Ag. campestris, sed saepe parum adstringens. Pileus subpellucidus, sed substantia elastica, rigida, glaber, laevis, colore obscure alutaceus, $1\frac{1}{2}$ - 2 unc. latu^s, etiam absque umbone inventur. Lamel. vix lin. 1 latae, utrinque attenuatae. Stipes 2 unc. fere longus, 2-3 lin. crassus, elasticus, subtuberosus, villo sat denso cum terra aut foliis deciduis adhaeret.

86. lobatus, gregarius, pileo infundibuliformi tenui spadiceo, margine lobato, lamellis fuscescentibus, stipite deorsum incrassato, subelongato. Sowerb. t. 186. Fries Syst.

p. 94.

Hab. ad pedes arborum in Anglia, etiam prope Holmiam observatus a b. Swartz. Magnitudine communi. An forma pilei constans? *B.?* *fimbriatas* sordide albido, pileo demum infundibuliformi laevi, margine sinuato lobatoque, lamellis adnatis tenerimis, stipite farcto breve. *Fries L. c. Bolton. t. 61.*

Hab. in Anglia, et in Suecia, ad terram et in ligno carioso, gregarie aut caespitoso. Pileus subdifformis, parum carnosus, 3 unc. latus, junior plano-convexus, saepe excentricus, expallens. Lamell. congestae, valide an-

gustae, saepe furcatae. Stipes glaber vix uncialis. Fr.

87. *rufus*, cespitosus, pileo infundibuliformi villoso atrorubo lineato-saleato, lamellis crassis rufis, stipite sublongo aequali incurvo. *Polymyces umbilicatus rufus*. *Battar.* p. 40. t. 23.

Ad sectorum quercuum truncos plerumque pullulat, tam in agrorum limitibus, quam in sylvis, austerus sapore est. *B.* Ex iconе. Stipites plures basi uniti, 3 unc. longi, 3 fere crassi, solidi, subrufi. Lamel. longe decurrent. Pileus $2\frac{1}{2}$ unc. latus, margine expansus, „cutis superior villosa, ut pannum, et atrorufa, quae etiam inter sulcos insinuatur, et utrimque sulcatus appetet fungus.“ *B.*

88. *flavicans*, magnitudine mediocri, pileo infundibuliformi glabro helvolo, margine fornicato, lamellis subbrevi-decurrentibus, stipiteque subincurvo flavescentibus. — *Sowerb.* t. 360. (*A. flavidus*). Ag. incurvus. *Schaeff.* t. 65.?

Hab. in Anglia. Colore et forma (non nullis Lactariis simili) communi gaudet; distincta tamen species videtur. Ex iconе, pileus 3 unc. fere latus, parum carnosus. Lamel. non confertae, nec valde latae, neque longe decurrent. Stipes $1\frac{1}{2}$ unc. fere longus, $\frac{1}{2}$ crassus glaber, solidus, basi fuscatus.

89. *inornatus*, submagnus; pileo infundibuli-formi lutescente-olivaceo, lamellis confertis primo planis; dein decurrentibus, stipiteque deorsum subincrassato pallide fuligineis. — *Sowerb.* t. 342. *Fries Syst.* p. 93.

Habitat in Anglia, ad terram, in sylvis? Si non colore, tamen forma satis pulchra. Stipes farctus. Lamellae aequales, sublatae.

90. *involutus*, gregarius compactus - subhepaticus vel obscure lutescens, pileo carnosò depresso concavo, margine involuto tomentoso, lamellis nonnullis dichotomis, basi subporiformibus dilutioribus, stipite brevi subcrasso. *Syn. fung.* p. 448. *Batsch. El.* t. 13. fig. 61. (*fungus adhuc junior*).

Agaricus contiguus. *Bull.* t. 246. *Sowerb.* t. 98. *A. cyathiformis*. *Schaeff.* t. 252. *A. lateralis*. *Ejusd.* t. 72. (*Ag. adscendens Bolt.* t. 55. *A. vinosus*. *Bull.* t. 54. fig. malae).

Hypophyllum Scyphus. *Paull. ic. fung.* t. 62. et *Ejusd.* *Hypoph.* infundibuliforme t. 63. f. 1. 2.

In sylvis locisque arenosis (circa Parisios copiose) crescit ad terram, aliquando quoque in truncis occurrit, aestatis fine in serum autumnum usque. Habitu a ceteris Agarieis divergit, et Boletis accedit, quibuscum etiam sapore acidulo congruit. Stipes plerumque brevis, sed in speciminiibus luxurantibus, a nimis pluviis ortis, quoque ad 2-3 unc. elongatus; pileo

tunc margine erecto et fere glabro. Lamellæ subsucculentæ, et laesæ fere lactescunt.

β. stillans, pileo carnoso convexo-plano rufulo-pallente: margine involuto sulcato pubescente, guttulas roridas stillante, lamellis angustis dilute citrinis, stipite crasso pallente-albō.

In sylvula quadam Castanea, circa Parisios repertus. Stip. 2 unc. longus, compactus. Lamellæ lanceolatae, pariter dichotomae. Sapori huic erat parum acris, raphanoides, sed non ingratus.

Obs. Si plures species inveniuntur, huic conformes, tunc ex iis genus distinctum efformari posset, *Rhythovis* forte denominandum.
γι. propinquus, submagnus alutaceo-cervinus; pileo infundibuliformi margine glabro repando, lamellis confertis basi simplicissimis, stipite brevi crasso albido-pallescidente.

β. spadiceus, pileo leviter depresso glaberrimo laevi spadiceo, lamellis simplicissimis dilutioribus, stipite brevissimo crasso laevi colore.

In sylvis prope Parisios. Pil. in α latitudine palmari, in β fere totidem, laevis et glaber, sub lente vero inspectus squamulas valde exiguae habet, passim obliquus, juniorum involutus. Lamell. subperpendiculares, angustae, in β latiores et valde confertae. Stipes unc. 1 aut paullo ultra longus, totidem fere crassus,

subtenuente minute squamulosus. Caro compacta siccata primo dulcis dein substiptica. Fungus edulis videtur.

Obs. Habitu omnino cum sequente convenit, sed ab eo lamel. nec dichotomis, nec basi poriformibus recedit.

92. *muralis*, parvulus, pileo umbilicato deflexo radiato striato, stipiteque farcto fusco-rufescens, lamellis latis pallidis. *Fries*

*Syst. a. p. 165. Swartz Act. Holm. 1809.
p. 94. Sowerb. t. 322.*

In Suecia in graminosis crescit, et in Anglia communis supra vetustos muros. *Fun-gillus serotinus*, *gregarius*, unc. latus, subinde marginibus erectis perulae ad instar contrahitur. Stipes vix unc. longus, solidus aequalis. Lamell. brevi decurrentes.

93. *turfosus*, *gregarius* parvulus, pileo late umbilicato margine reflexo repando zonato (?) fusco-pallido, lamellis distantibus pallidis, stipite brevissimo. *Sowerb. t. 210.*

In Angliae turfosis adhuc inventus. Pileus umbraculiformis, $1\frac{1}{2}$ unc. latus, quoad picturam zonis distinctus. Lamel. arcuatae, breviter decurrent, apice divisae. Stipes solidus, $\frac{1}{2}$ unc. fere longus, pileo concolor.

β. *sabulosus*, pumilus helvolus, pileo umbilicato, lamellis distantibus albidiioribus, stipe brevi subsolido.

His

His in locis perraro eum legi, locis arenosis inter gramina. Antecedente dimidio fere minor, a quo non male separari potest, etiam ob locum natalem diversum. Lamellae simplices et apice furcatae. Pileus non zonatus.

94. *fragilis*, parvus, pileo subcarnoso convexo repando umbilicato helvolo l. obscure ochraceo, margine dilutiore, lamellis breve de currentibus, stipiteque gracili subbrevi dilutioribus. — *Batsch. El. fung. p. 87. t. 39. f. 215. Mart. Flor. Erlang. p. 430.*

Hab. in Germaniae pinetis, rario. Tener, subhumidus. Pileus margine sublobatus, subviscosus cameratus, unc. 1-2 latus, subdiformis. Lamel. carneo-testaceae. Stip. 1-2 lin. crassus, deorsum tenuior, udas.

95. *muscorum*; *gregarius*, subparvus, pileo hemisphaerico umbilicato striatō flavo fusco, lamell. distantibus? plano-adnexis pallidioribus, stipite curvato deorsum incrassato, interne tenuiter excavato. — *Hoffm. Nomencl. fung. p. 181. t. 5. f. 3. Martius L. c. p. 431.*

Inter muscos ad arborum truncos, pas sim, praesertim locis montosis. Pilei juniorum fere globosi, et stipites turgidi. Lamellae valde latae videntur.

96. *Campanella*, subcaespitosus, pileo con vexo umbilicato striato ferrugineo, lamellis flavescentibus, stipite spadiceo, deorsum vil-
Sectio tertia.

E

losò. Fries Syst. 1. p. 166. Nees f. 191.

A. fragilis. Schaeff.

In Europæ præsertim borealis et in alpestribus, ad truncos pineos sat communis provenit valde gregarie. Stipes sat firmus, unc. fere longus, lin. crassus, aequalis. Lamel. venis connexae. Pileus pellucidus, $\frac{1}{2}$ unc. latus.

97. *tricolor*, parvus, pileo membranaceo - subcoriaceo, umbilicato aut infundibuliformi ochraceo - flavo, lamellis distantibus subramosis aurantio - roseis, stipite tenuissimo facto. — Conspl. fung. p. 229. Fries l. c. p. 166.

Hab. in Lusatia et Suecia, locis graminosis subumbrosis, et pasciis, aestate et autumno. Stipes tenax, unc. 1 longus, deorsum fuscescens. Pileus 3-4 lin. latus. Lamell. triquetrae, versus basin enim latissimae sunt, demum pruna rosea obtectae.

98. *anthodius*, subumbrinus gregarius parvulus, pileo infundibuliformi plicato - striato, lamellis distinctis latiusculis decurrentibus dilutioribus, stipite longiusculo glabro.

Ad latera sylvarum, locis arenosis satis pulchellam hanc speciem, fasciculum florum referentem, prope Parisios inveni. Pil. 4 lin. latus, tenuis pellucidus, fragilis. Stipes unc. $1\frac{1}{2}$ & longus, lin. 1 crassus. A sequente diversum puto.

B. rufo-pallens, subparvus, pileo subfragili umbilicato alutaceo-pallido, lamellis distinctis pallentibus, stipite longiusculo dilute rufescente.

Autumno rarius ad terram invenitur, antecedentis forma, nonnullis notis tamen differt. Stipes $\approx \frac{1}{2}$ unc. longus, \approx lin. crassus: nonnulli basi inter se cohaerentes fasciculum efformant, ad tactum' firmi. Pil. unc. 1 et paullo plus latus, parum fragilis, mollis, sed glaber, depresso-umbilicatus, subolidus.

99. *pyxidatus*, sparsus parvulus ligneo-pallens, pileo umbilicato ruguloso, lamellis distinctis, stipite subattenuato farinaceo. —

Bull. t. 568.

A. *pyxidatus*, testaceo-rufescens expal-lens, pileo infundibuliformi, disco laevi, lamel. angustis, stipite firmo. *Fries*, p. 164.

Provenit serius in sylvis, locis apertis ad terram. Pileus, in meo fungo, 4 lin. ad $\frac{1}{2}$ unc. latus, pallescens, et exsiccando parum albicans, glaber, humidus substriatus. Lamel. decurrentes, lutescunt. Stipes unc. 1 - $1\frac{1}{2}$ longus, lin. 1 crassus breviter pubescens, praesertim basi. Ex Fries magnitudine valde variat, item et colore, qui incarnatus, testaceus, sordide fulvus, rufus, etc.

100. *Fibula*, gregarius pumilus, pileo umbili-cato rubescente-ochraceo, lamellis distanti-bus arcuatim decurrentibus albidis, stipite

subelongato glabro pileo concolore. *Syn. fung. p. 470. Bull. t. 550. f. 1. Sowerby t. 45.*

Cresc. ad truncos, aut ad terram inter mustos. Pileus orbicularis, opacus, subrugulosus, sed non striatus, parum carnosus, ab initio etiam convexus (et tunc Ag. *clavus* Linn.?), dein subdepressus. Stipes primo farctus, postea cavus, unc. $1\frac{1}{2}$ longus. Lamel. basi latiores, subdistantes, dein pallescunt. Species pulchella, firma.

Obs. Nonnullae hujus speciei ut varietas aut subspecies habentur, colore et quoad substantiam ut diversae forsitan aestumandae.
α. nivalis, totus flavus, pileo carnosomembranaceo. *Flor. Dan. t. 1072. f. 2. Syn. fung. p. 455.* In Norwegiae montibus.

β hydraceus, major, pileo subinfundibuliformi membranaceo ochraceo, radiis obscurioribus ramosis striato, margine deflexo nonnunquam undulato - lobatus, stipite brevi, dein fistuloso glabro vel basi pubescente, lamel. flavescentibus. *Fries Obs. Mycol. 1. p. 90.*

(In sylva deusta paludosa lecta).
γ. tubiformis, totus rufus, pileo umbilicato striato, lamellis rarioribus, stipite tenui rigido sublongo.

Bulla tubiformis radiata. Battar. p. 59 t. 23. f. γ.

Autumno vulgatissimus, in Italia. An distincta species?

101. *Swartzii*, solitarius parvulus, pileo plano-flavescente, umbilico sub spadiceo, lamellis longe decurrentibus albis, stipite elongato pallido, apice fusco-violaceo, aut purpureo-nascente.

A. *Swartzii*, firmior, pileo laevi albido, disco fusco, stipite albido, apice subviolaceo. Fries l. c. (var. *Fibulae*).

Pulchellum hunc fungillum non valde raro, his in regionibus autumno inter muscos reperi, et tanquam species distingui omnino meretur.

Stipes villositate alba foliis vel muscis adnatus, $1\frac{1}{2}$ -2 unc. longus, sed tenuis, $\frac{1}{2}$ lin. crassus, firmulus, subglaucus, bicolor. Lamellae tenues, fere recte decurrent. Pil. 3 lin. latus, subrugulosus, sed non plicatus, subcarnosus, glaber.

102. *urceolatus*, pumilus, pileo hemisphaericō-umbilicato glabro fuligineo, lamellis distinctis arcuato-decurrentibus albis, stipite sublongo.

In pratis et locis graminosis, autumno sero. Forma grata distinctus. Pileus 3-4 lin. latus, 3 altus. Lamell. angustae. Stipes 2- $2\frac{1}{2}$ unc. longus, lin. 1 fere crassus, basi subvillosus.

103. *Vaillantii*, parvus, pileo piano plicato, lamellisque postice latissimis adnatis distan-
tibus candidis, stipite solido glabro spadiceo,
sursum incrassato pallidiori. *Fries Syst.* 1.
p. 136. Syn. fung. p. 126.

Fungus, pileolo candicante, lamellis pau-
cis, pedunculo fusco splendente. *Vaill. Bot.*
Par. p. 69. nr. 58. t. XI. fig. 21 - 23.

Hab. in Gallia et Suecia. „, Stipes unc. 2
longus, tenax, solidus, junior flavescens, dein
niger, splendens; medio badius, apice albidus
et ibi leviter pruinatus. Pileus explanatus,
passim depresso, (ex Vaill. umbilicatus) stria-
to-rigosus, $\frac{1}{2}$ unc. latus. Lamell. simplices,
triquetrae (quoad figur. Vaillantii decurrentes).
Fr.

** *Pileo albicante*. (*A. chrysoleucus*, *Vaillantii*).

104. *Lepisma*, pileo carnosō glabro albo, mar-
gine involuto, lamellis obscurioribus, stipite
subcavo attenuato subrufescente. *Fries Syst.*
p. 271. (A. lepista).

Rarius in sylvis acerosis et frondosis, in
Suecia. Statura prioris. Pileus laevis subhu-
midus, demum depresso. Lamel. decurrentes,
basi simplices, fuscescentes. Stipes 2 - 3 unc.
longus, 3 lin. fere crassus, basi villosus. *Fr.*

105. *giganteus*, albidus, pileo demum infun-
dibuliformi, lamellis confertis decurrentibus,
dein rufescentibus, stipite brevi crasso fus-
cescente. *Fries p. 80. Sowerb. t. 244.*

Agaricus maximus. *Flor. Wetterav.* 3.
v. 2. p. 329. *Consp. fung.* p. 213-214.

In umbrosis frondosis, Septembr., in Germania, Suecia et Anglia. " Totus dilute alutaceo-pallidis, vel albido. Pileus speciminum majorum 1-2 pedalis, sed pro ratione tenuis, modice carnesus, exsuccus fere, in fundo obsolete umbo rotatus, margine in nonnullis lobatus (incisus?) subinvolutus. "

106. *meligeus*, pileo subdepresso laevi albo, lamellis decurrentibus distantibus luteis, stipite solido crassiusculo albo. *Fries* p. 85. *Ejusd. Obs. Mycol.* 2. p. 201. +

In sylvis muscosis ab ignis semel inventus. Etiam quod locum dubius. Stipes solidus, laevis, glaber. Pileus mollis fragilis subglaber, 2 unc. fere latus. Lamel. longe decurrentes. l. c.

107. *phyllophilus*, subgregarius aut solitarius albus, pileo umbilicato laevi, lamellis confertis, stipite basi villoso incurvo. *Syn. fung.* p. 457.

Agaricus cyathiformis *Bull.* t. 575. f. 2. ?

Inter folia decidua, quibus villo denso adhaeret, non raro, autumno. Magnitudine mediocri, 2 unc. latus est. Stipes basi incrassatus, nonnunquam subcompressus, et subundulatus. Variat colore cinereo, subgriseo, pileo obliquo, et stipite stricto.

A. fuliginatus, pileo infundibuliformi albo, lamellis stipiteque basi recto dilute fuligineis. Antecedente paullo major, et stipite basi non incurvo differt.

108. *phaeoptalmus*, gregarius, pileo tenui submembranaceo pellucido flaccido albo-pallido, umbilico profundo fuligineo-fusco, lamellis confertis ex albido griseis, stipite elongato tenui aequali dilute fuliginoso.

In queretis inter folia arida. Stipes basi subtumidus, cavus, non incurvus, 2-3 unc. longus, 1-2 lin. crassus, lamel. tenues, lanceolatae, 2-2 $\frac{1}{2}$ latae. Pileus fere ecarnis, glaber, in umbilico sat magno et aequali plerumque obscure fuscus, fere umbrinus, 1 $\frac{1}{2}$ -2 unc. latus. Odor virosus, acris.

109. *stereopus*, submagnus, pileo carnoso demum depresso pallescente, margine fornicate subrepando obsolete fibrilloso, lamellis decurrentibus tenuibus albis, stipite sublongo flexuoso duro albo, basi villoso.

Hab. ad margines sylvarum, aut in sylvis locis apertis (Vincennes) ad terram inter muscos. Ad majores spectat. Pileus latitudine palmari, repandus, substantia compacta alba, gustu subacris, sub lente visus, fibrillulis sparsis sericeis obtectus. Lamel. 2-3 lin. latae, sat profunde decurrentes. Stipes compactus, solidus, 4 lin. crassus, subflexuosus. Color

in pileo etiam subrutilans, et lamellis cum tinctura incarnata.

110. *tabularis*, submagnus, pileo subcarnoso applanato glabro albo-pallente, lamellis densis plano-decurrentibus stipiteque subtenuis albis.

Rarius in sylvis subumbrosis, sero autumno. Stipes 2-3 unc. longus, 4 lin. crassus, subfibrillosus. Lamel. lanceolatae, in pilei ambitu valde attenuatae. Pil. 3-4 unc. latus, substantia molliuscula, et sapore adstringente.

111. *leucophaeus*, solitarius subparvus fragilis, pileo subcarnoso, primo planiusculo, dein subinfundibuliformi, lamellis confertis tenuissimis argillaceis (aut aquose cinnamomeis) decurrentibus, stipite tenui subtenaci pallido.

Rarius in sylvis ad terram. Stipes 1½ unc. longus, lin. 1 crassus. Lamel. latitudine inaequales, vix lin. latae. Pileus unc. 1. et ultra latus, disco interdum circinnatim rimosus. Sapor subvirosum.

112. *neapolitanus*, gregarius submagnus candidus pileo infundibuliformi laevi, lamellis confertis subangustis, stipite aequali glabro.

Singulari modo Neapoli ortus est haecce species, nempe in sedimento pulveris fabarum tostarum coffeae, et nunc ibi tali modo

in usum culinarem colitur *). Pileus profunde umbilicatus, forma regulari, 3 unc. latus, non valde carnosus. Recens pulchre albus, exsiccatus pallescens. Lamellae longe decurrent. Stipes firmus, 2-3 unc. longus, 3-4 lin. crassus, sub lente examinatus leviter pubescens.

113. *Markii*, cellaris pileo niveo umbonato tehero primum campanulato dein infundibuliformi, margine subinvoluto, lamellis tenuissimis subdecurrentibus, stipite gracili flexuoso farcto. *Trattin. Fung. Austr.*

Fasc. 5. p. 140, t. 14. f. 28.

*) Le champignon que vous trouverez ci-joint, se développe sur le marc du café pourri et gardé dans un endroit humide, pendant huit à dix mois. Ce n'est que depuis peu d'années, que le hasard le fit découvrir. Des jeunes Réligieuses d'un Couvent de Naples l'ont trouvé sur un tas de marc de café ramassé dans un coin ombragé de leur jardin. Dès lors elles en ont repandu la nouvelle, et à présent on se le procure artificiellement; car ici, on a pris l'habitude de ramasser ce marc pendant quelque temps, en employant aussi celui des boutiques pour en faire une provision plus considérable. On fait pourrir le marc dans un pot de terre cuite, non vernisé, déposé à l'ombre, et arrose pour entretenir une humidité constante. Les champignons paroissent au bout de six mois environ, ils sont bons à manger, et assez bon goût. *Ténore, in Litt.*

Hab. in cellis ad dolia vinaria, in Austria
observatus.

„Mycelium (radiculae byssoideae) tenuissimum candidum, macularum forma efflorescit in cellariis, ad dolia vinaria vetusta trabesque subjectas ex ligne quercino confectas, quarum tota superficies a byssorum demortuarum copia profunde nigrescit. Magnitudine mirifice variat hic fungus, et stipes adeo irregulariter in omnes directiones inflectitar, ut non raro pileum penitus inversum et lamellas sarsum spectantes observare liceat. Odor gratus.“
Tratt.

114. *madidus*, *subterraneus* solitarius, pileo albo glabro madido, lamellis pallide fuscis, stipite brevi incrassato.

Ag. Cornucopia, infundibuliformis, margine lobatus. *Scop. Fung. Subterr. p. 112.*
t. 39. f. 2.

In Theresiae *Schacht* (puteo metallico). Pileus albus, superficie madida, glabra, etiam palmaris. Lamell. pallide fuscoae. Stipes brevis divergens solitarius. *Scop.*

*** *Pileo plus minusve faliginoso, cinerascente, umbrino vel fusco-badio, nigrescente.*

115. *polycephalus*, ramosus proliferus magnus pileis carnosis umbilicatis griseis, lamellis albis, stipitibusque lanuginosis albis.

Fungus ramosus maximus, pileolo desu-

per griseo, inferne lamellis et lanugino pediculo albis. *Mich. N. gen. pl. p. 190. t. 79. f. 1.*

In Italia, mense Octobri in sylvis ad Pesam torrentem inventus. Polyporum polyccephalum in memoriam revocat, cuius formam quadantenera refert. Caulis in tres principales divisus subdiformes satis crassus, qui unum aut duo alia individua minora proferunt. Pilei maiores 1 - 2 unc. lati, plicato-repandi. Lamellae non profunda decurrunt arcuati. Esculentus videtur.

116. *ditopius*, oolidus, pileo infundibuliformi coriaceo - membranaceo, dein undulato-lobato 'cinerascente', lamellis confertis subdecurrentibus stipiteque cava subcompresso - cinereis. *Fries Syst. 1. p. 171. Obs. Myc. 1. p. 91.*

In Sueciae pinetis inter muscos, Jul. — Septembr. Odore farinae recentis. Stipes aequalis tenax, in *Obs. cinerascens*, in *System. fuscus*, basi pubescens. Pileus difformis sub-excentricus, saepe regularis, margine inflexa. Lamell. adnato-deurrentes, cinereae. — Pileo saepius excentrico et substantia coriaceo ad *Pleuropodes* accedit. Fr.

117. *diformis*, pileo carnoso - membranaceo cinereo - livido margine substriato: umbilico irregulari, lamellis latiusculis plano-decurrentibus albis, stipite longiusculo tenui sub-

tenace. *Syn. fung. p. 170. Fries Syst.*
p. 170.

β. stygius, pileo campanulato umbilicato, lamellis adnexis ventricosis, stipite tenui gracili longissimo *Fries l. c.* (Inter Sphagna densa. An distinctus?)

Meum fungum in Hercyniae pinetis, olim inveni, cuius stipes tenuis lin. $1\frac{1}{2}$ crassus, nitens. Lamellae cinerascunt. Pileus unc. fere latus, ore insequali undulatus, hinc difformis appetet.

218. maurus, pileo umbilicato: humido striato subfuligineo, sicco laevi nitente sericeo livido, lamellis confertis candidis, stipite subfistuloso rigido. *Fries l. c. p. 168.*

In Sueciae paludosis, sed praecipue locis humidis adustis. Pileus profunde umbilicatus, (in diagnosi convexus dicitur) glaber, $1\frac{1}{2}$ unc. latus. Stipes 1-2 unc. longus, vix lin. crassus, pileo concolor, junior factus. Lam. longe decurrentes, medio latae. Fr.

219. incomitus, pileo planiusculo subinembra- naceo umbilicato subfibrilloso griseo margine striato, lamellis livide flavescentibus, stipite fistuloso, obscure cinereo. *Fries Obs. My- col. 2. p. 212.*

Vere, in Smolandia, in paludosis sphagnosis, rarius. Stipes 2 unc. fere longus, aequalis, inferne fibrillosus. Pileus tenuis, unc. vix latus, margine reflexus, pilis fibrillosis

subnigricantibus virgatus. Lamel. albido - glaucescentes. Fr.

120. *plicatus*, gregarius et subcespitosus fere excarnis, pileo subdifformi fuligineo - pallido, lamellis subdecurrentibus distinctis ad latera plicatis ex pallido parum fuscescentibus, stipite fibrilloso duriusculo subbrevi albido - rufescente.

Reperi hunc fungum, locis graminosis, mense Majo in sylvula Vincennes prope Parisios. Stipes $1\frac{1}{2}$ longus, 2 - 3 lin. crassus, ab initio solidus, demum cavus. Lamellae non valde decurrent, latera plicis varie tortis distinctae, 2 lin. latae. Pileus unc. $1\frac{1}{2}$ latus, subinde subzonatus, umbilico passim obliquo, fere ecarnis, saepe substyptico.

121. *hedeosmus*, solitarius et subgregarius parvulus, pileo subcarnoso irregulari, subdepresso fragili pallide livido, lamellis confertis subdecurrentibus aquose pallidis, stipite elastico subtenui dilute rufescente, basi subtuberoso albido - villoso.

Rarius autumno ad margines sylvarum in graminosis. Stipes subdurus, 2 - 3 unc. longus, 2 - 3 lin. crassus, solidus. Lamel. non latae, et in stipitis apice modo decurrent. Pil. 2 unc. latus, irregularis, vix carnosus. Odorem Anisi exhalet, et saepe grato edulis videtur.

B. ? *anisatus*, albo - griseus, pileo umbilicato

aequali, lam. decurrentibus, stipite basi tuberoso.

Odore cum priore convenit, sed unicolor est. Pileus solummodo unc. 1 latus. Forsitan distincta species est et ab *A. odoro* diversus.

122. *fumigatus*, magnitudine media, pileo ab initio umbilicato, dein depresso opaco albo-fuligineo glabro, lamellis horizontalibus, parum decurrentibus albis, dein fuligineis, stipite sublongo elasticō pileo concolore.

Ad terram in sylvis rarer (prope Paris). Stipes 2 - 2 $\frac{1}{2}$ unc. longus, lin. 1 - 2 crassus, glaber. Pil. 1 $\frac{1}{2}$ unc. latus, subtenuis, rigidus. Lamellae postice latiores. Odor subfortis.

123. *platyceps*, magnus, pileo carnoso-membranaceo subtenaci pellucido, margine laevi plano, disco dein umbilicato badio, lamellis plano - subdecurrentibus albido - fuligineis, stipite cavo inverse clavato.

Agaricus murinus Batsch. *El. fung.* t. 5. f. 19. quoad colorem, sed ultra dimidium minor et stipes teres pictus).

Solitarie, locis muscosis ad terram. Stipes 3 unc. longus, 4 - 5 lin. crassus, pileo concolor, basi albo-tomentosus, deorsum incrassatus. Lamell. ab initio albae, maturae fuligineae. Pileus juniorum convexus, non umbilicatus. Sequenti affinis, et forsitan ejus var.

124. *tardus*, *subsolitarius umbrinus majuscus*
lus pileo infundibuliformi, margine reflexo
laevi, lamellis subconcoloribus aut cineras-
centibus, stipite sublongo sensim attenuato.
Syn. fung. p. 461.

Agaricus cyathiformis Bull. t. 568. et 575.

Agaricus sordidus Dicks, Sowerb. t. 363.,
Bolt. t. 59. et *Ejusd. cyathoides* tab. 145.?
var.?

Sat communis sero autumno in sylvaticis
 ad terram, etiam in truncis muscosis. Stipes
 subtenax, 3 unc. longus, forma plerumque
 conica distinctus. Pileus biuncialis, late exca-
 vatus. Plures hujus speciei varietates existunt,
 quarum praecipue sequentes.

B. aithopus, minor, pileo fusco, margine in-
 voluto, stipite reticulato *Holmsk Fung.*
Dan. 2. t. 41. Nees Syst. f. 292. (In Da-
 niae sylvis).

B. aggregatus, subcespitosus griseo - cineras-
 cens, pileo subcarnoso planiusculo umbili-
 cato laevi, lamellis subconfertis plano - de-
 currentibus, stipite subtenui elastico, dein
 cavo.

Mense Octobr. in sylvis, rarer. Stipes
 $2\frac{1}{2}$ unc. longus, 2 lin. crassus, substantia
 fibrosus. Lamel. tenues. Pileus unc. 1 - 2 la-
 tus subpellucidus, exsiccatus pallescit, margine
 subtiliter striatus.

y. rufo-

y. rufo-lamellatus, pileo umbilicato dilatato fuscocente-griseo laevi, lamell. ex griseo-rutilantibus, stipite mediocri sordide-griseo, basi albo-tomentoso. *Conf. Bull. t. 568.* fig. 8. et T.

* *cinereus*, totus cinereus parvulus, pileo saepius oblique infundibuliformi striato, lamell. crassiusculis nitidis, stipite subtenace incrassato fuligineo.

At *Ag. cyathiformis*. *Bull. t. 248. f. c.?*

Passim aestate in sylvis. Sapor virosus. Species distincta videtur.

125. *expallens*, pileo carnosò - membranaceo umbilicato dilute cinereo expallente margine striato, lamellis subdistantibus cinereis, stipite crassiusculo subtenace pallido. *Syn. fung. p. 461. Fries Obs. Mycol. 1. p. 80.*

Autumni initio in pinetis, et in sylvis ad terram inter muscos. Antecedenti forte nimis affinis, cuius formam, paullo minorem, refert; ab eo quoque substantia teneriore et colore multo dilutiore differt, etiam multo praecoxior est.

parilis, pileo subconvexo laevi cano; umbilico villoso, lamellis griseis, stipite subfarcito cinereo-nigrescente. *Fries L. c. 214. Ej. Syst. p. 168.*

„ In pinetis; semel; mense Julio. Pileus leviter carnosus, fere membranaceus, late um: *Secio tertia*

F

bilicatus griseo-cinereus, expallens canus. Stipes aequalis, teres, firmus. loc. cit.

126. *dicolor*, pileo orbiculari umbilicato cinereo, dein albescente, lamellis confertis subdecurrentibus dilutioribus, stipite subcompresso, basi obscure cinereo. *Syn. fung. p. 462.*

Agaricus metachrous. Fries? quem non intelligo.

In Germaniae pinetis crescit. Pileus subpellucidus, 2 unc. fere latus. Lamellae parum decurrent modo. Stipes pruina alba tectus, magnitudine mediocri, adultus compressus.

Obs. Auctores *Conspect. fung.* p. 220. duas commemorant varietates; quae vix huc pertinent, nempe $\alpha.$ *rimosa*, pileo colore paullo saturatiore, longitudinaliter rimoso-piloso, $\beta.$ *truncigena*, duplo fere major, fascicularis alba, pileo pilis longis appressis nigricantibus rima, stipitibus elongatis adscendentibus fistulosis.

127. *streptopus*, exalbicante-lividus, pileo glabro, margine striatus, lamellis confertis, stipite fistuloso subcompresso subundulato torto, basi radicato-strigoso. *Fries Syst. 1. p. 169.* (*A. hydrogrammus*), excl. *Synonymo?*

Inter folia decidua, locis subhumidis, gregarius, vel caespitosus, in statu sicco albidus. Stipes tenax, tortus, 2-3 unc. longus. La-

mellae longe decurrentes, medio latiores. Pileus submembranaceus, profunde umbilicatus flacidus, margine expanso, a unc. latus. Fr.

Obs. Similem etiam fungum hisce in locis vidi, cuius vero stipes non torquetur, nec pileus submembranaceus est, interea mera varietas videtur.

3: *orthopus*, magnitudine mediocri, pileo concavo, humido griseo, margine striato, sicco expallente, lamellis confertis tenuibus coloribus, stipite sublongo radicato fuliginoso.

Stipes cavus, elasticus; una cum parte radicante 4 unc. longus. Pileus 1 $\frac{1}{2}$ unc. longus latus, subundulatus, elasticus. In sylvis nascitur ad terram, vix humidam.

128: *aereus*, subcaespitosus, pileo late umbilicato fusco-aeneo, lamellis distantibus cinereis, stipite elongato, basi ab initio tumido, dein aequali, cinereo fuscoque variegato.

Supra pulverem coriarium putrescentem olim collectus a b. Thore prope Dax Gall. meridional. Ex iconে breviqne descriptione communicatis, stipites fungi junioris inter se basi connato et ventricosi, et superficie obsoleta reticulata. De reliquo cum A. tardo magnitudine et habitu convenit, lamellis sat paucis locoque natali exceptis.

129. *affricatus*, gregarius, pileo subinfundibuliformi albido, squamulis pilosis cinereis, la-

mellis latis longe decurrentibus, stipiteque fistuloso tereti griseia. Fries Syst. 1. p. 169. Ej. Obs. Mycol. 2. p. 213.

In Sueciae paludibus muscosis umbrosis, Stipes uncialis, lin. 1 crassus, cinerascens. Pileus carnosum-membranaceus, albidus vel griseo-pallidus, squamulis cinereis vel nigricantibus appressis, $\frac{1}{2}$ unc. circiter latus. Fr. — An ab antecedente, quocum habitatione convenit, specie diversus?

130. *atratus*, pileo glabro planiusculo nigro, lamellis albido-griseis, stipite fistuloso tenace glaucescente. Fries l. c.

Agaricus Nigrella. Consp. fung. p. 229. (excluso Synonymo).

Hab. in Germania et Suecia, locis graminosis, in ericetosis, locisque adustis. Stipes unc. 1 altus, glaber. Pileus subnitens, piceo-niger, interdum subviscosus, vix unc. latus. Lamell. leviter decurrent, primo albidae.

131. *hirneolus*, canescens, pileo carnosum, membranaceo umbilicato laevi glabro, lamellis decurrentibus distinctis, stipite farcto albo pulverulento. Fries Obs. Mycol. 2. p. 211.

Agaricus ericetorum. Schum. Saelland. p. 229. (excl. Synonymo).

Rarius in graminosis muscosis habitat, in Dania et Suecia, Aug. — Sept. Subgregarius parvus, aequalis, 1 - 2 unc. longus, lin. 1 crassus, rectus aut flexuosus, subradicatus. Pileus

ab initio planus, dein depresso; margine sub-inflexo, siccus, $\frac{1}{2}$ unc. latus, albido canus, ita ut reliquae partes. loc. cit.

132. *brumalis*, pileo subcarnoso infundibuliformi laevi griseo, sicco sublutescente, lamellis subdecurrentibus lutescentibus, stipite farcto aequali Fr. Syst. 1. p. 171. Ejusd. Obs. p. 206.

Agaricus cinerascens. Batsch. Et. fung. Cont. 1. p. 126. t. 19. f. 109.?

Crescit in sylvis abiegnis, supra folia pru-
tressentia. Stipes dein cavus, 1 $\frac{1}{2}$ unc. longus,
2 lin. crassus, lividus, glaber. — Batschius de
sui fungi stipite dicit, quod fibris grossioribus
fuscis, inter se vage connexis, obductus sit.

133. *syringalis*, gregarius parvulus, pileo car-
noso umbilicato cinereo subsericeo, lamel-
lis griseo-rutilantibus, stipite brevi, deor-
sum albicante.

Sero autumno pluvioso sat frequens sub
Syringis in locis cultis provenit.

Stipes 1 unc. et ultra longus, lin. 1 cras-
sus, pileo sursum concolori. Lamellae arcua-
tue, mediocriter decurrent, ab initio griseae,
dein sporulis rutilantibus obtectae. Pil. unc. 1
fere latus, hemisphaericus, sub lente fibrilloso-
sericeus appetet.

134. *Epichysium*, parvus tener cinereo-nigri-
cans, pileo infundibuliformi striato, lamellis
lineatibus cinerascentibus, stipite subtenace,

basi villosa. *Syn. fung.* p. 463. *Ic. pict. fung.* 3. p. 29. t. 14. f. 1. *Fries Syst.* 1. p. 169.

Ad trunços Salicum, Fagorum, autumno. Pileus carnosus-membranaceus, margine striatus. Stipes incurvus ab locum, subsolidus, dein cavus.

* *icmadophilus*, tenerimus, pileo infundibuliformi obscure cinereo, lamellis plano-decurrentibus cinereis. *Syn. l. c. Conspl. fung.* p. 222. *Fries L. c.*

In Germaniae et Sueciae uliginosis, sphagnosis. Ab antecedente ut species distingui me-retur, ab teneritatem et praesertim ab locum valde diversum.

135. *obliquus*, terrestris parvulus obscure cinereus, pileo glabro infundibuliformi obliquo, stipite farcto brevi subcrasso. *Icon. pict. fung.* p. 30. t. 3. f. 2.

Hab. ad terram. Rarissime olim prope Gottingam lectus. Pileus $\frac{1}{2}$ unc. latus, striis vel lineis distantibus. Stipes cylindricus, $\frac{1}{2}$ unc. longus, et 1 lin. crassus.

136. *cinnicarius*, gregarius pumilus subtenax, pileo glabro umbilicato fusco-griseo, lamellis angustis distinctis albicantibus, stipite breviusculo incrassato fuligineo. *Tab. XXVI.*

Fig. 7.

Circa Poitou in Gallia, pluries lectus, in sylvis ad terram a D. Delastre, assiduo fun-

gorum indagatore, et secundum quem haecce species, Merilio cuidam non dissimilis, odorrem fortem cimicarium, recenti in statu, exhalat. De cetero fig. picta ejus formam et colorem indicat.

137. *griseolus*, gregarius exiguuus, pileo umbilicato griseo-pallente, lamellis decurrentibus subdistantibus obscurioribus, stipite brevi aequali concolore.

Agaricus griseo-pallidus. Desmazieres
Plant. Cryptogam. exsiccatae. Fasc. 3. nr. 120.

Hab. ad terram in hortis, cultis, autumni initio. Juniores fere pezizaeformes, pileo margine erecto. Pileus dein plano-connexus, disco excavato, 3-4 lin. latus, glaber, exsiccando paullo rufescens. Lamell. crassiusculae.

138. *Hypnicola*, subgregarius griseus, lamellis longe decurrentibus albidiioribus, stipite longo basi subpilosso.

Rarius mihi obvius in pasciis humidis; aut ad sylvarum margines, cespitibus hypnum per radiculos adhaerens. Stipes filiformis, 1-2 unc. longus. Pileus 2 lin. latus, substriatus.

139. *ericetorum*, gregarius pusillus dilute griseus, pileo umbilicato membranaceo, lamellis distantibus basi latissimis, stipite breviusculo subtenui. Syn. fung. p. 472. Obs. Mycol. 1. p. 50. t. 4. f. 12. Fries Syst. 1. p. 165. (exclusis varietatibus?)

Agaricus pseudoandrosaceus. Bull. t. 276.
Ag. umbelliferus. Linn. Suec. p. 440. videtur.

Crescit in ericetis, et sylvis solo araneoso, autumno. Pusillus. Stip. unc. 1 vix longus, aequalis. Pileus striatus, 2-3 lin. latus. Lamel. distantes triquetrae.

Obs. 1. (Clar. Fries plures, ut dicit, varietates descriptsit a me haud visas, quae forte tanquam species considerari debent, ex gr. *Ag. laeteviridis*. Flor. Dan. t. 1672. f. 1. *Ag. niveus* Flor. Dan. t. 1015. f. 1. *Ag. valgus* Holmsk. Fung. Dan. p. 62. t. 34. (qui majorem affinitatem cum *Ag. virgineo* habere videtur); *radiatus*, pileo fusco-radiato-striato subsericeo; materie viridi ad sepes umbrosas innascens; — *velutinus*, pileo griseo stipiteque velutinis, lamellis dichotomis — ad terram deustam, tandem *myochrous*, obscure fuscus, (stipite?) basi strigoso-radiato (*Merulius fuscus* Wither.) qui mense Augusto ad truncos madidos Fagi repertur, et cum antecedenta *Merulium* refert.

Obs. 2. His in locis varietatem sat deflectentem inveni: stipite paullo longiore tenua pubescente, lamellis albicantibus, pileo umbilicato griseo subfarinaceo, 3-4 linearis, non fragili. Magis accedit ad *Ag. pseudoandrosaceum*. Bull.

tit Geotropus. Pileo carnoso aut carnoso-membranaceo convexo aut plano-convexo (saepius

umbonato), lamellis adnexis, plus minusve (-plano-) decurrentibus, stipite nudo, satis elongato. (Species plerumque terrestres).

* *Colore pilei griseo, nigrescente.*

140. *pileolarius*, subgregarius firmus magnus, pileo carnoso umbonato cinerascente vel griseo, lamellis confertis subdecurrentibus pallentibus, stipite longo cinereo-albido, deorsum incrassato. — *Bull. t. 400.*

Ag. geotropus, stipite crasso pleno nudo, pileo umbonato, latissimo, fuligineo cervino; lamellis curvilineis arcuatis, dilute fuligineis, *Bull. Hist. d. champ. p. 521. t. 573. f. 2.*

Agaricus nebularis. *Batsch. El. fung. f. 193.* (junior, aut minus adultus). *Syn. fung. p. 349. Fries Syst. 1. p. 87. A. mollis Bolt. t. 480.*

Praesertim in sylvis frondosis, passim in pinetis, et ericetis occurrit subserotine.

Stipes 3 unc. longus, $\frac{3}{4}$ unc. crassus, elasticus, fibrillosus, albicans, et ubi sub terra foliisque occultus est, saepe incurvus. Lamel. angustae, subarcuatae. Pileus 4-5 unc. latus, primo subturbinatus, dein plano-subdepressus, margine lineatus.

β. cameratus, submagnus abetaceo-pallens, pileo planiusculo, margine fornicato, umbone subexcentrico, lamellis distantibus arcuatis strictis, brevi-decurrentibus, stipite sublon-

ga. crassiusculo tereti glabro, pileo conco-

lore.

Magnitudine, stipe paullo breviore excepto, cum priore convenit, sed colore incarnato-alutaceo, et lamellis distantibus incurvatis differt. Sapor quidem primo subdulcis, dein parum adstringens; edulis tamen, ut ille, mihi videtur. — An potius varietas *gibbi*; cfr. *Consp. fung.* p. 217.

y, columnaris, magnus, pileo ex albo lutes-

cente, demum infundibuliformi, umbone

subgloboso, lamellis linearibus, inaequaliter

decurrentibus, stipe longo subbulboso, deor-

sum villoso.

Agaricus pileolarius, Sowerby, t. 61. videtur.
His in sylvis, sub finem Octobris, fungum sat speciosum inveni, circinnatim aliquando crescentem. Firmus, magnus, junior clavaeformis, margine involutus, adultus concavus, opacus, ultra 4 unc. latus. Stipes 3 unc. longus, unc. 1 fere crassus, praesertim versus basin, ibique villo denso involutus. Odore et saپore non ingratus.

141. clavipes, pileo carnoso subumbonato plau-

niusculo, cinereo-livido, margine albicante,

lamellis arcuatis decurrentibus albidis, -sti-

pite solido obverse clavato. Syn. fung.

p. 353. Fries l. c., p. 86. Consp. fung.

p. 177.

In quercetis et pinetis, inter muscos et

gramina, in Germania et Suecia, Aug. — Oct. Antecedenti affinis. Stipes pileo concolor, 2 unc. fere longus, fuliginea-lividus, basi albidio-tomentosus. Lamell. parum distinctae, sat profunde decurrent, pallescunt. Pileus 1½ unc. latus, umbone demum evanescente, subinfundibuliformis fit.

142. *glandiferus*, pileo carnoso campanulato umbonato cinereo-livido, lamellis distantiibus plano-decurrentibus candidis, stipite longo albido-cinereo. *Syn. fung. p. 352.*

In pinetis in Hercynia crescit. Stipes 3 unc. longus, solidus, 3 lin. crassus, etiam albicans, inaequalis. Lamellae subcrassae, lineariter decurrent. Pileus 3 ½ unc. latus, umbo magno glandiformi conspicuus.

143. *comitialis*, gregarius pileo carnoso plano-convexo stipiteque conico-nigrescente-fuligineis, lamellis confertis decurrentibus niveis. *Syn. fung. p. 352. Fries, p. 86.*

In pratis montosis subuliginosis, solitariae, aut circinnatim vegetat. Stipes elasticus, deorsum ventricosus, glaber, 2-3 unc. longus. Lamellae plano-decurrentes, niveae, pallescunt. Pileus 2 unc. latus, disco carnosus, non depresso.

144. *fagineus*, pileo convexo-explanato obtuso subfuscō, margine albicante, lamellis decurrentibus confertis albis, stipite farcto

striato, basi incrassato. Fries Syst. 1. p. 87.

Ag. Schumacheri.

Agaricus fagineus. Schum. Saell. p. 330.
(nomen anterius). Ag. pullus. Syn. fung.
p. 349.?

In Sueciae et Daniae sylvis umbrosis, apprime fagineis. „ In cibariis praestat. Stipes 3-4 unc. longus, albo-cinerascens, interdum squamalosus. Pileus 3-4 unc. latus, dein applanatus, margine etiam undulatus. A. nebulari (pileolario) valde affinis.“ Fr.

145. luscinus, pileo carnoso convexo laevi glabro livido, lamellis leviter decurrentibus pallidis, stipite solidō farinoso albo. Fries Obs. Mycol. 2. p. 108. Syst. p. 87.

Agaricus nimbatuſ. Batsch. El. fung. Cont. 1. p. 49. t. 14. f. 65. ? (cujus margo piloſi albus pictus est).

In pascuis montosis in Suecia, in pinetis ex Batsch. Stipes 2 unc. longus, 3 lin, crassus, subincurvus, aequalis. Pileus obtusus, laevis, subirregularis, lividus, 1-2 unc. latus. Fr.

146. pustulatus, pileo carnoso subflexuoso viscoso cinereo-livido, umebone obtuso, papillis viscosis obsito, lamellis subdecurrentibus stipiteque squamuſo candidis. Syn. fung. p. 354. Fries Syst. 1. p. 34.

A. agathosmos, pileo carnoso subconvexo papilloſo cinereo, lamellis albis decurrentibus,

stipite solido albo. Fries Obs. Mycol. 1.
p. 16.

In pinetis umbrosis, in Germania et Suecia. Stipes saepe incurvus, subflexuosus, solidus, 3 unc. altus, 2 lin. crassus, variat cinereo-squamulosus. Lamel. latiusculae. Pil. obtuse umbonatus, etiam subdepressus, suaveolens.

B. brevis, solitarius glaber, pileo subviscoso nigrescente, lamellis distantibus subdecurrentibus stipiteque brevi albis. *Syn. fung.*
l. c.

Rarius in pinetis. Stipes hujus vix unc. 1 longus. Lamel. tenues. Pileus obtusus, compactus, margine albicante.

147. *tephroleucus*, pileo subcatnoso convexo-plano-squamuloso subcinereo-livido, lamellis planis subdecurrentibus niveis, stipite farcto albo nigro-squamuloso. *Syn. fung.*
p. 351. *Fries Syst.* p. 34.

Agaricus discors. *Batsch. El. fung. Cont.*
t. 34. f. 196. quoad habitum.

Hab. in Germania et Suecia in pinetis umbrosis. Stip. 1-5 uno. longus, 2-3 lin. crassus. Lamel. lin. 1-2 latae. Pileus convexus, subumbonatus, unc. latus, substantia parum tenui.

148. *vitellicolor*, gregarius subparvus, pileo subdepresso glutinose-olivaceo-fusco vel spar-

1. diceo; lamellis stipiteque aequali obscure luteis.

*Agaricus Vitellum. Conspp. fung. p. 179.
t. 10. f. 3.*

Nitida haec species nascitur sub Pinibus in Germania, Gallia (prope Parisios rarer). Stipes 2 - 2 1/2 unc. longus, 3 lin. fere crassus, laete flavus. Lamel. distinctae, 2 lin. latae. Pileus parum carnosus, 1 1/2 unc. latus, humidus gelatinosus. plano-depressus. Sapor viscosus.

Obs. Hanc speciem forma non varian-tem inveni et ita similem, qualis in *Conspectu descripta et figurata est*, an forte *Ag. hypotheius*. Fries Syst. I. p. 35, diversa species, vel eadem, sed in Suecia solummodo variabilis?

149. limacinus, pileo carnoso (non lato) convexo plano glutinoso fuligineo-olivaceo nigrescente, lamellis subdecurrentibus candidis, stipite farcto, transversim rimoso, pileo concolore, apice niveo. Syn. fung. p. 355. Schaeff. fung. t. 312. Commen- p. 123.

In Germaniae fagetis rarius provenit. Pil. 1 1/2 unc. latus, compactus. Stipes subradicatus, pariter viscosus, 2-3 unc. longus.

B. viscoporus, pileo carnoso fuligineo, umbo subumbrino, glutine denso fusco ob-sito, lamellis subdecurrentibus niveis, sti-

pite elongato viscoso, pileo concolore, apice squamuoso albo.

Agaricus glutinosus. Bull. t. 539. f. C.
D. F.

In sylvula Vincennes (prope Parisios) frequens occurrit sero autumno. Antecedente major, 2-3 unc. latus, disco subdepressus. Lamell. subtenues. Stipes subflexuosus, saepe quoque transversè squamoso-rimosus. Color fuscescens lividus.

* *olivaceo-albus*, pileo umbonato glabro olivaceo-fusco, lamellis connexis candidis, stipite solido fusco-maculato Fries 1. p. 35.
Ejusd. Obs. 1. p. 5. *A. striatus* Schum. p. 321.

In Sueciae pinetis, frequens dicitur. Stipes albidus e velo maculatus et viscidus. Pileus circa umbonem demum depresso, 1-2 unc. latus, margine substriatus. — Auctor ad suum fungum etiam allegat fig. Schaefferi; et mera varietas videtur.

150. *Cardarella*, pileo carnoso depresso laevi atro-rufo, lamellis decurrentibus candidis, stipite breviusculo subaequali. Fries Syst. 1. p. 84. Battarra, p. 38. t. 16. G.

„In pascuis ad littus Adriatici autumnali tempore legitur. Esculentus. Arimini *Cardarella nostrana*. Peduncul. brevis, carnosus, plenus, candidus (ex ic. ultra unc. longus, et $\frac{1}{2}$ crassus). Cutis pileoli (latitudine biunciali)

grassa, facile educenda, atro - rufa, et sublucida.“ Batt.

Marzuola, compactus obesus, pileo planiusculo laevi cinereo (?), margine repando, lamellis decurrentibus, stipiteque obeso albis. Fries l. c. A. Marzuolus. Michel. p. 154. t. 74. f. 9. +

„Martio mense, in sylvis — Vallis — Umbrosae sub nive latet ac viget. Fungus alpinus esculentus, *Marzuolo* dictus, parvus et habitior, desuper obscurus, insuper et pediculus albus.“ Mich. Habitum peculiarem difformem, male explicatum, sistit.

151. *Eryngii*, subgregarius (parasiticus) pileo carnoso planiusculo demum depresso, margine reflexo pallescente-griseo, lamellis decurrentibus albis, stipite brevi tumido. — Decand. Flor. Gall. Suppl. p. 47.

Hypophyllum Eryngii. Paull. Ic. t. XXXIX. (fig. bonae), Nascitur Sept. et Oct. supra radicem vetustam emortuam Eryngii comestris. Edulis est. Pileus subelasticus, margine undulato pubescente, interdum squamuoso. Lamell. plano-decurrentes. Stipes unc. 1 longus, $\frac{1}{2}$ crassus. Datur var., stipite excentrico:

152. *elatus*, magnus, pileo subcompacto virgato fuligineo, lamellis decurrentibus albis glaucescentibus, stipite longo valido fibriloso. Fries Syst. 1. p. 99. Consp. fung: p. 177. (A. camarophyllum).

Aga-

Agaricus elixus. Sowerb. t. 172. Syn. fung. p. 460.

In pinetis montosis subudis frequens in Suecia et Germania, in Anglia.

Stipes 3-4 unc. longus, subaequalis, cinerascens. Lamellae latiusculae, fornicatae, primo albae, dein pallescunt. Pileus subfibriloso-striatus, disco appланatus; margine inflexus, fuligineo-nigrescens, 3-4 unc. latus.

B. atramentosus, major robustus, pileo atro-caeruleo, stipiteque concolore non virgatis.

Consp. L. c. p. 178. In montosis umbrosis, ineunte Octobri, in Lusatia.

153. *commistus*, gregarius majusculus, ex albido-fuligineo lividoque subpurpurascens, pileo carnosu subdepresso laevi glabro, lamellis longe decurrentibus dilutioribus, stipe solido, basi latiore albo-villoso.

In pratis muscosis, in viridario quodam reperi autumno.

Stipes 2 unc. longus, 1 unc. fere crassus, siccus demum fuligineus. Lamel. angustae, tenues, plano-decurrunt, confertae. Pileus 1 $\frac{1}{2}$ unc. latus glaber, margine in recentibus dilute purpurascens, tandem expallens subnitens, medio carnosus: carne compacta valde amara. Non est var. *Ag. rubescens vel carnosus*.

** *Pileo rufescente.*

154. *ficoides*, firmus fulvo-rubescens, pileo convexo obtuse umbonato glabro, lamellis

Sectio tertia.

G

crassis decurrentibus, stipite farcto brevi, deorsum attenuato. *Syn. fung.* p. 303. (*A. pratensis*). *Fries Syst.* p. 99.

A. ficooides, stipite crasso subaequali pleno nudo; pileo primum suborbiculari, mox turbinato; lamellis curvilineis latissimis, aetate perfecta abscissis. *Bull. (Vent.) Hist. d. Champ.* p. 526. t. 587. f. 1.

Agaricus miniatus. *Schaeff.* t. 313. *Sowerb.* t. 141. *Agaricus fulvosus*. *Bolt.* t. 56.

In pratis, et pascuis editioribus, passim in sylvis et versuris, sero autumno. Species esculenta, habitu turbinato proprio, magnitudine mediocri, sed crassa, subtus pallescens.

Obs. Sequentes, ut varietates putati fungi, forsitan distinctae species sunt.

B. vitulinus, pileo dilute rufo, lamellis stipiteque candidis. *Syn. fung.* p. 305. In pratis montosis in Germania.

y. Meisneriensis, totus cinerascens, pileo umbonato convexo-plano, lamellis crassiusculis subuplicatis, stipite substriato. *Syn. l. c.* In pratis in Hassiae monte Meisner repertus, sapore gratus.

d. cinereus, pileo carnosò subnitido, lamellis distantibus plano-decurrentibus, stipite crassiusculo albicante. *Syn. l. c.* In graminosis apricis prope Gottingam lectus. Pileus exsiccatus margine nigricat. Sapor virosus. Distincta species?

155. *Amarella*, subparyus, pileo carnoso piano subumbonato gilvo seu pallide cervino glabro, lamellis confertis subgriseo-dilutioribus, stipite compacto basi albo-villoso aequali.

In graminosis; pratis, perfectioribus rarus. Stipes solidus, subtenax & unc. fere longus, et 2 lin. et ultra crassus. Lamell. subnitentes, nonnullae simpliciter dichotomae. Pileus 1 $\frac{1}{2}$ unc. latus, firmus. Odor fortis et sapor valde amarus.

156. *nemoreus*, magnus solitarius, pileo late umbonato fulvo-subserrcente, lamellis decurrentibus albis subdistantibus, stipite longissimo solido basi lanato. Syn. fung. l. c. vid. Tab. XXVIII. f. 1. et 2. tertia parte reducta.

In sylvis, locis umbrosis rarius provenit. Stipes 3 - 4 unc. longus, $\frac{1}{2}$ crassus. Lamellae 2 - 3 lin. latae, longe decurrentes, albae. Pileus compactus, 3 unc. latus.

*** Colore pilei albido, pallente.

157. *sapidus*, subsolitarius totus albus, pileo carnoso planiusculo laevi unicolor, lamellis plano-decurrentibus subdistinctis, stipite aequali solido subtenace.

In sylvula Vincennes, prope Parisios, collectus, Octobri. Magnitudine mediocri. Pil. 2 ad 2 $\frac{1}{2}$ unc. latus. Lamell. 2 lin. latae. Stipes 2 unc. longus, 2 - 3 lin. crassus. Sa-

por fungi recentis gratus, uti Ag. *campestris*.
Linn.

158. *virginicus*, gregarius parvulus albus, pal-
lens, pileo planiusculo subpallido, adulto
margin'e subinfexo striato, lamellis distanti-
bus decurrentibus, stipite incrassato elasti-
co. *Syn. fung.* p. 456. *Jacq. Miscell.*
Austr. 2. pl. 104. t. 15. f. 1. *Bull. Ameri-*
torum: *Ejusd.* t. 551. f. 1. *Agaricus ericeus*. *Bull.* t. 188. *America-*
torum: *Ejusd.* t. 551. f. 1.

Agaricus niveus. *Schaeff.* t. 232. A. *cha-*
vaeformis. *Ejusd.* t. 307. ?
Agaricus transformis. *Holmsk. Fung.*
Dan. 2. p. 61. t. 33.

Sat vulgaris, sero autumno pluvioso, in
pratis pascauis, ericetis, passim in sylvaticis,
locis magis apertis. Stipes elasticus, primo
farctus, dein cavus, deorsum attenuatus. La-
mellae venose conjunctae. Pileus subviscosus,
tempestate humida, porum carnosus, praeser-
tim margine, primo elavae-formis.

159. *eburneus*, gregarius candidus, pileo sub-
carnoso viscoso planiusculo, margine laevi,
lamellis subdistantibus decurrentibus, stipite
elongato, apice squamuoso. *Syn. fung.*
p. 364. *Bull.* t. 591. *Fries Syst.* 1. p. 33.
Sowerb. t. 71. (A. *nitens*). *Agaricus cossus*.
Ejusd. t. 121. ?

Agaricus lacteus. *Schaeff.* t. 39. A. *vir-*
gineus Batsch. *El. fung.* p. 39. t. 3. f. 12. ?

B. pallens, subparvus, pileo viscoso pallente, primo convexo, dein subinfundibuliformi, lamellis subdecurreptibus albis; stipite duriusculo, apice squamuſis subfarinaceis tecto.

Hæc species solummodo in sylvis crescit, et communis est durante autumno. Stipes longitudine variat à 2, 3 et 4 unc., 3 lin. crassus. Pileus utic. 1 latuſ. Sapor sat ingratuſ et odor fortis in A. casso Sowerb.

Pileus in *B. subpellucidus*, 1 $\frac{1}{2}$ unc. latus. Stipes 1 $\frac{1}{2}$ unc. longus, 1 lin. 1 - 2 crassus.

160. *dolosus*, subgregarius pileo subcarnoso plano-depresso opaco rufo bádio, lamellis distinctis subdecurrentibus stipiteque aequali candidis.

Passim provenit ad sylvarum margines, locis graminosis, muscosis, substerilibus. Russulam primo obtutu refert.

Stipes 2 unc. longus, 4 lin. crassus, solidus, apice subsquamulosus. Lamell. parum latae et crassae, praesertim in bene adultis. Pileus 2 unc. ad 2 $\frac{1}{2}$ latus. Sapor subadstringens, vel urens.

Obs. Aliquam affinitatem habet cum A. eburneo, sed humectatus parum viscosus appetet, pilei superficies spurie filamentosa est.

161. *gummousus*, gregarius, pileo subtemui convexo viscoso albo, lamellis plano-decurrentibus venoso-connexis pallide lutescentibus,

stipite longo tenui elasticō, apice flocculo-
so, albo.

In sylvis umbrosis, sub finem autumni.
Stipes flexuosus, deorsum sensim attenuatus,
farctus, interne fibrosus, nitens, 3 unc. lon-
gus, sed tenuis, 2 unc. crassus. Lamell. ni-
tentes, ex albido lutescentes, prope stipitem la-
tiores, distinctae. Pileus ultra 2 unc. latus,
parum modo carnosus, praesertim in ambitu,
fete insipidus est, et odore non ingratus. Ex
his allatis diversitas ab *A. eburneo* satis liquet.
162. subopacus, solitarius submagnus, pileo sub-
carnoso convexo-plano lateque sed obsolete
umbonato, albo, lamellis plano-decurrenti-
bus ex albido pallidis subnitentibus, stipite
duriusculo farcto basi incurvo ibique vil-
losa.

Agaricus opacus. Sowerb. t. 142.

Crescit in Anglia et Gallia (prope Parisios
in sylvula Vincennes) inter folia sicca quercina,
cum quibus stipes dense adhaeret tegmine villoso.

Stipes 2 $\frac{1}{2}$ unc. longus, 3-4 lin. crassus,
superficie subfibrillosus, dein cavus. Lamel-
tenues plano- etiam subarcuatim decurrenti.
Pileus carne, sed subtenui, compactus, 3 unc.
latus, opacus, odor sat fortis, sed sapore aci-
dulo, etiam Ag. *campestris* haud ingratus,
quare haec species esculenta videtur.

Obs. Crescendi modus, color uti et for-
ma, umbone excepto, paulloque major, uti

in Agarico *phyllophilo* et juxta eum locandus, sed propter pileum non umbilicatum, vel depresso in dispositione systematica, saepe artificiali, alias locus illi dari debebat.

163. *discoideus*, subcaespitosus, pileo plano depresso glutinoso, disco rufescente-ferrugineo, lamellis confertis decurrentibus albis, stipite subsolido subfarinaceo albo. *Syn. fung.* p. 365. *Fries* p. 33. (excl. *Syn. Battarr. t. 13. f. F.*)

Multo rarior occurrit in sylvis Germaniae et Sueciae. Stipes vix 2 unc. longus, 2-3 lin. crassus, etiam sursum squamulis farinaceis obiectus, intus parum rufescit. Lamellae angustae, lin. 1 latae, subrufescentes. Pileus 2 $\frac{1}{2}$ unc. latus, disco depresso et ibi colore rufocinnamomeo conspicuus, margine albicans. Substantia subcompacta, masticando mucilaginosa. Odor subvirosum.

Obs. Huc pertinere videtur *Ag. discosanthus*. *Fries Obs. Mycol.* 1. p. 15: nec non *Battarr. t. 21, f. F.*

164. *rubescens*, pileo carnoso planiusculo margine tomentoso revoluto, disco rubescente, lamellis distantibus subdecurrentibus, stipite sursum incrassato squamuoso, pileo concole. *Syn. fung.* p. 366. *Fries Syst.* p. 3^a. (*A. erubescens*).

In fagetis et sylvaticis graminosis, Sept. Oct. Stip. 2 unc. et ultra longus. Pileus 3 unc.

latus, margine involutus, et ibi tomentosus.
Stipes subviscidus, 2-3 unc. longus.

β. carnosus, gregarius flexuosus, pileo carnoso
albo, maculis sanguineis variegato, margine
tenui tomentoso, stipite solidō flexuoso al-
bo-rubellove vario.

Agaricus carnosus. *Curtis Londin.* t. 71.
Sowerb. t. 246. — *A. sanguinalis*. *Batsch.*
t. 36. f. 201.?

Hab. in Anglia et Gallia.

Substantia totius fungi dura, interne ru-
bescens. Pileus 2-3 unc. latus, 3 lin. cras-
sus. Lamell. parum decurrent, margine ru-
bro-maculatae. Stipes 2-3 unc. longus, 3-4
lin. crassus, deorsum attenuatus. Sapor in-
gratus, amarus.

γ. haematodes, gregarius carnosus compactus,
pileo plano, marginē subinvoluto, sanguineo,
squamulis liturisque minutis distincto,
lamellis confertis albis, demum colore sub-
sanguineo suffusis, stipite solidō rubro,
punctis liturisque vario.

In sylva Bondy, prope Parisios, peculia-
ris haec varietas? reperta est. Pileus 3-4 unc.
latus, substantia crassa, firma, candida. La-
mellae angustae, adscendent. Stipes 2-3 unc.
longus, $\frac{1}{2}$ crassus, in specimine lecto utrin-
que attenuatus. Sapor acescit, etiam sub-
stipticus.

165. *ligatus*, gregarins albus, pileo laevi sub-

siccо, margine inflexo appendiculato, lamellis strictis, stipite farcto longo fibrilloso.

Fries Syst. 1: p. 32.

In Sueciae sylvis abiegnis muscosis, umbrosis. Aug. — Septembr. Stipes 3 unc. longus, 1 $\frac{1}{2}$ unc. crassus, basi attenuatus. vilosus. Pileus 1 - 2 unc. latus, floccis in velum contextum annulatum contextis. Sapor mitis. Variat maculis rubellis. l. c.

166. *purpurascens*, subcaespitosus, pileo carnoso convexo-plano squamuoso, margine initio involuto tomentoso, lamellis subdecurrentibus albis, stipite mediocri squamuoso, pileo concolore. Consp. fung. p. 182 -

183.

„Occurrit species pulchra, in Lusatiae sylvaticis abietinis muscosis, et in aliquot locis greges ingentes efformans. Stipes aequalis, 2 unc. fere longus, 4 - 6 lin. crassus, albus, squamis purpureis variegatus; macula annulari ejusdem coloris. infra lamellas saepe pictus. Lamellae distantes, albae, demum quoque, imprimis margine, purpurascens. Pileus 2 - 3 unc. latus, squamulis, (interdum in strias subdispositis) purpureis pictus, margine candidus.“ Consp.

167. *chrysodon*, subcaespitosus, pileo carnoso convexo-plano albido, margine tomentoso flavescente, lamellis albis crispis, stipite sub-solido squamuoso flavescente. Syn. fung.

- p. 365. *Batsch. El. fung. Cont. 2. p. 79.*
 t. 38. fig. 212. *Fries, p. 32.*

Habit. in Germania, Suecia et Gallia in fagetis quergetis etc. Septembr. — Octobr.

Stipes etiam apice infra lamellas villo annulari distinctus. Stipes 2 unc. longus, $\frac{1}{2}$ crassus. Lamellae albae, etiam incarnatae et margine flavo-floccosae sunt, Pileus denum subdepressus, $1\frac{1}{2}$ unc. latus, margine involuto, flavo-villoso. — Var. floccis albis β . *leucodon* Consp.

168. *pudorinus*, pileo laevi incarnato, margine nudo, stipite solidi punctato-scabro, apice subcoarctato. *Fries L. c. p. 33.*

Crescit in sylvis abietinis montosis, Julio-Augusto. Stipes 2-4 unc. longus, $\frac{1}{2}$ crassus, glaber, albidus. Lamellae distantes. Pileus convexus, viscosus, demum depresso, 2-4 unc. latus. *Fr.*

169. *platycephalus*, magnus candidus, pileo applanato laevi, lamellis raris decurrentibus, stipite glabro farcto, dein cavo, aequali.

Monomyces platycephalus. Battar. p. 43.
t. 19. f. H.

Circa Covignanum in Italia autumno lectus. Pileus, cum lamellis, conum inversum aemulatur. Batt. 4-6 unc. latus, nec sulcatus, neque viscosus. Lamellae longe decurrent, distantes. — Hicce fungus formam quidem communem habet, tamen distinctum puto a

nonnullis habitu consimilibus, ex. gr. *Ag. eri-*
eo, virgineo etc.

170. *opacus*, gregarius subcaespitosus opaco-
albus, pileo carnoso umbonato, demum de-
presso, lamellis confertis brevi-decurrenti-
bus, stipite sublongo flexuoso, deorsum sub-
incrassato, solido. — *Sowerb. t. 142.*

Supra et inter folia sicca, in Anglia ex
auctore communis. Sat magnus, habitu *Ag.*
phylophilum adaequat, adspectu parum diffor-
mis est. Pileus 3 unc. latus, repandus, obtu-
se umbonatus. Lamellae fere horizontales, sed
in pileo depresso longe decurrentes apparent.
Stipes 3 unc. fere longus, ultra 4 lin. crassus,
parum curvatus. *Ex ic.*

171. *fragrans*, subgregarius parvulus palles-
cens, pileo subhumido convexo, dein de-
presso, lamellis subdecurrentibus angustis,
stipite sublongo aequali. *Tab. XXVII. Fig. 5.*
Sowerb. t. 10. Fries Syst. p. 171.

In sylvaticis locis apertis graminoso-mus-
cosis, sero autumno. Odore *Anthoxanthi*.
Pileus communiter unc. 1 latus, rarius umbi-
licatus, colore etiam albicans. Stipes in meo
fungo farctus, dein parum cavus.

172. *amarus*, compactus candidus, pileo pla-
niusculo rimoso-viruloso, disco rufo, la-
mellis decurrentibus, stipite solido subto-
mentoso. *Fries Syst. 1. p. 87. A. virulo-*
sus, B. Consp. fung. p. 185. ex Fr.

In sylvaticis mixtis subhumidis, autumno in Lusatia, et Smolandia. Pileus 3 unc. fere latus; modice convexus, dein planiusculus, subtiliter concentrica squamuoso - rivulosus, margine primum involutus. Lamellae congestae, angustae plano subdecurrentes. Stipes $\frac{1}{2}$ unc. longus, $\frac{1}{2}$ lin. crassus, teres, solidus obsolete tomentosus. *Consp. t. c.*

Obs. Non confundendus, uti videtur cum *Agarico leucocephalo* Bull., vulgari, qui etiam valde amarus est, sed cuius pil. et stipes glabri sunt.

173. *rivulosus*, compactus, pileo carnoso convexo piano ex albido rufescente, exsiccando rimoso - rivuloso, lamellis subdecurrentibus albo-pallescens, stipite subtomentoso albido. *Syn. fung. p. 369.*

In pinetis Hercynicis. Stipes unc. 1 longa, 3 lin. crassus. Lamellae 1 $\frac{1}{2}$ lin. latae. Pileus $\frac{2}{3}$ latus, glaber, pallescit, insipidus.

174. *anisatus*, gregarius pileo carnoso planiusculo laevi-glaucō (passim virescente) lamellis confertis subdecurrentibus albidis, stipite solido subflexuoso pileo concolore. *Obs. Mycol. 1. p. 323. A. odorus. Syn. fung. p. 323.*

Agaricus odorus. Bull. t. 176. et t. 556. f. 3. Sowerb. t. 42. Flor. Dan. t. 1611.

In sylvis frondosis, autumni initio sat frequens inter folia decidua. Stipes basi incur-

vas, villo dense cum terra foliisque adnatus, apice parvo tomentosus, nonnunquam ventricosus invenitur. Pileus disco subdepressus, variat umbonatus, umbilicatus, et tempestate secca colore, praesertim in lamellis albidq, odor interea anisatus mox speciem indicat.

175. *suaveolens*, fragrans albus, pileo convexo laevi, lamellis leviter decurrentibus confertis, stipite subfascio, basi incrassato villoso. *Fries Syst. I. p. 91. Schumach. Saell. p. 337. †*

In muscosia, passim in Suecia et Dania.
„Color etiam humid fungi albus. Stipes dein cavus, $1\frac{1}{2}$ unc. longus, 3 lin. crassus.

175. b. *candidans*, subparvus, pileo laevi convexo, dein umbilicato, lamellis adnatis, dein decurrentibus stipite elastico cavo, basi villoso. *Syn. fung. 457. Fries p. 91.*

Agaricus umbilicatus. Bolt. t. 17. A. cyathiformis. Bull. t. 575; f. E.? (Stipes longior).

Autumni initio in sylvis frondosis. Ad minores pertinet. Stipes subundulatus, basi cohaerens, $1\frac{1}{2}$ -2 unc. longus. Lamellae confertae decurrent, non venis connexae.

β. ? *tritus*, totus albus magnitudine media, pileo subumbilicato nitente - polito, lamellis piano - subdecurrentibus, stipite rigido subbrevis.

Passim in sylvaticis. Stipes unc. $1\frac{1}{2}$ lon-

gus, 2-3 lin. latus. Lamell. angustae, tenues. Pileus unc. 1½ latus, margine connexus, substantia rigida, fere cartilaginea; sapor ut in Ag. campestris, sed fortior.

176. *subcaesius, parvulus, pileo subcarnoso, plano opaco albido-caesio, lamellis albidis decurrentibus, stipite albicante-subfuligineo.*

In sylvis passim. Pileus 4 lin. latus. Stipes unc. 1 longas, vix lin. crassus.

177. *purpuropus, parvulus, pileo subcarnoso planiusculo albido, disco subfuliginoso, lamellis crassiusculis dentato-connexis subdecurrentibus, stipite tenui albo-rufescente, sicco purpurascente-vinoso.*

Rarius in sylvis. Stipes 1-2 unc. longus, vix lin. crassus, apice albicans. Lamellae angustae ½ lin. latae. Pileus ½ unc. latus, inodorus.

178. *grossulus, pumilus, pileo subcarnoso, disco camerato, albicante, lamellis distantibus crassiusculis decurrentibus, stipite subbrevi tenui, sursum latiore. Tab. XXVI. f. 2.*

Prope Parisios rarius occurrit. Pileus plus minusve ½ unc. latus, margine subundulatus, natura sicca. Lamellae crassae. Stipes albidus, exsiccando subfuligineus. Habitum quemdam rudem prae se fert.

179. *buccinalis, parvus gregarius candidus, pileo convexo glabro, lamellis distantibus de-*

currentibus stipite sublongo farcto? basi fibrillis radiatis distincto. — Sowerby t. 107. f. 1. (exclus. synonymo).

Agaricus stellatus. Fries Syst. 1. p. 85.
Ejusd. Obs. Mycol. 1. p. 85. varietas?

In Anglia non raro ad caules herbarum inter muscos, locis umbrosis, in Suecia ad trunco^s vetustos putrescentes. Stipes pro parvitate pilei longus, cavus pictus in fig. Sowerb., farctus ex Fr., subincurvus, membranulae convexae radiatae innato Fr. Pileus striatus (ex Sow. omnino laevis, nempe carnosulus videtur), 3-4 lin. latus, et lamell. tenues in fungillo suecico.

180. *scyphoides*, candidus, pileo inaequali sericeo, lamellis subplicaeformibus, stipite villosa. Fries, loc. cit.

B. buccinalis, caesio-albus tener, pileo membranaceo foveato, laminis in stipitem brevem flexuosum decurrentibus. Batsch. El. fung. 2. p. 86. t. 39. f. 214.

Ad terram locis humosis graminosis. Pilus subrepandus, villoso-sericeus, subindetotus infundibuliformis, 2-4 lin. latus. Lamel. confertae, angustae. Fr. In fungo Jenae lecto (qui Ag. *virgineo* valde affinis videtur) pileus est membranaceus, margine inaequali, fere excentricus, adultus striatus. Stipes flexuosus et interne filiformi canali pertusus. La-

mell. laxe dispositae, longiores falcatae, et in stipitem decurrent. *B.*

181. *undulatus*, solitarius parvus, pileo tenui applanato ut plurimum zonato, lamellis angustis confertis subdecurrentibus, primo niveis, demum fuligineo - pallentibus, stipite fistuloso subaequali superficie undulato colore.

A. *undulatus*, exiguus tenellus, stipite fistuloso nudo undulato, pileo complanato zonato, lamellis angustis subcurvilineis. *Bull. Hist. d. Champ. p. 462. t. 535. f. 2.*

In sylvatum locis herbosis. Hab. autumno. Terrestris solitarius. Stipes albus, seu fuligineo-stramineus, lin. 1 fere aequans, unc. $1\frac{1}{2}$ altus. Pileus primum subturbinatus, albus aut cinereus, apice stramineus, nunc laevis, nunc ramentaceus (convexus) demum complanatus; caro crassiuscula. Lamellae subcurvilineae, basi declives. *Bull.*

182. *phacellus*, parvus fasciculatus albicans, pileo subcarnoso convexo - plano laevi, lamellis confertis subdecurrentibus, stipite longo tenui dein subfuliginoso.

Hab. ad terram inter quisquilias, cum quibus stipites et inter se cohaerent, fasciculum efficientes visu satis gratum. Pileus 3 lin. fere latus, tenuis orbicularis, glaber. Lamel. confertae, planiusculae et breviter decurrentes. Stipes pro fungilli parvitate longus $1\frac{1}{2}$ - 2 unc., sed

sed tenuis, fere filiformis, subflexuosa glaber, exsiccando subrufescens - fuligineus, et fere corneus evadit.

183. *hygrophilus*, subgregarius exiguis candidus pileo planiusculo carnosulo, lamellis subdistantibus decurrentibus, spice divisia, stipe subbrevi aequali.

Pusillum hunc fungum inveni saepe finem Junii in sylvula (Metidon prope Parisios) locis humidis subuliginosis, in ramulis etc. crescentem, quoad habitum non male simulat Ag. buccinalem Sowerb., sed multo minor est et lamellis differt. Stipes l. unc. fere longus, sat firmus, l. lin. fere crassus, glaber totus albus. Pileus ad 3 lin. latu. Lamellae strictae, nec rugas sicut sunt, qua nota et stipitis colore et substantia differt ab Ag. *epiphylla*.

Hab. Grmnrvs. Pileo carnoso vel carnosomembranaceo margine laevi, plerumque convexo rarius depresso. Lamellis exsiccatis, marcessentibus, liberis vel stipiti toto aut ad partem adnexis (non decurrentibus), sporulis albis aut lutescentibus non rubicundis, dampnum coloratis. Stipite nudo.

* Colore pilei albo.

184. *leucocephalus*, gregarius, pileo carnoso convexo subdepressoque (tunc subrepando), glabro albo vel pallide lutescente, lamellis distinctis emarginato - adnexis latiusculis,
Sectio tertia. H

stipiteque duriusculo albis. — *Bull. Hist. d. Champ. s. p. 597. t. 536. et t. 428. f. 1.*

Vulgaris, praesertim circa Parisios, in sylvis frondosis. Stipes aequalis crassitudine, sed subflexuosus, 2 - 3 unc. longus, $\frac{1}{2}$ unc. fere crassus, glaber. Lamel. subventricosae, interdum sublineatim decurrentes. Pileus compactus, 2 $\frac{1}{2}$ unc. latus. Sapor constans valde amarus, quo mox a consimilibus distinguitur species.

Obs. Pileus plerumque, fungo adulto, inaequalis, subflexuosus, aliquando invenitur valde aequalis, imo subumbonatus ut aliam speciem crederes. Haec species, quae sine dubio in pluribus regionibus occurrit, forsitan cum aliis confusa, aut sub diverso nomine descripta. Interea huc pertinere videtur *Ag. albus*. Bolton. *Fung. Append.* t. 155., *Ag. nitens*. Schaeff. t. 238.?, sed de quo pileus viscidus dicitur, quod in nostrum non quadrat, et forsitan *Ag. cerussatus*. Flor. Dan.

185. *albus*, totus albus glaber, plerumque solitarius, pileo carnosō convexo, lamellis confertis emarginato-adnexis, stipite subcrasso breviusculo solidō. *Syn. fung.* p. 363. (Excl. *Synón. Batschii*). *Consp. fung.* p. 181.

Cresc. in quergetis et ericetis, sed minus communis. Stipes glaber, compactus, 2 unc. longus, $\frac{1}{2}$ crassus. Lamellae distinctae, inter-

dom servulatae. Pileus marginē subinvolutus, 2-3 unc. latus, sapore subvirosum.

186. *amarulentus;* pileo carnoso late umbonato albido, lamellis confertis subrufis, stipite crasso ventricoso subrufo-villoso.

Pieromyces albidus. Battarr. p. 47. t. 15.

f. D.

Autumno in Italiae sylvis prostat. Secundum auctorem radix est expansa, membranaceo-lacera. Stipes rigidus, primo farctus, dein cavus, 1 unc. & crassus, & fere longus. Pileus 2 unc. latus, mammosus, sapore amari-
cans.

187. *maculatus,* subcespitosus candidus rufesc-
cente-maculatus, pileo compacto laevi, la-
mellis emarginatis, stipite longo glabro.
Fries Syst. I. p. 45. Conspr. fung. p. 186.

Huc usque in Lusatiae pinetis, locis hu-
midis muscosis, praesertim apaludosis inven-
tus. Ad maiores pertinet, pileus eam aliquan-
do est semiipedalis, plerumque 3-4 unc. latus;
ab initio hemisphaerico-convexus: margine
involuto et subtomentoso, dampnum applanetur;
Stipes subatriatus, 3-4 unc. longus, $\frac{1}{2}$ cras-
sus, fere aequalis in fungo maturo excavatus.

188. *dilatatus,* cespitosus subviscosus albus,
pileo carnoso convexo-planato, margine re-
pando, primo involuto, incisoque lobato
difformi, lamellis confertis adnatis, stipite
brevi crasso albo-tomentoso.

Agaricus difformis. Schum. Saeland. p. 336.

In Deniae pinetis non infrequens. et interdum in series decessas crescat. Pileus 3-5 unc. latus. Lamel. lineares, subdescurrentes. Stipes 2-3 unc. longus, 1 $\frac{1}{2}$ crassus; basi est subbulbosus, apice dilatatus.

189. *ponderosus*. solitarius magnus totus albus, pileo carnosus, demum applanato margine subsinuato glabro, lamellis confertis lati dentatim affixis, stipite valide sublonge glabro.

Hab. in sylvis frondosis arenosis et ericatis (circa Parisios non raris, etiam in Germania a me visa). Stipes farctus, demum pro more subcavus, saepe curvatus, 3 unc. longus, 1 fere crassus. Lamellae distante affixa, subventricosae, fragiles. Pileus latitudine palmari, sericeo quasi nitet, sed non velutinus, substantia compacta, sapore primo submitis, deinde virosus, odore vero non ingratus.

190. *cretaceus*, cespitosus albus, pileo carno-
so-convexo-plano, lamellis subconfertis ad-
nexis, stipite farcto subtemento. Syn.
fung. p. 369.

In pinetis hercynicis rarius nascitur. Stipes subcompresso, basi curvatus, cum vicino connatus, 2-3 unc. longus. Lamellae tenues, angustae, aquose albae. Pileus semiuncialis.

191. *Lignatilis*, caespitosus, pileo carnoso plumbastro, musculo fivescere albo; lamellis confertis adnexis, stipite farcto subtomentoso. *Syn.*
p. 368.

Rarius prostat in truncis lignisque putrescentibus. Stipes subradicatus, 1-2 unc. longus, a. lini. crassus, centralis? Lamell. candidae; dein turbidæ; tenues, lineares. Pileus h[ab]et 1 unc. latus, graveolens.

Obs. Nonne *Ag. lignatilis*, pileo irregulare subaxcentrico villosulo albido, stipite flexuoso, basi villosa. *Fries Syst.* p. 94. a nostra diversus, sq. potius ad aliam divisionem attinet?

? *lachnopus*, irregularis tenax, pil. repando cinereo, lamel. subvenosis candidis, stipite brevi subcavo villoso. *Fries Obs. Myc.* p. 18.

In truncis putridis, locis umbriosis. Lamel. saepe furcatae. Pileus subnudus.

192. *ramosus*, niveus, pileo carnoso, dein complanato, lamellis confertis falcatis, stipite longo farcto ramoso. *Bull. Hist.* p. 591, t. 102.

In sylvis, cryptis et caldariis invenitur. Plura individua ex eadem basi radicosa prodeunt. Stipes modice crassus, subaequalis, ad 6 uncias altus. Pileus laevis, subnitens, passim depresso, 2-3 unc. latus. *Bull.*

193. *candalaris*, subterraneus caespitosus totus

albus, pileo hemisphaericō, glabro, lamellis distantibus latis, stipitibus longissimis farctis attenuatis.

Agaricus longipes. Scop. fung. subterrān. p. 108 - 109. t. 32 - 34.

In cuniculis Cupri-fodinae Schemnizii repertus. Modo stipites plures ex una basi, modo vero unicus est; sed tunc in ramos divisus; nonnulli subventricosi, nec omnes pileati sunt. Totus fungus, dum siccus est, ardet candelae adinstar, flamma alba. Scop.

* *clavatus*, caespitosus albus durus glaber, pileo ovali cum stipite cohaerente. Scopoli l. c. p. 110. t. 36.

Stipes divergens, planus, nudus, aequalis. Pileus obtusus, laevis. Scop. Fungus nondum evolutus videtur, uti sequens, et cuius color non indicatus est.

* *coralloides*, ex una basi plures exeunt stipites ramosi, quorum longiores convexo et parvo pileo terminati sunt. Scop. l. c. p. 109.

Cum priore. Praeter stipites, prodeunt etiam ex eadem basi corpora laciniata, numerosa, quae sunt imperfecta aliorum cauliū rudimenta. Pileus convexus, laevis. Lamellae parvae, rarae, decurrentes. loc. cit.

194. *sambucinus*, oolidus, pileo carnoso obtusa sericeo laevi stipiteque solido, obeso, albis, lamellis adnexis albido-brunnescentibus. Fries

Syst. 1. p. 256. A. candidus. Ejusdem
Obs. 1. p. 8.

$\beta.$? obesus, pileo flexuoso pallescente. Sym.
fung. p. 350. (ex D. Fries).

In sylvis arenosis. Stipes aequalis, seu
basi incrassatus, striatus, apice subpulverulen-
tus, 1 - 2 unc. longus, $\frac{1}{2}$ crassus. Lamel. la-
tiusculae. Pileus saepius repandus, ultra 2 unc.
latus. l. c.

195. cerussatus, inodorus albus, pileo carnoso
laevi, lamellis adnatis confertis, stipite soli-
do, basi tomentoso. Fries l. c. p. 92. Flor.
Dan. t. 1796.

In sylvis umbrosis, praesertim acerosis
muscosis, in Suecia et Dania. Stipes basi in-
crassatus, radiculisque fibrillosis donatus, 2 - 3
unc. longus. Lamellae parum decurrenti. Pil.
primo subconvexus, mox planus, 2 - 3 unc.
latus. — An diversus ab A. leucocephalo B.?
De sapore nil dicitur.

189. dealbatus, (varians), inodorus albido,
pileo tenui laevi subinaequali, lamellis ad-
natis confertis, stipite farcto aequali glabro.
Fries l. c.

$\beta.$ aggeralis, pileo subexcentrico, stipite elon-
gato tenui pallido. loc. cit.

In pratis, arvis, versuris vulgaris dicitur.
Forma varius, uti et colore etiam fuscescente
et incarnato. Pileus leviter carnosus, saepe

depressus, 4-5 unc. latus. Lamel. angustae. Stipes brevis, tenax, ac tenuis. Fr. gregariorum et caespitosus, pileo (ob mutuam compressionem) undulato, difformi, subzonato, stipite brevi subcrasso, saepius excentrico.

Loci ruderatis et in aggeribus inter lapides hunc fungum inveni, qui magnitudine mediocri est, et fragilis saporeque amaro distinctus. An distincta species?

d. agrestis, parvus, pileo repando lobato umbonato, stipite brevi tenui. Sowerb. t. 123.

Greville Flor. Edinens p. 376. A. dealbatus.

In Angliae pratis, campis, vulgaris autumno. Pileus aliquando depresso, 1½ unc. latus. Lamel. angustae, irregulares.

197. *sepincola*, subparvus albicans opacus, pileo carnoso subdepresso glabro, margine laevi, lamellis adnexis parum decurrentibus, stipite rigido subfibrilloso.

Ad sepes, in dumetis umbrosis subhumidis repertus. Stipes subtenuis, farctus, dein cavus, apice minutim squamułosus, 1½ unc. longus, 2 lin. crassus. Pileus, jam ab initio, plus minusve depresso, adultus subrepandus, passim rubro-tinctus. Sapore est ingratus, sed odore farinaceo. Lamel. non sunt incarnatae.

Obs. Antecedenti, mihi hucusque ignoto,

forte nimis affinis, sed pilea non eadem difformi, et stipite non glabro: discrepat. ^{198.}

peltigerus, gregarius et subcaespitosus: totus candidus parvulus, pileo orbiculari, primo convexo, dein subumbonato laevi, lamellis confertis adnexis paulisper decurrentibus, stipite solido nequamali, basi villosus.

Inveni hanc fungitatem sub finebris Octobris in pratis submuscesis in viridario quodam. Stipes (nennulli basi cohaerentes) 1 $\frac{1}{2}$ unc. longus, lin. 1-1 $\frac{1}{2}$ crassus, firmus. Pileus subcarnosus junior clypeiformis, regularis, adultus subdepressus, ultra unc. latus, opacus. Sapor virosus, subacris.

199. vatriosus, pileo subcarnoso convexo-plano laevi albido, lamellis adnexis albido-fuscescentibus, stipite fistuloso contorto albo-pulverulento. *Fries Syst.* p. 259.

In Soticias pinetis humidis. Stipes uncialis, basi villosus, lin. 1: crassus. Lamel. laetae. Pileus subumbonatus; $\frac{1}{2}$ unc. latus. *Fr.* *200. argillaceus*, parvulus, pileo conico umbonato albo subnitente, lamellis primo concoloribus, demum argillaceis, stipite brevissimo, solidu subtenui. *Syn. fung.* p. 372. *Ic. pict.* t. 14. f. 2.

Agaritus inodorus. *Bodd.* t. 524. f. 2.

A. geophyllus (*geophilus*) var. α . *Fries L.* c. p. 258. *A. albus* *Schum.* p. 309.

Non raro est in sylvis, ad terram nudam,

praesertim humentem. Stipes subflexuosus, pa-
rum pulverulentus, 1 - 2 unc. longus, lin. i
crassus. Lamel. toto adnexae, decolorantes,
sub lente punctatae. Pileus superficie striato-
sericeus. Cortina fugax a nonnullis observatur.

Obs. Cum Ag. *geophila* magnam quidem
habet affinitatem, quocum nonnunquam pro-
mixta, majoris tamet in copia, crescit, sed
color: semper differt. Sapor vitosus.

Ag. candidus. Batsch, t. 20, f. 106. stipite crassiore sub-
bullosa decumbente, a D. Fries Syst. I. p. 259.
sei. *hololeucus*, *gregarius* albidus; pileo sub-
carnoso acute umbonate subsericeo, lamellis
confertis subuncinatis niveis, stipite sublon-
go aequali.

Ressim occurrit in sylvis. Stipes subfle-
xuosus, 2 unc. longus, 2 - 3 lin. crassus. La-
mellae immutabiles, toto adnatae. Pileus cam-
panulato-conicus, subinde rimosus, demum
pallescens, 1 - 1 $\frac{1}{2}$ unc. latus, fragilis, amari-
cans.

Obs. Conf. A. *lucifugus* Fries p. 258. et
hujus var. colore albido. Nostra species cum
antecedente, sed magis cum A. *rimoso*, affini-
tate conjuncta est.

* *epichizus*, parvulus albidus, pileo hemisphae-
rico subumbonato glabro, lamellis concolo-
ribus?, stipite tenui aequali.

Fungus pratensis: parvus albidus., radici-

bus Graminis Dactyloideis, spicis villosis in-
nascens. *Mich. Gen. pl. p. 146, nr. 25. tab.*
74. f. 3.

Crescit autumno, circa Florentiam, in
pratis et pascuis ad radices vetustos? grami-
num, quam ob rem adnotandus meretur. For-
sitan niera est var. albida Ag. *caryophillei*.
202. *bulbopilis*, parvus solitarius albus, pileo
subcampanulato glutinoso, margine lutes-
cente, lamellis confertis, stipite pleno atte-
nuato ovato-bulbosco; bulbo pilis longis ob-
sito. *Raddi in Actis Societat. Italianae.*
Moden. 1806, Vol. 13. t. 4, f. 12.

Inventus mense Decembri in Horto me-
dicinali Florentino. Pileus $\frac{1}{2}$ unc. latus. Sti-
pes $\frac{1}{2}$ unc. longus, sub pileo vix lin. 1 cras-
sus, sed basi ad 3 lin. tumidus.

203. *cucullatus*, subgregarius parvulus candi-
dus, pileo campanulato laevi, lamellis ar-
cuatis, stipite longo deorum incrassato pilo-
so: pilis erectis. *Syn. fung. p. 373.*
β? *Flor. Dan. t. 1670. f. 1. Schum. Seelt.*
p. 269. Pileo albido - cinereo, stipite con-
colore pilis reflexis vestito. *S.*

In muscosis, repertus, in Germania. Sti-
pes cavus, 2 unc. longus. Pileus 3-4 lin. la-
tus et altus. β. in Daniae pinetis, muscosis
humidis.

204. *mitratus*, gregarius albicans, pileo cuau-
lato obtuso laevi, exsiccando plicato fus-

cescentē; lamellis adnatis adscendentibus; majoribus latibribus; stipite albido glabro, basi dense villoso.

Invenit, sero autumno, in viridario quodam ad stroblum pini dejectum, ratus ad eius ramulos. Forma haec ingratissimata donata. Stipes non radicatus, unc. & longus. Lamel distantes, uncinato adnexae. Petis fere carnis, 3-4 lin. latus et altus.

205. ramealis; gregarius pumilus, pileo carnosō membranaceo orbiculari albido, exsiccando ruguloso albido subrufescente, lamellis angustis adnatis, stipite brevi farcto pulveraceo squamuoso; *Syn. fung.* p. 375. *Bull. t. 336.*

Agaricus candidus. *Bolt. t. 39.* (mediocris)

Hab. pulchella species in ramulis aridis quercinis, praesertim vero tubeis; in Suecia quoque ex D. Fries, in ramis Pinī et Juniperi. Stipes rufescens, opacus, etiam albidus, firmus, basi, praesertim si in ramulis Rubi fruticosi crescit, torulo farinaceo cinctus, hinc sequentur fungū non valde diversum, et forsitan eundem puto.

* *platypus;* cihetēo-albus; pileo hemisphaerico laevi, lamellis crebris adnexis, stipite brevi, basi fibrosa verrucosa. *Nees ab Esenb. Syst. fung. 2. p. 51. t. 23. f. 188. Fries l. c. p. 154. Mart. Flor. Erlang. p. 430. (Inramulus).*

* *mollipes*, *gregarius parvulus*, pileo submembranaceo hemisphaerico albido, lamellis veris latiusculis, stipite tomentoso, basi orbiculari villosa, ramis adnato.

Quondam Turino a cl. Balbis missus. In omnibus *A. rameali* similis, excepto stipite, cuius basis fere tuberosa est, colore grisea, Denuo indagandus.

206. *cirratus*, *gregarius*, pileo subpapillato piano albido, disco rufescente, lamellis confertis albidis, stipite subelongato tenui rufescente fibrilloso. *Obs. Mycol.* 2. p. 94. *Syn. fung.* p. 374. *A. tuberosus*, B.

Inter folia arida, rarius in Agaricis exsiccatis, et absque Sclerotio crescit. Stipes, basi et ad latera, fibrillas longas sparsas emittit. Lamellae angustae, subdecurrent. Pileus 2-3 lin. latus.

B: *phaeothelus*, *parvus gregarius albidus*, pileo subconvexo: umbone papillaeformi rufescente, lamellis confertis albidis, stipite brevi subfibrilloso ex albido pallente.

Rarius ad latera truncorum, etiam inter folia crescit. Stipes unc. 1 altus. Lamel. angustae. Pileus subpellucidus, $\frac{1}{2}$ unc. latus; subumbilicatus, in junioribus nonnullis observatur.

y. *ocellatus*, pileo subcarnoso piano albo, deinde umbilicato obscuriore, lamellis adnatis albis, stipite subpulverulento rufescente, basi sa-

dicato - fibrilloso. Fries Syst. 1. p. 134.
Ejusd. Obs. 1. p. 83.

In Suecia ad terram inter folia. Stipes fistulosus, tenuis, pallide fuscescens, glaber; sed ejus basis radiculis villosis longis appendiculatus. Pileus sat tenax, margine patente crenulato et striato.

207. *tuberousus*, pumilus dense confertus, pileo ruguloso papillato glabro aut subsericeo, stipiteque firmo piloso - tomentoso albido-rufescens. Syn. fung. p. 374. Bull. Hist. d. Champ. p. 548. t. 256. et 522.

A. *tuberousus*, albus, pileo, subcarnoso dein umbonato, lamel. adnatis confertis, stipe fistuloso subnudo, sclerotiis innato. Fries l. c. p. 133. Flor. Dan. t. 1613.

Ag. Amanitae. Batsch. El. Cont. 1. f. 93.
A. *alumnus*; Bolt. t. 155. (mala). A. *bulbosus*. Schum. p. 307. A. *epiphyllus*. Trattn. fung. austr. t. 11. f. 22.?

Autumno pluvioso sat frequens occurrit in vetustis et subputrescentibus fungorum reliquiis, grege densa. Stipes pro basi habet varias Sclerotii species, sed etiam sine iis eum reperi (qui tunc subspeciem (A. Amanitae B.) constituere videtur); ceterum pro fungi parvitate satis crassus, subsolidus, villo denso matrici affixus. Pileus margine substriatus, sublente inspectus, rugulosus, etiam subtomentosus.

tosus, junior globosus subcarnosus. Lamellæ angustæ albidae, et albo incarnatae.

208. *parasiticus*, dense aggregatus; pileo subcarnoso ambonato, demum explanato, pallescente - albo, lamellis distantibus crassis fuscenscentibus, stipite subelongato fistuloso, basi villoso. — *Bull. Hist. d. Champ.* p. 609. t. 574. (exl. synon.) *Sowerb.* t. 343.

Fries l. c. p. 135.

Etiam in Agaricis putrescentibus nascitur, sed multò rarior est. Stipes longitudine varius, plerumque semuncialis, 1 - 2 lin. crassus, aequalis, Lamellæ tumidae, adnatae, passim divisæ, aliquando gyroso - intricatae, et in specime opportato, forsitan aegrotante, tormentose mihi apparuere, hinc ut steriles habenda?

209. *Lycoperdoides*, gregarius albicans, pileo ab initio globoso, dein hemisphaerico, tandem in pulverem colore argillaceum fatiscente, lamellis distantibus subtremellosis sterilibus (?), stipite brevi glabro. *Syn. fung.* p. 325. *Nees Syst.* t. 24. f. 194. *Sowerb.* t. 383. (in statu vetusto).

Agaricus Lycoperdonoides *Bull.* t. 516.
f. 1. *Elvela Clavus.* *Schaeff.* t. 279.

Singularis hic fungus autumno non raro conspicitur, supra Ag. adustum et fuscipedem, etc., exsiccatos et detritos. Ob habitum Agaricinum eum non silentio transeundum arbit-

tratus sum, quamvis ob naturam palei ejus, qui *Lycoperdorum* ad instar, mox in pulvrem, ex sporulis stellatis compositum, solvitur a ceteris valde aberret. Hanc ob rationem cl. Ditmar, praeeunte cel. Link, peculiare ex hac specie, constituit genus, quod sequens est:

ASTEROPHORA. *Sporangium hemisphaericum*, subitus lamellosum, stipitatum. *Peridium simplex*, rumpens et effundens sporidia angulata. *Link* Ob. serv. in Ordin. pl. Natur. Diss. 1. p. 33.

Asterophora Lyco-perdoides. *Ditmar*. Fung. german. Fast. 3. p. 53. t. 26.

** *Pileo colore variabiliter glabro, plerumque albido; stipite nudo, elongato rufescente, subtomentoso, aut radicato. (Galopodii).* Species ut plurimum ad terram crescunt, minus carnosae, ne magnae et satis pulchrae sunt.

210. *porreus*, gregarius, pileo subcarnoso, ju niore subrufescente, adulto et exsiccando albicante, lamellis rotundato-adnexis, stipe elongato pruinoso-tomentoso rufescente, basi villoso. — *Fries Syst.* 1. p. 128.

A. alliaceus, stipite plano perpendiculari, pileo semiorbiculari, lamellis falcatis liberis. *Bull. Hist. d. Champ.* p. 551. t. 424. f. 1. (excl. synonymis). *Jussieu in Act. Parisiens.* 1728. p. 382.

Sero autumno apparet in Quercetis, etiam Fagetis, inter fol. sicca, quibus villo molli aut strigoso subrufescente adhaeret, odore aliaceo, non ingratu, distinctus. Stipes cavus

3 unc.

3 unc. longus, lin. 1 et ultra crassus, spice albicans. Pileus orbicularis, opacus, laevis aut rugulosus, $\frac{1}{2}$ -1 unc. latus, carnosus membranaceus.

Obs. Ad partem, etiam huc pertinere videtur *Ag. alliatus*. Schaeff. t. 99. colore modo nimis rufescente pictus. *A. alliatus* Jacq. vid. infra.

211. *scorodonius*, graveolens parvulus, pileo subcarnoso lamellisque adnatis crispis albidis, stipite fistuloso brevi glabro rufo. *Fries Syst. 1.* p. 130.

Agaricus alliatus. *Syn. fung.* p. 373. *Consp. fung.* p. 189. *Obs. Mycol. 2.* p. 55.

In Germania et Suecia provenit in ericetis, pascuis, collibus apricis, sub aestatis finem. Pileus juniorum convexus e sordido rufo-pallescens et rugulosus, demum subdepressus, $\frac{1}{2}$ unc. latus. Lamellae basi venosae, demum liberae. Stipes vix radicatus, ultra unc. modo longus, in senioribus subnigricans, glaber. In statu recente graveolens, et in Lusatia in usum culinarem, sub nomine *Mouceton*, adhibetur, quod etiam cum antecedentibus fieri potest.

Obs. An *Ag. calopus* *Syn. fung.* p. 373. hujus speciei tantum varietas inodora? aut an ad *Ag. erythropum* pertinet? Observationes sufficientes adhuc desiderantur.

212. *croteus*, (*allixinus*) subgregarius, pileo

Secilio tertii.

I

submembranaceo hemisphaerico pallide cinerreo, vertice umbrino olivaceo vel ferrugineo-croceo, lamellis postice attenuatis libris albis, stipite longo flexuoso tomentoso albido croceoque. Schum. Saelland. 2. p. 271. A. porreus, et Syn. fung. p. 376. (excl. Syn. Bull.)

A. prasiosmos, oolidus, pil. hemisphaerico cinereo, lamellis subliberis, stipite elongato succo croceo referto. Fries Syst. p. 148.

B. crocatus, inodorus, pileo obsolete striato cinereo, lamellis attenuato-affixis albis stipiteque succo erucato refertis. Fries l. c. Schrad. Spicil. p. 127. Flor. Dan. t. 1550. f. 1.

Cum antecedente inter fol. decidua, praesertim faginea prostat. Stipes huic longus, croceo-sanguineus, strigoso-radicatus. Pileus umbonatus, colore varius. Fr.

γ. alliaceus (anglicus), graveolens, pileo subcoriaceo, demum planiusculo, remote striato, lamellis liberis albis, stipite longo pruinoso atropurpureo, basi villoso. Greville Flor. Edinens. p. 382. Sowerby t. 81. Scopoli Carinth. p. 271.

Cresc. quoque ad fol. emortua in sylvis Pileus ab initio campanulatus, $\frac{1}{2}$ - 1 unc. latius fusco-luteus, siccus, tenuis, tamen non fragilis. Lamell. subdistantes, fere liberae. Stipe 3-4 unc. longus, & lin. crassus, fistulosus,

nitens, deorsum fere nigricans, apice albicans, aliquando basi tantum villosus, (exsuccus?). Pierumque alliodorus, verum non constanter. Grev.

213. *cepaceus*, gregarius, pileo hemisphaerico stipiteque deorsum incrassato glabro? luteis, lamellis albis.

A. *cepaceus* (Michelii). Fries Obs. Myc. col. 1. p. 29.

Fungus campestris parvus luteus, odore allii, lamellis albis, pediculo superna parte conciore. Mich. Gen. pl. p. 144. t. 78. f. 5.

In fimo equino, per agros fuso, prope Florentiam, autumno viget, sed raro. M.

Obs. Quoad locum natalem ab antecedentibus, cum quibus odorem alliaceum participat, valde differt, iisque, secundum iconem, multo major, et stipes versus basin incrassatus, ac, uti videtur, totus glaber et exsuccus.

214. *Ceratopus*, subgregarius inodorus, pileo subcarnoso - membranaceo campanulato submolli albido - pallescente (etiam badio - ferrugineo) laevi passimque substriato, lamellis adnexis dilutioribus, stipite fistuloso longissimo nitente - badio corneo.

His in regionibus rarius mihi obvius, inter folia sicca.

Species distinctissima videtur ab Ag. *alliae* ceo Sowerbi, tamen ei affinis, sed nullum spirat odorem, et sapore est subnauseosus.

Stipes glaberrimus, basi materie albida cum vicino et foliis connatus, substantia sicca cornea, 4-6 unc. longus, 2 lin. crassus. Lamel. adscendunt, 2 lin. latae. Pileus obsolete umbonatus, unc. i fere latus, ad tactum molles. Quoad habitum et lamell. insertionem Ag. galericulato aliisque Mycenis non dissimilis, ratione stipitis et pilei vix striati potius huc pertinet.

§15. *Erythropus*, subcaespitosus, pileo subcarnoso - membranaceo hemisphaericor albido-pallescente, lamellis secedente - adnexis albis, stipite cavo glabro atro - rubente, basi intusque villoso. *Syn. fung. p. 367. Conspect. fung. p. 184. Fries Syst. 1. p. 122.*

Agaricus dispar. Batsch. El. fung. Cont. II. p. 75. t. 38. f. 210.? (*stipes hirsutus, non radicatus indicatur*). *A. velutipes. Sow. t. 263.?* *B.?* *acervatus, fasciculatus, pileo subcarnoso incarnato, lamellis liberis, stipite fistuloso rubro, sursum attenuato glabro, basi tomentoso. Fries l. c. p. 122.* (In pinetis Sueciae circa truncorum radices abunde Fr.)

A. erythropus in sylvis frondosis, inter folia decidua, aut ad latera truncorum, putredine emollitorum, quibus stipes immersus, non infrequens observatur, sub finem aestatis. Stipes 3-4 unc. longus, 2 lin. crassus, plures saepe in corpus tuberosum connati. (A. repens B.); colore toto bruneo subnitens. La-

mediae rotundatoe aut ad dimidium stipiti annexae, albae, palescentes, subdistantes. Pileus parum carnosus, pellucidus, obsolete striatus, convexus, 1 $\frac{1}{2}$ - 2 unc. latus.

Obs. Sequentes subvarietates adnotari merentur;

* *clandestinus*, subcespitosus, pileo-carnoso-membranaceo flaccido ruguloso, primo convexo deinde subumbilicato, pallescente-rutilo, lamellis semiadnatis aquose pallidis, stipite longissime glabro elasticō badio.

In quercetis passim, inter folia sicca, ubi stipes plerumque fere totus est absconditus, hinc nonnunquam spithamam longus evadit, flexuosus, nitidus, passim excentricus. Lamell. lanceolatae, gradatim minores. Pileus 1 - 2 unc. latus, sapore substipticus.

* *phaeopus*, subsolitarius parvulus, pileo subcarnoso hemisphaerico plano, aut subumbilicato, crustalino, lamellis toto adnexis subconcoloribus, stipite rufo-badio, basi stri-goso.

Sero autumno sub Syringis, in campestribus cultis, crescens, raro occurrit. Stipes vix radicatus, 2 unc. longus, lin. 1 crassus, deinde induratus. Lamell. in individuis subumbilicatis lineatim parum decurrent. Pileus 1 unc. fere latus, pallidus, mox albicans.

Obs. 2. Ag. repens. Bull. t. 90. nunc ab beato auctore in *Textu (Hist. des. champ.*

vol. 2.) p. 470. cum Ejus A. *dryóphilo* conjunctus est, addita observatione: „Stipes hujus interdum ramosus (?) et repens; ut in individuis inconsulte pictis sub nomine A. *repentis*.“ Et revera affinitas cum *dryophilo* non neganda, sed praeter crescendi modum, stipitis colore et natura, et pileo convexo minus carnoso, nec non colore differt.

216. *confluens*, cespitosus albidus, humidus rufescens, pileo subcarnoso convexo obtuso, lamellis confertis angustis, stipite cavo villosi - pulvriento rufescente. *Syn. fung.* p. 368. *et Icon. et Descr. fung. Fasc. 1.* p. 15. t. 5. f. 1. *Consp. fung.* p. 184. *Fries l. c. p. 123.*

Agaricus tremulus *Batsch. El. fung.* p. 130. t. 20. f. 104.

In sylvis, praesertim abiegnis, autumno non rarus, ad terram provenit. Stipes sub-compressus, breviter tomentosus, apice subdilatatus. Lamell. liberae, basi rotundatae. Pileus late umbonatus, flaccidus, siccus, unc. 1-2 latus.

217. *cohaerens*, cespitosus, pileo subcarnoso umbonato rugoso cinnamomeo expallente, lamellis subadnexis distinctis fuscescentibus, stipite cavo glabro nitente-badio, basi conato. *Syn. fung.* p. 307. *Ic. et Descr. fung.* p. 15. t. 5. *Consp. fung.* p. 163. *Fries Syst. p. 253.*

In Germania et Suecia, tam ad truncos, quam inter fol. dejecta, provenit. Stipites subfasciculati, basi membrana communi uniti, corni, glaberrimi, pulchre castanei, sursum pallidi, 3-4 unc. longi. Lamellae eae, quae integræ sunt, plerumque latiores sunt, et omnes venis connexae. Pileus 1-2 unc. latus, late et obtuse umbonatus, nunc pallidus, nunc subferrugineus.

218. *lugubris*, gregarius e pallido ferruginascens, pileo subirregulari laevi, lamellis liberis, stipite radicato glabro, intus spongioso, pileo concolore. Fries L. c. p. 254. †

Prov. in betuletis montosis declivibus, inter gramina. Stipes rigidus, extus cartilagineus, 4 unc. longus, 3-4 lin. crassus, an aequalis? Lamel. latae, confertae, serratae (de eorum colore nihil adfertur). Pileus carnosus, campanulatus, dein expansus, 2-3 unc. latus. L. c.

219. *archyropus*, inodorus fasciculato-cespitosus, pileo (parvulo) subcarnoso pallente, lamellis confertis toto adnexis obscurioribus, stipite tenui pallide rufescente, pruina tomentosa albicante obtecto. Tab. XXV. f. 4. et ad a. pars stipitis sub lente pictus.

In sylvis prope Versalias ad terram detectus ad D. Bard.

Plura individua, interdum ad 12 basi inter se (et cum vicinis corporibus, foliis, etc.)

unita, sertum offert, sat gratum. Stipes 4-5 unc. longus, lin. i crassus, subrigidus, demum cavus, primo aspectu glaber, sed sub lente tenuiter infra lamellas usque, tomentoso-squamulosus, colore fere argenteo sed, tomentulo attrito, subrufescit. Lamell. lineares, dense. Pileus $\frac{1}{2}$ -1 unc. latus, convexus, glaber, demum planiusculus, alutaceo-pallidus.

Obs. An huc forsitan referendus Agaricus *Hariolorum* Bull. t. 585. et t. 56.? quaeque species mihi valde dubia videtur, aut ut mera var. Ag. *peronati* habenda.

220. *terginus*, inodorus, pileo subcarnoso incarnato expallente, lamellis liberis pallidis, stipite elongato albo-villoso, deorsum atro-rubente. *Fries Syst. 1, p. 128.*

In Suecia crescit supra foliis, et inter muscos humidos, Septembr., Novembr. Stipes fissilis, apice glaber, pallidus. Lamellae angustae. Pileus convexus, obtusus, mox planus, demum margine striatus, unc. i plus minusve latus. *Fries.*

* *patillus*, pileo subcarnoso, humido rufo, margine striato, lamellis liberis, stipiteque fistuloso rufescensibus, basi albo-villosa. *Fries l. c.*

Serotinus in Sueciae pinetis, interdum copiose, apparet. Stipes attenuatus, i-a unc. longus, i-a lin. crassus. Lamell. juniorum adnatae, dein liberae, subdistantes. Pileus sub-

membranaceus; 'humidus' subdiaphanus; testa
ceo-incarnatus, latitudine fere tuncialis. *L. c.* I
221. *fusco-purpureus*; cespitosus, pileo sub-
carnoso obsolete umbilicato, recente atropur-
pureo, dein expalente, stipite subcaudato
rubiginoso, deorsum strigoso. *Syn. fung.*
p. 451. Ic. et Descr. fung. Fasc. 1. p. 12.
t. 4. f. 1. Fries L. c. p. 128.

In Germania et Suecia, inter folia prae-
sertim faginea, Jul. — Sept. Stipes 2-3 uno.
longus rufus, villis rubiginosis vestitus. La-
mell. liberae, rufescentes. Pileus primo hemi-
sphaericus, dein etiam subapplanatus, totus
pallidus. — Adest ex D. Fries vat. *major*,
solitaria, stipite decumbente, quae mihi ig-
nota.

222. *peronatus*, gregarius subcespitosus, pi-
leo carnoso - membranaceo convexo aut pla-
niusculo flaccido pallescente - rutilo, lamellis
distinctis secedente - liberis pallidioribus, sti-
pite farcto - radicato, deorsum flavo - strig-
oso. *Syn. fung. p. 331. Bolt. t. 58. Sot-
werb. t. 37.*

Agaricus lanatus. *Schum. Saell. ex Fries*
p. 126. B. Agaricus urens. Bull. t. 528. f. 1.
Fries Syst. p. 232. differt stipite longiore, fere
denudato; colore et sapore urente ceterum
similis, ita ut mera var. considerari debeat.

Haec species, in pluribus regionibus cres-
cens, non rara est, habitu proprio distineta,

et ob substantiam coriaceo - membranaceam, prae ceteris, facile siccari potest. Stipes 2-3 unc. longus, 2-3 lin. crassus, subtomentosus, pallidus. Lamellæ integrae plerumque latiores sunt, dein liberae. Sapor, ut in *Capsico*, etiam in speciminiibus exsiccatis remanet.

Obs. Sequentes ambas varietates, rarius his in locis observavi;

1. *calceolatus*, cespitosus, pileo subumbo-tenui lamellisque angustis adnexis rufescensibus, stipite longo deorsum incrassato, basi villo denso candido obvoluto.

Hab, inter folia putrida, quibus adhaeret villo compacto. Pileus unc. 1 fere latus.

2. *rugatus*, subgregarius, pileo subcarnoso flaccide, superficie ruguloso, demum depresso, dilute cinnamomeo, lamellis ligneo-pallidis confertis secedentibus, stipite subbrevi concolore, demum cavo, farinaceo.

Stipes 1 $\frac{1}{2}$ unc. longus, 2 lin. crassus, apice subincrassatus. Pileus 2 unc. latus, margine sublineatus, odore non ingratus, sed sapore est acri-nauseosus. Quoad stipitem ab A. *peronato* forte nimis recedit, hinc denuo examinandus.

223. *leucophyllus*, pileo hemisphaerico umbonato molli carnoso rufo-badio aut albo-lividio expallente, lamellis confertis niveis, basi truncatis aut rotundatis subliberis, stipite elongato laevi tumido rufescente, basi

villoso. — *Syn. fung.* p. 309. (excl., Sy-
non.).

Agaricus butyracenus *Bull. Hist.* p. 615.
t. 572. *Fries Syst.* 1. p. 121. (Forasitan
nomen venit a carne pilei molli).

Picromyces atrorufus. *Battar.* p. 17. t. 16.
fig. C. (sed sapore amarus).

Aestate et autumno, post pluvias, satis
vulgaris est, in sylvis praesertim frondosis,
forma peculiaris, et lamellis semper pure albis
notabilis, cum color in pileo a tempestate hu-
mida aut sicca variet, ita ut aliquando, umbo-
ne excepto, totus albescat, plerumque tamen
lividus est, interdum badius, margine pallido.
Stipes 3 - 4 unc. longus, deorsum sensim et
valde incrassatus, laevis; intus floccosus, cum
his in regionibus, ubi non rara est haec spe-
cies, semper glabrum (basi imo excepta) inve-
ni, hinc sequens, saltem ut subspecies, adno-
tari meretur.

B. trichopus, pileo carnoso convexo-glabre ru-
fescente - badio, lamellis flexuosis albidis,
stipite conico rufo toto piloso. *Syn. fung.*
p. 308.

Passim in Hercynia occurrit. Stipes, pa-
rum brevis, $1\frac{1}{2}$ longus, dilute castaneus, pi-
lis sat longis, sed sparsis, obsitus. Lamel.
subadnexae.

Obs. Rarius provenit var. stipite colore
toto livido, qui in pilei carnem penetrat.

224. *lelopus*, gregarius, pileo subcarnoso umbonato, primo livido-nigrescente (dilute badius), dein fuligineo-albido, lamellis adnexis candidis, stipe conico, juniorum striato, dein laevi, pileo concolor. *Syn. fung. p. 362.* *Ic. pict. fung. 1. t. 2. f. 1-3.*

Agaricus azemus. *Fries Syst. 1. p. 21.*

In sylvis acerbis et frondosis (etiam circa Parisios) non equidem rarus. Stipes in fungo nondum evoluto, basi fere globosus, sulcatus est, in adultis laevis, subsolidus. Lamellae emarginato-adnexae. Pileus ab initio globosus, et fere niger, demum subrepandus. Sapor subfortis. Vix specie diversus videtur ab *Ag. leucophyllo*, vel *butyraceo*. *Bull.*, sed multo rarius et senior occurrit.

225. *pudens*, pileo subcarnoso umbonato rufo-fusco, margine villoso, lamellis teto adnexis candidis, stipe farcto longo radicato tomentoso. *Syn. fung. p. 313. et 314.* *Bull. t. 232.* *Battarr. t. 9. f. 1. (var. pileo albo).*

Ad truncos passim cum sequente crescit, a quo abunde differt pileo non viscoso, colore et tomento; etiam paullo minor est. Stipes, qui pileo concolor, paullo longior in hoc, ad tactum mollis videtur.

226. *radicatus*, (clypeatus), solitarius, pileo carnoso umbonato viscoso subrugoso glabro fuscescente-livido, lamellis emarginato-ad-

nexis subdecurrentibus candidis, stipite longo radicato, pileo subconcolore, apice albidio. *Syn. fung.* p. 513. *Sowerb. fung.* t. 48. *Fries* p. 118.

Agaricus longipes *Bull.* t. 515. *A. umbraculum* *Batsch.* *El. fung.* t. 2. f. 4. (radice abrupta). *A. macrorhizus*. *Obs. Mycol.* 1. p. 47.

Haec species, quae sat praecox est, nascitur in truncis putrescentibus, quos radice longa penetrat. Stipes subtenax, spithameus, 3 lin. crassus, attenuatus. Pileus deinde planus, disco lato prominente, carnoso-membranaceus. Lamell. sublineatim decurrent, passim subincarnatae sunt. Totus fungus demum aquosus, mollis fit. *Ag. galericulato*, forma majore, valde affinis, sed pileo viscoso, vix aut rarius striato, et stipite non strigoso differt.

227. *platyphyllus*, magnus subsolitarius, pileo subcarnoso ex albido subfuligineo, umbone obtuso virgato-squamuloso obscuriore; lamellis latissimis subannexis candidis, stipite striato albido, radice abrupta. *Syn. fung.* p. 362. *Obs. Mycol.* 1. p. 47. *Fries Syst.* p. 117. (Excl. *Syn. Bull.* 2.)

Uti antecedens in truncis quoque provenit, sed minus communis. Stipes 3-4 unc. longus, 4-6 lin. crassus, demum cavus. Lamell. ad latera subuplicatae. Pileus fragilis 3-4 unc. latus, subfibrillosus, non viscosus.

* *subulatus*, pileo submembranaceo campanulato subtomentoso olivaceo-viridi, lamellis pallidis distantibus, stipite longissimo subulato farcto pallido. *Raddi in Act. Soc. Ital.* vol. 13. 1806.

Hab. circa Florentiam. Affinis dicitur *Ag. radicato*, cuius formam refert, sed stipes adhuc longior et tenuior est, ac glaber? quo differt ab *A. pudente*.

228. *ventricosus*, stipite fistuloso nudo fusiformi, pileo umbonato, margine striato, lamellis subfalcatis liberis (?), ad basin latiusculis aduncis. *Bull. Hist. d. Champ.* p. 465. t. 411. f. 1.

Terrestris et solitarius in sylvis crescit. Stipes 3-4 unc. longus, glaber, mollis, apice dilatatus, basi in radicem gracillimam desinens, plerumque fulvo-ferrugineus, interdum subalbicans. Lamellae undulatae, aduncae hinc annexae, stipite concolores. Pileus plerumque stramineus, interdum albus, fere ecarnis. *Bull.*

Obs. Hic fungus mihi videtur dubius quoad speciem, et potius ut mera *A. radicata* varietas consideranda: *Ag. galericulati* non quoque dissimilis est, sed major, ac stipes non strigosus pictus. Habitu, nec non loco natali cum auctoris *A. arundinaceo* (collino Scop.) valde quoque convenit. De cetero, *Ag. ventricosus* *Fries Syst.* 1. p. 294. a Bulliardii fungo, quamvis ab eo citetur, longe deflectit

loco natali: ad terram fumosam, colore, et praesertim ejus natura Pratellarum.

229. *inamoenius*, pileo carnoso subumbonato glabro albido, lamellis varie adfixis distantibus stipiteque solido aequali radicato albis.

Fries Obs. Myc. 1. p. 10.

In pinetis Smolandiae, vulgaris. Odore Geran. Robertiani. Pileus compactus, 1-2 unc. latus, siccus. Lamell. latae, nunc decurrentes, nunc emarginatae. Stipes aequalis, 3-6 lin. crassus. Transit ad *A. radicatum*. Fr.

230. *collinus*, pileo subcarnoso campanulato expanso umbonato pallescente, lamellis liberis, stipite fistuloso laevi glabro. *Fries l. c. p. 124. Schaeff. t. 220. Scopoli Carol. ed. 2. p. 403. Flor. Dan. t. 1609.*

Agaricus arundinaceus. *Bull. t. 403. A. pratensis* *Batsch. t. f. 5. (ex Fries).*

In graminosis ad terram, nunc solitarius, nunc cespitosus. Stipes rigidus, teres, basi subpubescens, 3-4 unc. longus. Pileus dein planiusculus, laevis, ultra unciam latus. l. c. Quoad ic. *Flor. Dan.* color est livide fuscescens. Pileus sublate umbonatus, fere ecarnis. Lam. subventricosae. Stipes 4-5 unc. longus, 3 lin. crassus.

231. *ingratus*, cespitosus, pileo subcarnoso umbonato stipiteque fistuloso subcompresso tortili fusco-alutaceis, lamellis liberis. *Fries l. c. p. 123. Schumach. Saelland. p. 304. †*

In Daniae pinetis; Aug. Stipes 3-5 unc. longus, 4-6 lin. crassus, subflexuosus, superne pulvere albo obtectus, basi dein umbrius. Lamel. densae, lineares, postice truncatae. Pileus unc. 1 $\frac{1}{2}$ latus. Odor subingratus. loc. cit.

232. *plancus*, pileo carnoso obtuso pallescente, lamellis distantibus obscurioribus, stipite compresso subcavo albido - villoso. Fries p. 127. Flor. Dan. t. 1723.

In Sæciae et Daniae sylvis, inter folia, passim Sept. — Nov. Stipes 2 unc. longus, 1 lin. crassus, pallidus, valde tenax, basi non strigosus. Pileus uncialis, appланatus, laevis. Lamell. subbrunnea. A. confluenti subsimilis. Fr.

233. *ovinus*, pileo carnoso e convexo plane subsquamuloſo rufescente (etiam fuscens et griseo), lamellis arcuato - affixis, venis connexis albis, stipite farcto brevi firmo. Fries Syst. 1. p. 109. Bull. t. 589. A. metapodium. Fries Obs. 2. p. 110.

Cresc. in pratis muscosis, apricis et nemerois. Stipes 1-2 unc. longus, $\frac{1}{2}$ crassus, cinerascens. Pileus 1-3 unc. latus, subfragilis. Substantia compacta, laesa rubescens, sapore mitis. Odor farinaceus. Fr.

234. *caryophyllaeus*, subgregarius parvulus, pileo carnoso umbonato pallescente - rufo, lamellis distinctis secedente - adnexis albido-pal-

pallidis, stipite farcto - duro subradicato.
Schaeff. t. 77. A. collinus. Syn. fung.
p. 330.

Agaricus Pseudomonceren Bull. t. 528. f. 2.
A. pratensis. Sowerb. t. 247. A. oreades. Bolt.
t. 43. Fries p. 127. A. tortilis. Decand. Flor.
gall. 2. p. 194. A. coriaceus aliquorum.

Provenit, aestatis fine et autumni initio,
in sylvaticis, locis graminosis, pascuis, etc.,
sat vulgaris, odore grato distinctus. Substan-
tia sicca, elastica. Stipes 2-3 unc. longus, al-
bidus aut pileo subconcolor, 2 lin. crassus, in-
terdum striatus, semper glaber aut basi subvil-
losus a me visus; secundum D. Fries, in Sue-
cia, villoso-corticatus est. Lamell. subliberae,
latiusculae, 2 lin. latae. Pileus unc. 1 ad 1½
latus, convexo-planus, subumbonatus, expal-
lens, glaber, rarissime obsolete umbilicatus.

In *Flora Danica* hic fungus pictus est co-
lore nimis obscuro, pileo acule conico. Cete-
rum non tam magnus est, nec cespitose cres-
cit, saltem in Gallia.

Obs. Nomen antiquius Schaefferi, utpote
odore non male exprimens, conservari mere-
tur; illud *oreades* Bolt. (*oreas* Spreng.) hujus
speciei crescendi modum, nempe circulos effi-
cens, quod nondum observari, indicans, non
paucis aliis Agaricis etiam proprius est. Variat
quoque sequentem in modum.

1. *imminutus*, parvus, pileo umbonato planius=

Sectio tertia.

K

culo ligneo - pallido ferruginascente, lamel. sublineatim decurrentibus, stipite longiusculo subradicato.

Pileus subcompactus, $\frac{1}{2}$ unc. latus. Stipes 2 unc. longus, $1\frac{1}{2}$ lin. crassus.

2. *rhizopus*, subparvus, pileo subcarnoso ferrugineo, lamel. adnexis concoloribus, stipite sub terra longe radicante crassiusculo.

Radix fusiformis, 1 - 2 unc. longus, 4 lin. crassus, glaber, pileo concolor, qui hemisphaericus et unc. 1 fere latus est.

235. *fusipes*, cespitosus tenax, pileo carnoso flaccido rufo - badio laevi, lamellis distantiibus rotundato - adnexis albidiioribus, stipite ventricoso sulcato, deorsum acuminato subradicato glabro. *Syn. fung. p. 312. Bull. t. 516. Flor. Dan. t. 1694. Fries p. 120.*

Agaricus crassipes Schaeff. t. 87 et 88. Ag. rigidus Bolt. t. 43. Sowerb. t. 129. A. contortus. Bull. t. 36.

In sylvis prope truncos frequens crescit. Stipes durus, 3 unc. longus, totus glaber. Pileus subcartilagineus, parum difformis. Lamellae subventricosae, albido - griseae, fere liberae, saepius rufo - inquinatae. Sapor hujus speciei fere ut in *Ag. campestri*, paullo fortior tamen. *B. caldarii*, cespitosus rufescens, pileo subcarnoso. tenui, margine zonato, lamel. confertis albidis, stipite rigido compresso (utrinque salcato), basi albo - pulverulento, non radicato.

Inveni in caldario quodam inter pulverem coriarium. Stipes cavus, aequalis. Lamell. tenues, adnexae, demum rufescentes. Pileus planiusculus, pellucidus unc. latus, subsericeus quasi. Odor fortis.

236. *Daucipes*, spadiceus, pileo subcarnoso applanato subconvexo, medio dilatato squamu-lis subfasciculatis notato, lamellis subdecur-rentibus dilutis, stipite fusiformi subfarinaceo.

Inventus a D. *Cordier*, fine Augusti in Sylvula Boloniensi prope Parisios. Stipes, basi interdum prolifer, eadem forma et substan-tia est ac in *Fusipede*, sed superficie subfibrilosus, apice pulverulento. Lamellae colorem quoque habet antecedentis, sed verum s' pitem decurrent et inter se distant. Pileus obsolete lateque umbonatus, opacus, medio carnosus, in peripherio fere ecarnis, latitudine palmari, submollis. Squamulae in disco erectae, obtuse, ceterae depresso et quasi anastomosantes. Sapor fere raphanaceus.

Obs. An forsitan huc adferendus *Agaricus gymnopodium* *Bull. Hist. d. champ.* p. 531. t. 601. f. 1.? pileo tamen valde convexo et magis squamoso est.

237. *prolixus*, magnus, pileo carnoso dilatato-conico, margine subrepando, rubiginoso, la-mellis confertis lanceolatis rotundato-adne-xis, stipite longissimo solido aequali, pileo concolore. — *Flor. Dan.* t. 1608.

K 2

Hab. in Daniae sylvis. Stipes spithameus, $\frac{1}{2}$ unc. fere crassus, radiculos exserens, aequalis. Lamel. tenues, subangustae. Pileus 4-5 unc. latus.

#38. velutipes, caespitosus serotinus, pileo subcarnoso viscoso repando crustalino, lamellis ventritosis albo-pallentibus, stipite molli subtomentoso spadiceo. *Syn. fung. p. 314.*

Curt. Lond. 4. t. 70. Sowerb. t. 384. f. 3.

Agaricus nigripes. *Bull. t. 344. A. fuscipes. Flor. Dan. t. 1194. f. 2. A. Sphinx. Batsch Cont. 1. t. f. 112. (junior, expallidus, ne quidem var.)*

B. atropes, solitarius terrestris, pileo explanato depresso, margine repando ferrugineo-umbro, stipite brevi crassiusculo subbulboso nigro-fuligineo. *Schum. Saelland. p. 235.*

Ubique fere haec, satis notabilis, species invenitur, rarius quidem in sylvis ad truncos quercinos, sed in ambulacris ad basin ulmarum provenit, frequentius vero, sero autumno in hyemem usque, ad vetustas Salices, aut Tilias, non obstante frigore, crescit. Stipes longitudine variat, et saepe incurvus est, quod a loco dependet. Lamellae dentato-connexae, latitudine inaequales, juniores albidae. Pileus mollis, subpellucidus, 2-3 unc. latus.

Obs. Agaricus austriacus. Trattin. Fung. Austr. Fasc. 2. p. 37. t. 4. f. 7., qui, mense Januario ad Cerasi aut Populi truncos, prope

Vindobonam invenitur, vix distincta species est, differt stipite atro-purpureo (glabro?) et colore pilei intensiore.

239. *dryophilus*, subgregarius, pileo tenui carnosō, demum subdepresso rufescente-crustalino, margine dilutiore, lamellis confertis rotundatis, albido-pallidis, stipite subtenui glabro lutescente-rutilo. *Syn. fung.* p. 452. *Bull.* t. 434. *Sowerb.* t. 127. *Fries* p. 124.

Agaricus melleus. *Schaef.* t. 45.? *A. ochraceus*. *Ejusd.* t. 255. *Ag. mollis*. *Bull.* t. 17. (ex ipso auctore).

In Pinetis et Quercetis sat frequens. Magnitudine mediocris. Stipes glaber, nitidus, deorsum incrassatus, aut aequalis 1-2 unc. longus, 2-3 lin. crassus. Lamel. adnexae, confertae, subnitidae. Pileus parum modo carnosus, planiusculus. Odor subdulcis. Sapor ingratius. In Suecia odor et sapor nullus!

240. *xanthopus*, pileo subcarnoso subumbonato laevi flavo-pallescente, lamellis liberis latiusculis albidiis, stipite fistuloso aequali luteo, basi strigoso. *Fries.* p. 124. *A. tremula*. *Batsch.* t. 38. f. 209.?

In Sueciae pinetis raro. Pileus tenax, subconvexus. Stipes rigidus, 3 unc. longus, 1-2 lin. crassus, etiam rufescente-flavus.

241. *chrysenterus*, pileo carnoso hemisphaerico subumbonato lamellisque liberis flavis, stipi-

te solido, basi albo-strigoso. Fries p. 126.
Bull. t. 556. f. 1. Spreng. *Flor. Halens.*
Mant. 1. p. 17.

Hab. in Gallia, Germania et Suecia, inter folia decidua, et in ramis siccis. Stipes 2 unc. et ultra longus, glaber, flavus, sed basi albo-pilosus. Pileus obsolete umbonatus, demum planus, $1\frac{1}{2}$ -2 unc. latus. Fr. Lamel. numerosae, basi rotundatae. Odor et sapor nullus. Bull. Hist. p. 565.

242. *macilentus*, pileo subcarnoso laevi luteo, lamellis subliberis linearibus stipiteque subfustuloso nudo flavis. Fries l. c. p. 131.

In Sueciae pihetis densis, mentosis. Stipes $1\frac{1}{2}$ unc. longus, lin. 1 crassus, aequalis, tenax, leviter radicatus; interdum flexuosus. Pileus planus, obtusus, $\frac{1}{2}$ unc. latus. Lamell. confertae, elegantes. A. cerino quodammodo affinis; et statura A. carnei. l. c.

243. *clavus*, pileo subcarnoso obtuso argillaceo, lamellis adnexis albis, stipite fistuloso radicato glabro flavescente. Fries p. 131. A. *esculentus*.

Agaricus clavus Linn. Schaeff. t. 59. A. *esculentus* Wulfen in Jacq. Coll. Austr. 2. 14. f. 4. Syn. fung. p. 389.

In ericetis, pascuis, sylvaticis, praesertim in Germania et Suecia prostat. Fungillus vernalis, et in Austria in usum culinarem copiose legitur. Sapor subamaricans. Lamell. lutea.

subconfertae, stipiti laxe adhaerentes. Pileus e sordido flavo - argillaceus, disco saepe fuscescens, parum striatus, $\frac{1}{2}$ unc. aut plus latus. Solitariae crescit, sed tempestate humida perfruens. *Cons. fung. p. 196.*

* *perpendicularis*, radice perpendiculati elongata, stipite fistuloso nudo pileoque complanato laevi flavo-ferrugineus lamellis seminulatis liberis niveis, dein pallescentibus. *Bull. Hist. d. Champ. p. 469. t. 422. f. 2.*

Hab. in Gallia, sub finem hyemis, in sylvis ad terram, solitarius. Stipes vix perspicue fistulosus, firmus, subaequalis, 3 unc. altus, lin. 1 fere crassus in terram profunde et verticaliter affixus. Pileus aurantio-ferrugineus, nunquam striatus, primum suborbicularis, dein complanatus, demum depresso unc. et nonnullas hic latus. *Bull.* Ab antecedente quoad descriptionem omnino discrepat, a me nondum repertus.

*44. *ocior*, gregarius et cespitosus parvulus subtenax, pileo tenui subumbonato planiusculo fusco-rufo glabro, lamellis angustis subliberis albido-pallescentibus nitidis, stipite tenui cavo radicato.

Ipveni, mense Majo, prope vetustos trunhos, tamen ad terram, quam radice subfusiformi intrat. Stipes ultra unc. longus, 1-2 lin. crassus, aequalis. Lamel. lanceolatae, ultra lin.

latae, nitentes colore grato. Pileus $1\frac{1}{2}$ - 2 unc. latus, exsiccando margine saepe inflexus, opacus, fere ecarnis; sed sapidus.

245. *leiopilus*, solitarius parvulus firmus, pileo carnoso subumbonato fuscescente glaberrimo, lamellis adnexis latiusculis, prime aquose purpurascensibus, dein dilute cinnamomeis; stipite sublonga solido, apice albicans.

In sylvula quadam prope Parisios rarissime repertus. Stipes 2 unc. et nonnullas lin. altus, 1 - 2 lin. crassus; deorsum latior. Pileus $\frac{1}{2}$ unc. latus, medio carnosus, late, sed obsolete umbonatus. Lamel. nigro-punctatae apparent, nec tamen ob substantiam firmam, elasticam. Pratellae species, sed sequenti tota habitu affinis.

246. *arvalis*, pileo subramoso tenaci ochraceo glabro, lamellis adnexis fusco-albis, dein ferrugineis, stipite fistuloso radicato. *Fries Syst. p. 263.*

In arvis graminosisque. Stipes tenax, pileo dilutior, sursum albido-pulverulentus. Pileus siccus rugosus, uncialis. Lamel. subventricosae.

247. *tenacellus*, gregarius parvulus, pileo pm-bonato carnoso - membranaceo subumbrino, aut fuligineo - pallido; lamellis adnexis niveis, stipite glabro tenace lutescente, apice albido. *Syn. fung. p. 387. et 388. Ic. pict.*

*fung. p. 2. t. 1. f. 3. Fries l. c. p. 131. Ag.
longicaudus Schum. p. 275.*

Prov. sero autumno, et nonnunq. in ipsum Decembr. in Germaniae, Sueciae et Daniae fagetis et pinetis, inter muscos. Stipes radicatus, 2-3 ad 5 unc. longus, lin. 1 crassus, flexilis. Pileus laevis, unc. latus, umbonatus, in specimine aerotino, a frigore, albicans, subfuliginosus. Lam. latae, subdistant, eleganter albae.

848. *conigenus*, gregarius magnitudine mediecris, pileo subcarnoso umbonato, demum appланato inaequali, cinereo-livido, lamellis confertis liberis albidis; stipite fistuloso pulvрerulento radicato-strigoso. Syn. *fung. p. 388. Fries l. c. p. 132. Buxl. Cent. 1. t. 67. f. 2. ex Fr.*

In Germania et Suecia nascitur in strisciis, et ex D. Fries etiam inter folia decidua. Stipes tenax, pileo concolor, tenuis, longitudo varius, plerumque 1½ unc. latus, radiculis fibrillosis adhaerens. Lamell. angustae, lineares. Pileus $\frac{1}{2}$ unc. ad 1 latus, sapore acris. * *spinipes*, gregarius subfasciulatus, pileo subcarnoso laevi fuligineo-livido, lamellis confertis albis, stipite longo, pileo subconcolor, basi fibrillulis rigidis hispido. — *Sawerb. fung. t. 207.*

Hab. in conis Pini *sylvestris* in Anglia. Stipes 4-5 unc, longus, ultra lin. crassus, non

radicatus? solidus? Lamell. angustae, adnatae.
Pileus campanulatus, unc. 1 fere latus. (*Ex Icone*). Priori affinis videtur.

249. *myosurus*, pileo subcarnoso obtuso laevi rufo, lamellis liberis albis, stipite fistuloso rufo, apice pulverulento, radice glabro. *Fries Syst. 1. p. 132. Ej. Obs. Mycol. 2. p. 129.*

Etiam in pinetis provenit. *A. conigeno* proximus. Stipes subtiliter fistulosus; unc. 1 longus, radice elongata. Lamel. angustae. Pileus regularis, a unc. latus, colore varius. *L. c.*

250. *spodochrous*, pileo subcarnoso cinereo, lamellis liberis distantibus stipiteque fistuloso aequali pulverulento-griseis. *Fries l. c. Ej. Obs. 2. p. 128. (A. tylicolor.) A. spodochrous. Spreng. Syst. Veg. V. 4. p. 435.*

In Sueciae sylvis frondosis rarer. Stipes vix radicatus, uncialis, lin. i crassus. Lamel. planae, pileo pallidiores. Pileus subumbonatus, tenue carnosus, explanatus, $\frac{1}{2}$ unc. latus. *L. c.*

251. *reductus*, pileo subcarnoso angulato laevi virescente, lamellis affixis griseis, stipite farcto flavescente, superne pulverulento. *Fries l. c. p. 133. Ejusd. Obs. l. c. p. 137.*

In foliis putridis *Syringae* repertus. Aug. Stipes teres, fragilis, deorsum pubescens, sursum albo-squamulosus. Pileus subdifformis, convexiusculus, glaber, cinereo-virescens, exsiccatus flavescentia, $\frac{2}{3}$ - 1 unc. latus. Lam. latiusculae, distantes, laeviter affixa. *L. c.*

252. *angulatus*, gregarius parvus, pileo subcarnoso - membranaceo, ab initio hemisphaericō, dein planiusculo, tandem plicato - angulato fuscescente - albido, lamellis distantibus dilutioribus, stipite tenui fistuloso rufescente - griseo. *Tab. XXVI. f. 3 - 4.*

Agaricus angulatus Batsch *El. fung.* p. 73.
Mich. gen. p. 146. t. 74. f. 4. (Var. *albida*).

Hab. medio autumno in declivibus collum, in campestribus, ad radices plant. emortuos, stipulas, etc.

Stipes siccus, rigidus, utrumque parum in-
crassatus, basi subpilosus. Lamell. juniorum al-
bae, sub maturitatem fustae, omnes longitudi-
ne fere aequales. Pileus siccus, forma mutabi-
lis, primo globosus, dein applanatus, et sae-
pius concavus, margine crenulato - angulatus. —
Fungillus Michelii colore solummodo albo dis-
crepare videtur.

* Minores. *Pileo piloso aut strigoso, albido - varie-*
gato, vel pallido, rufo, fuscescente, etc., squa-
muloso aut farinaceo, glabro.

253. *tricholoma*, solitarius subparvus, pileo
carnoso - membranaceo planiusculo nitente-
albo, pilis appressis hirto, marginē ciliato,
lamellis confertis subdecurrentibus, ex argil-
laceo fuscescentibus, stipite tenui squamulo-
so albicante. *Conspect. fung.* p. 188. *Fries*
Syst. 1. p. 290.

Crescit in Lusatiae et Sueciae nemorosis

et montosis gramineis muscosisve, ac secus margines sylvarum. Stipes unc. 1 et ultra longus; lin. 1 crassus, sat firmus. Pileus semuncialis fere, tenuis, sed non fragilis, demum depresso, lamellis hinc decurrentibus. Pilei cilia marginalia, ac stipitis squamulae, tandem obliterantur. *Consp.*

#54. strigosus, pileo carnoso subdepresso sericeo, margine strigoso, lamellis confertis albidis, stipite farcto villoso albo. *Fries l. c.* (Ag. strigiceps).

In Sueciae fageteis, inter folia sparsim crescit. Stipes firmus, $1\frac{1}{2}$ - 2 unc. longus, 2 lin. crassus, junior praesertim villosus. Pileus convexus, dein explanatus, pilis longis strigosis hinc inde rufescens, junior ad marginem pilis deflexis eleganter ciliato. *Ex.* An a priore satis diversus? etiam sequenti valde affinis videtur.
*** eriocephalus**, pileo semiorbiculari ex albido rutilante, margine lanato, lamellis angustis arcuatis subumbribus, stipite gracili longissimo subtomentoso albo. *Bull. Hist. d. Champ.* p. 517. t. 576. f. 1. (A. gnaphaliocephalus).
Decand. Flor. Gall. 2. p. 174.

Terrestris, plerumque solitarius. Pileus deinde subdepressus, margine lanatus aut subciliatus, adultus fere glaber, colore subalbidus, aut e fuligineo rutilans, 2 - 3 unc. latus. *l. c.*
#55. caulinialis, gregarius parvus, pileo sicco planiusculo albido, zonis discoloribus, squa-

mis pilosis radiantibus, lamellis sub adnexo albidis, stipite tomentoso spadiceo.

A. caulinotolis, stipite pleno nudo rigido, basi lanato, pileo lineolis ferrugineis picto, lamellis falcatis liberis. *Bull. (Vent.) L. c. p. 545. t. 522. f. 1.*

A. scabellus, parvus siccus, pileo membranaceo planiusculo subzonato albido, pilis rufis obtecto, disco rufescente, subpapillato, demum depresso, lamell. albidis liberis, stipite striatulo furfuraceo - squamuloso rufo - badio. *Consp. fung. p. 189. t. 9. f. 6. Fries l. c. p. 259.*

Pulchella species medio autumno ad ramulos exsiccatos, passim ad culmos aridos in dumetis, invenitur, verum minus communis. Ju- nior villosa spadicea. Stipes tenuis, ultra unc. longus, lin. 1 crassus. Pileus 2 - 4 lin. latus, squamis demum concentricis. Lamel. etiam pal- lidae.

256. circellatus, parvus albidus, pileo applana- to zonato sericeo - viloso, umbone fuscescen- te, lamellis latis undulatis, stipite coriaceo viloso albicante.

Bulla pileolo circellato. *Battar. p. 59. t. 28. f. V.*

Autumn in sylvis Majani. Stipes cavus interne sericosus (basi incrassatus, a unc. altus, vix lin. crassus). Pileolus sulcos (lamellas) ha- bet albos, profundos, undulatos, et deorsum gibbos; superne acumine (umbone?) fusco do-

natus, circa marginem circellum elevatum veluti funiculum circumpositum habet. Bat.

257. *petiginosus*, parvus, pileo subcarnoso convexo rufo-fuscescente cano-sericeo, lamellis liberis ciliatis flavis, stipite farcto, rufo-pulverulento. Fries, l. c.

Agaricus rufipes. Ic. et Descr. fung. Fasc. 1. p. 4. t. 1. f. 5. ex D. Fries.

Gregarius, pulcher. Stipes deorsum albidio-villosus, fuscescens, etiam testaceus, $1\frac{1}{2}$ unc. longus, vix lin. 1 crassus. Lamell., in fungo juniore, subadnexae, ventricosae, demum spadiceae. Pileus $\frac{1}{2}$ unc. latus, deinde rimosus, subinde umbonatus. In sylvis ad terram nudam, non infrequens. Fr.

258. *siparius*, rufo-ferrugineus, pileo subcarnoso obtuso stipiteque farcto villoso-squamoso, lamellis adnatis latis, margine villosis. Fries p. 261.

In Suecia, in stipitibus Polypod. Filic. Foem. locis humidis, perraro adest. Gregarius. Pileus 3 - 5 lin. latus, convexus dein planus. Lam. quaternae, subdistantes.

259. *pannosus*, pileo submembranaceo fuscescente, pilis albis sericeo, lamellis adnexis ventricosis, stipite glabriuscule pallidiore. Fries, l. c.

"Ad terram humosam, locis uidis umbrosis, Aug. — Sept. Gregarius, pusillus, et elegans. Stipes uncialis, tenuis, sub lente fibril-

losus. Lamel. distantes, paucæ inaequales, piloconcolores, facile secedentes. Pileus convexo-planus, plerumque umbonatus, tener, 3-4 lin. latus."

260. *graminicola*, pileo convexo papillato sericeo-fuscescente, lamellis adnexis pallidioribus, stipite tenui hirsuto. *Fries l. c. Nees Syst. 2. p. 50. t. 23. f. 186.*

Crescit, in Germania, ad culmos aridos autumno. Sparsus, solitarius. Stipes filiformis, unc. 1 longus, basi villo adnatus. Pileus 2-3 lin. latus, siccus. Lamel. distantes.

261. *segestrius*, cespitosus et solitarius, pileo subcarnoso subdepresso sericeo, sicco alutaceo, lamellis adnatis dilute cinnamomeis, stipite fistuloso fibrilloso. *Fries p. 262.*

Ad ramenta lignea, passim. Stipes basi byssoideus, flexuosus, 1-2 unc. longus, lin. 1 crassus. Pileus non squamosus, $\frac{1}{2}$ -1 unc. latus. Lamel. confertae.

262. *escharioides*, gregarius et cespitosus, pileo subcarnoso obtuso squamuloso pallido, lamellis adnexis latis alutaceo-pallidis, stipite fistuloso, apice glabro. *Fries l. c. p. 260.*
Ejusd. Obs. Mycol. 2. p. 131.

Cresc. in Suecia, ad terram humosam, locis umbrosis humidis. Sept. — Nov. Totus pallidus. Pileus è convexo explanatus, $\frac{1}{2}$ unc. circiter latus. Lamel. primo subdecurrentes, dein

secedunt; in var. quadam emarginatae, stipite tunc fuscescente. l. c.

263. *polius*, solitarius pumilus, pileo subcampanulato papillato cavo-pubescente, lamellis liberis, stipite cavo tenui badio rufo subfarinaceo.

Rarius inter muscos in sylvis occurrit. Stipes unc. 1 et aliquas lineas longus. Lamel. laiusculae, subfarinaceae. Pileus 3 unc. fere latu.

264. *muscophilus*, pusillus, pileo subcarnoso membranaceo subsericeo-pallido, lamellis lanceolatis tote-adnexis laete cinnamomeis, stipite breviusculo subfurfuraceo, dilute pallido.

Rarissime mihi obvius in sylvis umbrosis inter muscos. Agarico *pumilo*, quoad colorem et magnitudinem similis, sed pileo dein planiusculo subvilloso, stipite breviore, nec non loco natali differt.

265. *conspersus*, gregarius parvus, pileo subcarnoso hemisphaerico, deinde planiusculo, rufescente, stipiteque furfuraceo-squamulosis, lamellis adnexis cinnamomeis. Syn. fung. p. 318. Ic. et Descr. fung. p. 50. t. 12. f. 3.

A. *conspersus*, pileo subcarnoso furfuraceo-squamuloso rufo-cinnamomeo, lamellis emarginatis linearibus cinnamomeis; stipite apice squamuoso. Fries Syst. 1. p. 261.

Meum fungulum inveni in agris et ad eorum margines, qui a D. Fries repertus est in sylvis humi-

humidis, graminosis, sphagnosis. Ab eodem auctore etiam, locis limosis, observata est varietas: *uliginosus*, pileo umbonato squamoso fusco-rubescente, stipite longo torto, basi albo-tomentoso. In *Conspect. fung.* p. 166. memoratur altera varietas, tota *ochracea*, lamellis exceptis cinnamomeis emarginato-subliberis, innascens muscis, pinorum acubus, etc.

266. *furfuraceus*, gregarius parvulus, pileo subcarnoso, dein umbilicato, canescente-helvello, squamulis subfarinaceis, lamellis subdecurrentibus cinnamomeis, stipite subrigido furfuraceo. *Syn. fung.* p. 262. *Fries* p. 262. *Schaeff.* t. 226.

In sylvis inter muscos etiam ad terram, et in foliis emortuis. Stipes 1-2 unc. longus, rigidus, fistulosus. Pileus $\frac{1}{2}$ -1 unc. latus, expallens, junior convexus, obtusus, interdum substriatus.

267. *stigmaeus*, pileo subbarnoso, primo campanulato, dein expanso rufo, squamulis punctiformibus, lamellis confertis subrufis, stipite tenui rigido albido. — *Battarr.* p. 57. t. 28. *F. G.*

Circa Sabinianum ad Flumicini ripas vulgaris prostat. Stipes cavus, $1\frac{1}{2}$ unc. altus, lin. 1 crassus. Pileus tomentosus; unc. 1 latus, umbonatus?

268. *dispersus*, pusillus, terrestris, distante-gregarius, pileolo hemisphaericō planiusculo
Sectio tertia. L

sericeo lutescente, lamellis subdentatim decurrentibus dilute croceis, stipite subbrevi farinaceo - fibrilloso albicante.

Quotannis pulchellam hanc speciem in viridario quodam autumno, sub arboribus, in terra humosa, late dispersam reperio. Pileus, plus minusve, lin. 1 latus, lamellae laete lutescunt, toto adnexae. Stipes fere uncialis, villo albo terrae adnatus, pallescens. — Bull. Tab. 560. f. 1. habitum, magnitudinem parum et colorem sat bene exprimit; sed pileus in fungillo nostro non umbonatus est, nec margine striatus, neque lamell. liberae et albae sunt.

269. *umbrinellus*, subgregarius pumilus, pileo campanulato papillato subtomentoso obscure umbrino, lamellis crassiusculis adscendentibus subliberis lutescentibus, stipite cavo subpulverulento - fibrilloso fuliginoso.

In sylvis ad terram, locis apertis repertus a D. Léveillé. Stipes vix unc. longus, basi subincrassatus ibique subhirsutus, filiformis Lamel. oblanceolatae, parum adnatae. Pileus 2-3 lin. latus, obtusus, substantia carnosu - succulenta.

Obs. Sequentes species, ob magnam affinitatem cum praecedentibus, etiam huc transtuli, quamvis pileum habeant glabrum seu tomento vel squamulis nudatum. Omnes quoque ferme terrestres, lutescentes et pumilae sunt.

Epigaei. Pileo glabro.

270. *pumilus*, *subsolitarius*, *pileo subcarnoso hemisphaericō lutescente-ochraceo glabro*, *lamellis latis adnatis cinnamomeis*, *stipite caavo tenui pileo concolore*. *Syn. fung. p. 316.*
Schaeff. t. 203. (*A. pusillus*, non *obstat.*)

β. *A. semiorbicularis*, *stipite fistuloso nudo ex-corticabili*, *pileo limacino (?) hemisphaericō nec striato*, *lamellis latissimis liberis*. *Bull. — Vent. Hist. d. Champ. p. 467. t. 422. f. 1.?*

Non raro (α) occurrit in viis graminosis sub arboribus, aut ad agrorum versuras, aestate et autumno. Stipes 1 - 1½ unc. longus, 1 - 2 lin. crassus. Lamell. 2 - 3 lin. latae, planae, demum obscure, fere badiæ, pulvere copioso adpersae. Pileus 3 - 5 lin. latus, obtusus, tenuis.

In Opere Bulliardii citato de *A. semiorbiculari* (pumilo solummodo paullo majore) dicitur: In pascuis sylvas circumdantibus, frequentissimus. Stipes veluti e duabus tubis, uno alterum includente, compositus. Pileus laevis, nitidus, veluti vernicosus (hinc non glutinosus), semiorbicularis. Lamel. latissimæ, demum fuligineo-ferrugineæ, seminibus rufidis seu aureis nitidis, refertæ.

* *phaeosporus*, *solitarius parvus*, *pileo subcarnoso hemisphaericō laevi crustalino*, *lamellis totæ adnexis latissimis planis aquo-cinnamomeis*, *pulvere copioso badio-refertis*, *stipite brevi albicante-pallido*.

Rarissime in sylvis, aut ad earum margines crescit; forma indutus valde regulari. Lamel. confertae, tenues, totam pilei cavitatem expletant. Pileus fere ecarnis. Sapor substypticus. Cum antecedente etiam *Pratellis* affinis videtur.

271. *rufidus*, gregarius ligneo - rutilans, magnitudine mediocris, pileo convexo - plano glabro, lamellis subdecurrentibus, stipite breviusculo, basi albo - tomentoso, radiculis fibrillosis densis.

In sylvis ad terram. Stipes unc. $1\frac{1}{2}$ fere longus, 2 - 3 lin. crassus, minutissime squamu - losus, tomento fibrillisque terrae arcte affixus. Lamell. latiusculae. Pileus $1\frac{1}{2}$ unc. latus, medio carnosus, in ambitu ecarnis. Sapor ingens, parum virosus.

272. *laevis*, pumilus, pileo suborbiculari plano stipiteque subelongato tenui glabris ferrugineis, lamellis latis, toto adnexis crassiuscula cinnamomeis. *Tab. XXV. f. 1.*

Rarius, prope Parisios, ad terram nascitur. Stipes unc. $1\frac{1}{2}$ fere altus, sed tenuis, aequaliter lamellae distinctae. Pileus 4 lin. latus. Differit ab *A. farinaceo* defectu pulveris adspersi.

273. *vervacti*, pileo subcarnoso fragili laevilato, lamellis adnatis subferrugineis, stipite glabro albo. *Fries Syst. 1. p. 263.*

In arvis et aggeribus prope Lund, in Suecia inventus. Gregarius. Pileus convexus, mo-

planus, obtusus, uncialis, carne alba. Lamel. latae, subdecurrentes.

274. *pusillus*, pileo submembranaceo laevi luteo, lamellis adnatis planis confertis, stipite fistuloso flavo. *Fries l. c. p. 264.*

In versuris graminosis. *Pusillus*, pulcher. Stipes tenax, glaber. Pil. 4 - 6 lin. latus, hemisphaericus, subhumidus; variat viridi flavus. Lamel. latae, aquose cinnamomeae. Fr. An Mycena?

275. *inquilinus*, pileo subcarnoso laevi subtestaceo, lamellis subdecurrentibus, ferrugineis, demum fuscis, stipite brevi tenace spadiceo. *Fries l. c. p. 264.*

"Ad terram stipites, ligna in Suecia. Gregarius. Stipes fibrillosus, deorsum attenuatus. Pileus subumbonatus, 3 - 6 lin. latus, colore pallescente, aut obscuriore, varius. Lamel. ad stipitem latissimae."

Epixyli. Pileo glabro.

276. *amadelphus*, gregarius parvus, pileo subcarnoso glabro planiusculo rufescente, amictu dilutiore, lamellis toto adnexis pallidis, stipite brevi farcto subfibrilloso.

A. *amadelphus*, exiguus, stipite pleno nudo, basi lanato, brevi; pileo semiorbiculari depresso; lamellis curvilineis arcuatis dentatis. *Bull. — Vent. Hist. d. Champ. p. 537. t. 550. f. 3.*

Rarius ad truncos crescit. Stipes pileo con-

color, unc. 1. fere altus. Pileus uncialis fere; satis carnosa.

B? epichadus, dimidio minor, pileo orbiculari lutescente, lamellis albido-pallentibus, stipite brevi, deorsum farinaceo-squamuloso, basi subferrugineo.

Semel mihi obvius ad basin trunci caesi, muscis obtecti. Pulchellus gregarius. Pileus 2 lin. fere latus, convexus, laevis, carnosulus. Stipes 3-4 lin. altus, vix lin. crassus: albido-pallens, et uti in *Agarico raineali*, cuius forsitan subspecies est, furfuraceus; sed quoad pilei colorem et habitationem, *A. amadelpho* congruit. *277. horizontalis*, minimus, stipite gracili pleno nudo brevissimo subhorizontali; pileo semiorbiculari, lateritio ferrugineo; lamellis subsemilunatis liberis. *Bull. — Vent. Hist. d. Champ.* p. 573. t. 324. *Sowerb:* t. 341.

In sylvis, pomariisque habitat. — *A. Sowerb.* in vetustis *Ulmi* campêstris caudiculis repertus. Secundum hujus iconem, pileus est convexus, hemisphaericus. Lamellae rotundato-adnexae. Stipes incurvus glaber, $\frac{1}{2}$ unc. longus, lin. 1 fere crassus. Pileus dimidiatunc latus.

†††††. *Pileo carnosso convexo (non infundibuliformi), colore vario (excepto albo), lamellis plurimque adnexis, sed non decurrentibus, incoloratis, stipite subbrevi valido, non velato.*

Obs. Hujus divisionis species plerumque terrestres sunt, majusculae, uniformes (ratione stipitis ad

pilosa), glabrae, saepius tamen plus minusve squamose, aut fibrillosae. Nonnullae cortina spuria, aut cito evanescere donatae, sed ob conformatiōnem huc relatae. Sporulae in multis albae.

* *Pileo pallescente, lutescente, flavo - aut luride virescente, fusco, umbrino, rarius rubello.*

278. *aeneus, magnus subcespitosus, pileo campanulato fusco - aeneo, lamellis latissimis rotundato, affixis griseo - pallidis, stipite farcto concolore, apice squamuoso. Syn. fung. p. 302. Bull. p. 620. t. 523. Ag. molybdocephalus.*

"In sylvis frequens recedente autunno: (ame nunquam repertus). Stipes crassus, subaequalis, ferrugineo - fuligineus et fusco - lineatus, 3 - 5 unc. altus, 1 - 2 crassus. Pileus 3 - 6 unc. latus. Caro tenuis, firma, fragilis, nivea. Lamel. latissimae, crassae, fuligineo - cinereae. Vent. l. c. Forma Lactiflui cuiusdam."

279. *acerbus, pileo carnoso alutaceo, margine ab initio involuto lineato tomentoso, demum laevi expanso, lamellis confertis albis, basi simplicibus, stipite solido fibrilloso - squamuoso.*

A. *acerbus, stipite crasso pleno nudo, apice squamuoso; pileo semiorbiculares, margine involuto; lamellis numerosissimis, falcatis, apice arcuatis et subalamistratis. Bull. — Vent. Hist. d. Champ. p. 603. t. 571. f. 2.*

Hab. in Gallia; rarius occurrat prope Paris. Forma, magnitudine, parum et colore

cum Ag. *involuto censem̄it*, sed notis essentia-
libus recedit, pileo enim in valde adultis, qui-
dem depresso, sed non infundibuliformi, lamel-
lis basi prope stipitem simplicibus non porifor-
mibus, nec decurrentibus, tandem stipite squa-
muloſo (non maculato-punctato uti in Bulliardī
icone), interdum fibrillis quasi reticulatis obte-
cto. Substantia pilei est compacta alba, stipitis
fibroso-fasciculato. Sapor equidem non acer-
bus *ex gr. fructuum immaturorum*, sed tamen
fastidibilis.

280. *repanus*, submagnus, pileo carnosō late
umbonato fibrilloso-squamoso subinciso re-
pando armeniaco, lamellis subangustis rotun-
dato-affixis *ex livido subfuscis*, stipite sub-
longo solido albicante. *Syn. fung. p. 329.*
Bull. Hist. p. 586. t. 423. f. 2. et t. 579. f. 1.
et *Agaricus sinuatus* Ejusd.

Apparet jam tempestive post primas im-
bres in sylvis, sed admodum rāra est haec spe-
cies satis pulchra et ponderosa. Stipes 4 unc.
fere longus, $\frac{1}{2}$ crassus. Lamell. vix 2 lin. latae,
colore griseo-cervinae. Pileus campanulatus,
obtusus demum expansus, superficie rimulosus,
disco carnosus, carne compacta. Odor nullus
aut parum nauseosus. Sapor adstringens.

B. *repanus*, pileo leviter carnosō lutescente,
marginē infracto flexuoso, lamellis liberis pal-
lidis, stipite longo solido, apice fibroso squa-
moso. *Fries Syst. I. p. 255.*

In Sueciae pinetis ericetosis. Pileus, praesertim disco, carnosus, campanulatus, irregularis rimosus, sericeus. Lamel. semilanceolatae, 2-3 lin. latae. L. c.

281. *sinuatus*, amplus, pileo glabro lutescente, lamellis leviter adnexis latissimis rufescensibus, stipite solido aequali candido. *Fries L. c.* p. 197. (exclus. Synon.)

Prostat in sylvis humosis. Speciosus, odore fere Sacchari adusti. Stipes validus 3-5 unc. longus, durus, subfibrillosus. Lamel. cinnamomeo - vel gilvo - rufescentes. Pileus expansus, obsolete umbonatus, demum depresso, ultra 6 unc. latus. Fr.

282. *flexuosus*, solitarius subviscosus, pileo carnoso convexo alutaceo-luteo, disco ferrugineo, margine sulcato-tuberculoso repando, inciso-lobato, lamellis subdecurrentibus ochraceo-cinnamomeis, stipite longo crasso albido-livido. *Schum. Saelland. p. 321. Flor. Dan. t. 1497.* (A. repandus). Ag. *flexuosus*. Wither. *Arrang. p. 174.*

In Daniae pinetis graminosis. Quoad iconem species est pulchra et magna. Stipes 4½ unc. longus, ultra unc. 1 crassus. Pileus 3-5 unc. latus, carne dilute ochracea. Lamel. laxae, repandae. S.

283. *grandis*, solitarius magnus, pileo obtuse umbonato pallescente, disco sublateritio, la-

mellis subadnexis subconcoloribus, stipite longissimo albido. *Syn. fung. p. 329.*

In Germaniae fageticis rariissime. Stipes solidus, 6-7 unc. longus, et 1 unc. fere crassus. Lamell. emarginato & adnexae, 3-4 lin. latae, etiam incarnato-pallidae. Pileus mammosus, non sinuatus, aequalis, 3-4 unc. latus, glaber, compactus. Sapor subviroso.

* *megalus*, maximus, pileo carnoso dilatato; disco convexo, lutescente glabro, lamellis confertis liberis albis, stipite longo subcrasso, basi tumido.

In strue quadam lignorum ad focum destinatorum repertus est a D. Cordier.

In specimine mecum communicato stipes longitudine fuit spithamea et ultra, unc. 1 crassus, compactus. Lamellae tenues, densae, prope stipitem rotundatae. Pileus latitudine bipalmari, sed fragilis, substantia molli, fragili, sapore subadstringente.

284. *elatus, caespitosus submagnus, pileo campanulato, disco subcarnoso, margine plicato, sordide ochraceo, lamellis latiusculis fuscescens, stipite longissimo fibrilloso-squamuloso.* *Syn. fung. p. 332. Battach. El. fung. Cont. 2. p. 11. t. 32. f. 188. Fries p. 248.*

In Germaniae et Sueciae pinetis sat frequens occurrit; etiam rarius prope Parisios obvenit in quercetis. Stipes subsolidus, fere spithameus. Lamel. primo ex albido subincarnatae, dein pul-

vere copioso subcinnamomeo obtectae. Pileus ab initio subglobosus, humidus subviscosus, 2-3 unc. latus.

β? longicaudis, pileo subcarnoso planiusculo subviscoso alutaceo, lamellis confertis argil-laceis subliberis, stipite longissimo albicante.

Syn. fung. l. c.

In Germaniae et Sueciae ericetosis nec non pinetis montosis. Stipes aequalis, 4 unc. lon-gus, 3 lin. fere crassus. Lamel. vix adnexae, punctatae. Pileus mollis, 1½ unc. latus. — In duobus his fungis nullum velum manifestum observavi,

285. populneus, pileo carnoso hemisphaerico gil-vo, margine involuto villoso albicante-pal-lido, lamellis adnatis spadiceis, stipite subfi-brilloso longissimo nitente-albido. †

Prope Turinum repertus ad Popul. abscisarum radices et truncos, quibus firmiter adhae-ret. In specimine sicco transmisso, stipes 6 unc. erat longus, ¼ fera crassus, solidus, apice, lamel. concolor forsitan a sporulis deciduis, Pi-leus 1 - 2 unc. latus, valde rugosus (exsicca-tione?), ceterum nitore insignis.

286. frumentaceus, farinam frumenti redolens, stipite crasso pleno laevi albicante aut ferru-gineo-maculato, pileo semiorbiculari, dein campanulate maculato, lamellis rarib. falcatis griseis. Bull. — Vent. Hist. p. 602. t. 574.

In sylvis ad terram frequens (?). Hujus

individua ut plurimum caespitosa et circinnato disposita, seu in tractus flexuosos producta. Stipes basi tumescens, subcinereo albescens & unc. fere crassus, 3-4 unc. altus. Pileus cavus, modo griseus, modo lineolis ferrugineis pictus, etiam aliquando roseo-vinosus, 4 unc. latus. Caro crassa, firma, nivea. Lamell. primum subalbidae. A. sequente praecipue distinguitur odore. *Vent. l. c.*

987. *fastibilis*, gregarius variabilis, pileo carnosō convexo subrepando rufescente et alutaceo-pallido, lamellis confertis subrotundato-adnexis ex argillaceo aquose cinnamomeis, stipite farcto albicante subfurfuraceo. *Syn. fung. p. 326. Obs. Mycol. i. p. 10. Conspect. fung. p. 171. Fries Syst. i. p. 249.*

Agaricus crustuliniformis Bull. hist. p. 589. t. 308. et 546. *A. gilvus* et *punctatus*. Schaeff. t. 221. et 40. *A. ceraceus*, *lateritius*, *subtestaceus*? et *clavus*? Batsch. El. t. . f. 195, 198 et 199. *Ag. graveolens*. Sowerb. t. 281. var.?

Sub finem aestatis et autumno frequens adest in sylvis variis, sed mire, praesertim colore, mutabilis, sapore et odore fortè nauseoso exceptis, quo mox distinguitur. Pro loco sicco, fertili aut umbroso, etiam magnitudine et colore dilutiore, aliquando fere albido, differt, hinc quoque subviscosus, humidus vel siccus est. Pileus satis carnosus, obtusus disco obscurior. Lamellae angulo acuto stipiti adnatae, te-

nues, margine subfarinaceae, aliquando subdecurrentes et guttulas stillantes. Stipes, qui plerumque 2-3 unc. longus, et 3-4 lin. crassus, interdum bulbosus est, et rarius cortina cinctus.

Obs. Plures varietates, forte subspecies, in *Syn. fung.* et in *Obs. Mycol. l. c.*, nec non in *Conspectu fung.* et apud D. Fries commemoratae sunt, quas non repetere vellem; sequens tamen, utpote constans, adnotari meretur, et species propria verisimile est.

* *mesophaeus*, gregarius minor, pileo subtenui umbonato applanato subviscoso livide rufescente, umbone obscuriore, lamellis adnexis, primo albidis, dein argillaceis aut aquose cinnamomeis, stipite tenui subelongato fibrilloso cortinato.

Frequens his in regionibus sub pinibus, in dumetis, passim quoque in quercetis occurrit, sed senior quam antecedens. Sapore fastibili antecedentis est. Pileus fragilis, fere ecarnis, $1\frac{1}{2}$ unc. latus, disco rufo-fusco peculiaris. Lamel. subventricosae, 3 lin. latae. Stipes 2-3 unc. longus, 2-3 lin. crassus, aequalis, albido-pallescens. Cortina tenuis, subcinnamomea.

Obs. Secundum ill. Spréngel, in Linn. Syst. veg. Ed. XVI. p. 460., Ag. *vibratilis* Fries Syst. 1. p. 226. mera *A. fastibilis* est var., et Ejusd. *A. saginus* p. 226. non equidem valde distat; sed velo gaudet viscoso, tenui, fugacissimo, carac-

-tero equidem haud magni momenti aestuman-
do, in fungo alioquin prateo.

288. *arcuatus*, subgregarius, pileo carnosō com-
paeto convexo subdepressoque inaequali - un-
dulato, e pallido subrufescente, lamellis con-
fertis attenuato - adnexis albīs, stipite com-
pacto solidō subfibrilloso.

A. *arcuatus*, stipite crasso pleno, pileo se-
mierbiculare fuligineo, lamellis liberis falcatis
arcuatis stramineis. *Bull. — Vent. Hist. d.*
Champ. p. 595. t. 443. et t. 589. f. 1.?

Specimina hujus fungi in sylvis et pascuis
a me reperta, magis iconem Bulliardī quam
descriptionem Ventenatii adaequant. Stipes 1½
unc. longus, $\frac{1}{2}$ fere crassus, primo albicans. La-
mellae arcuatae, truncato - emarginatae. Pileus
 $2\frac{1}{2}$ unc. latus, undulato - flexuosus, subnitens,
laevis. Odor subfortis. Sapor amaricans.

289. *rutilans*, pileo carnosō planiusculo flavi-
do, maculis rubellis ad marginem utpluri-
mum picto, lamellis pallidis, stipite longo
solido, deorsum incrassato. *Syn. fung. p.*
320. *Schaeff. t. 218.*

A. *xerampelinus* Sowerb. t. 31. A. *varie-*
gatus Schum. Saelland. p. 294.

B. A. *rutilans*, pileo obtuso sicco flavo, villo-
squamuoso rubello tecto, lamellis liberis
confertis rotundatis luteis, stipite farcto va-
riegato. *Fries Syst. 1. p. 41. (exclus. Battar.)*

In Germaniae, Angliae et Sueciae sylvis ad

terram, aut ad basin truncorum caesorum crescit, speciosa haec species. Stipes 3 unc. fere longus, maculis seu squamulis pictis, pileo concolor. Pileus obtuse umbonatus, rugulosus et in β. junior purpureus, deinde, villo secedente flavicans. Lamellae confertae, adnatae.

290. *rufus*, gregarius aut subcaespitosus, pileo carnoso convexo opaco scabro rutilo, margine subinvoluto albicante, lamellis confertis submarginato - adnexis albidis, stipite breviusculo subcrasso concolore.

Circa Parisios in sylvis, Octob., inveni hunc fungum, sequentibus forsitan nimis affinem, ut tanquam species salutetur. Pileus valde carnosus, 2½ unc. latus, disco pallidior, superficie ad visum scaber appetet, substantia dura et firma, sapore non ingrata. Stipes solidus, basi cohaerens, ad tactum, uti lamellae, rufescit.

291. *albobrunneus*, gregarius, pileo carnoso subviscoso badio, lamellis adnexis candidis, stipite farcto, pileo concolore, apice albido.

Syn. fung. p. 293. Fries. p. 37.

Agaricus glutinosus Bull. t. 537. f. 1. *A. striatus*. Schaeff. t. 38.

In sylvis, supra folia, sed satis rarus. Ad majores pertinet. Stipes subtumidus, dein cavaus, 3 unc. fere longus. Lamell. subdentatim decurrent. Pileus mammosus, 3 unc. latus, rufo-umbrinus. Sapor amarus uti in omnibus

affinibus mihi visus; sed Dr. Fries in suis Observ. Mycol. 2. p. 119. dicit: sapor non ingratus, ut esculentum crederem.

Obs. Sequentes varietates, notatu dignos, observavi.

B. dispar, pileo carnoso subviscoso umbonato brunneo, lamellis emarginato-adnexis, stipiteque subbrevi duro albido-lutescentibus.

Stipes elasticus, rectus aut parum incurvus, tenuiter squamulosus, lamellis, nec pileo concolor. Lamel. tenues, passim maculatae. Pileus 3 unc. fere latus, tandem planiusculus, obtuse umbonatus. Cortina, uti in priore, omnino nulla.

y. rufobrunneus, magnus, pileo appланato rufobrunneo, lamellis abrupto-adnexis candidis, stipite solidо subradicato albido, deorsum subrufescente.

Odor subfortis. Sapor adstringenti-amari- cans. Pileus subnitus, latus. Lamel. tenues, 4 lin. fere latae. Stipes subfibrillosus.

y. dubius, pileo hemisphaerico glabro brunneo, lamellis planis confertis dentatim adnexis lutescentibus, stipite fibrilloso fuscescente, intus flavido.

In sylvaticis raro; habitu omnino A. sulphurei, sed colore et sapore amarulento antecedentium. Odor fortis, virosus. Pileus non viscosus, opacus, late umbonatus, 2½ unc. latus. Lamel. juniorum emarginato-adnexae, in adul-

ties sublineatim decurrent. Stipes 3 unc. longus, 2-3 lin. crassus, sordide fuscescens, apice lutescens, sub lente visus, squamu-
lis minutissimis aut fibrillatis vestitus.

292. *flavobrunneus*, pileo carnoso planiusculo rufo-fulvo, deinde obscuriore, sicco glabro, lamel. subadnatis flavis, stipite cavo aequali glabro. *Fries Obs. Mycol.* 1. p. 119. *A. incertus*: Schaeff. t. 62.

A. fulvus, pileo viscosa virgato rufofulvo discoideo, lamellis adnexis flavis, stipite ca-
vo aequali fibrilloso. *Fries Syst.* p. 37.

Agaricus fulvus. *Bull. Hist.* p. 608 et 609.
t. 555. f. 2. t. 574. f. 1.?

Agaricus trichopus, var. *virgatus*. *Consp. fung.* p. 163. ex Fries:

"In dumetis, et sylvis humidis, frequens.
Odor farinace recentis. Pileus subsquamulosus,
essim late umbonatus. Stipes 3-4 unc. lon-
gus, rufescens, intus flavus. Lamel. latae, sae-
pius rufo-maculatae." Fr. — Pileus convexus,
late umbonatus, demum planiusculus, rufobrun-
neus, et ut plurimum nigro-virgatus. Lamel.
demum rufescentes. Stipes firmus, pileo sub-
concolor, basi albo-tomentosus. *Consp.*

293. *nigritans*, pileo laevi subviscoso badio-ru-
fo, lamellis liberis flavis, stipite solido ae-
quali glabro, apice squamuoso. *Fries l. c.*
p. 38.

In Sueciae ericetis, sub Betulis, raro. Sti-
Sectio tertia. M

pes albido - flavescens, 2-3 unc. longus, $\frac{1}{2}$ crassus. Pileus subtenuis, obtusus; 2 unc. latus. Lamel. immaculatae, 4 lin. latae. Sapor nitidus. L. c.

294. *pessundatus*; gregaridus, pileo compacto repando viscoso rufescente; lamellis liberis stipiteque solido brevi villosa - squamoso albis.

Fries, *L. c.* p. 4.

In Sueciae pinetis aridis, passim. Odor farinaceus. Stipes bulbiformis, raro productus, unc. 1 crassus et latus. Pileus junior infractus, dein convexus, undulatus, subinde granulatus et inquinatus, 3 unc. longus. Lamel. perangustae, albae. Fr.

295. *granulatus*; sparsus, pileo planiusculo granulato - squamuoso cinereo livido, disco umbro, lamellis distantibus candidis, stipite farcto aequali fibrilloso albido - fuscenscente.

Fries L. c. p. 39. (*A. miculatus*). *A. granulatus*. *Schaeff. t. 21.*

In Germaniae et Sueciae quercetis, non frequens. Pileus glaber, humidus viscosus? 3-4 unc. latus. Lamel. subadnatae, 2-3 lin. latae. Stipes demum cavus, 2-3 unc. longus; ultra dimidium crassus.

296. *Russula*, submagnus, pileo subdepresso viscoso granuloso stipiteque aequali apice squamuoso roseis, lamellis subliberis candidis. *Fries p. 38.* *Syn. fung. p. 338.* *Schaeff. t. 58.* Et *Ejusd. t. 75.* *A. roseus*, stipite elongato.

In sylvis, etiam rarer occurrit. *Russula* mentitur, hinc Ag. *pectinatum*. Bull. t. 509. f. n. hoc pertinere suspicor, sed lamellae omnino inaequales sunt. Stipes roseo-ruber, apice villoso-pruinatus.

297. *luteo-virens*, subcaespitosus, pileo carno-so compacto subflexuoso pulverulento lutescente-viridi, lamellis angustis subliberis pallescentibus, stipite brevi squamuoso albo. *Consp. fung.* p. 168.

"Amat sylvas acerosas subsiccas. Pil. 2-3 unc. latus, subirregularis, saepe rimoso-tesselatus, margine subinvolutus alboque tomentosus. Stipes solidus, ut plurimum brevissimus uncialis, obconicus."

298. *flavovirens*, pileo carnoso compacto flexuoso flavescente, squamulis nigrescentibus variegato, lamellis emarginatis dilutioribus, stipite sublongo, deorsum attenuato laevi concolore. *Syn. fung.* 1. p. 319. *Abbild. der Schwämme, 3tes Heft.* A. aureus. Schaeff. t. 41.

A. *equestris*, pileo pallido, disco luteo, lamellis sulphureis. *Linn. Flor. Suec.* p. 446. Ex D. Fries, sed descriptio parum convenit.

In Germaniae et Sueciae pinetis et fagetis, non valde rarus. Stipes etiam aequalis, subdurus, hinc inde flexuosus, 1-3 unc. longus. Pileus saepe difformis et depresso, non viscosus,

3 - 5 unc. latus, tempestate frigida virescens.
Sapor mitis.

299. *chloroxanthus*, subcaespitosus, pileo carnoso hemisphaericō subdepresso obsolete squamoso, squamis lutescente - olivaceis, lamellis emarginato - affixis lutescente - cinnamomeis, stipite solidō brevi fibrilloso.

In horto quodam eum ad terram, sed adhuc, una solummodo vice offendit: a 2 antecedentibus nihilominus diversum puto. Stipes $1\frac{1}{2}$ longus, 3 lin. crassus. Lamellae latae, 3 lin. fere, sed tenues, turbidae. Pileus ad summum $1\frac{1}{2}$ latus, in ambitu subcarnis, squamulis sparsis obsitus.

300. *chloroleucus*, subparvus regularis, pileo subcarnoso late umbonato flavo - viridi, squamulis sparsis aequalibus, lamellis confertis sordide albis, stipite subtenui aequali villoso-squamuloso lutescente. — Battar. t. 18. f. 4.

In agrorum limitibus in quergetis lectus in Italia. Pedunculus oblongus, exilis, rigidus, cavus, villosus, sordide lutescens, (ex ic. 2 $\frac{1}{2}$ unc. longus, 2 - 3 lin. crassus). Pileolus (2 unc. latus) inferne crebris sulcis (lamellis) foedo - albo tinctis munitus, superne flavo - viridis et villosus. B. — Squamae minutae modo regulari sunt dispositae.

301. *leucosanthus*, pileo carnoso obsolete umbonato pulchre flavo, pilis appressis nigrescentibus, lamellis distinctis emarginato - ad-

nexus, stipiteque glabro candidis. *Syn. fung.*
p. 321. *Consp.* p. 167.

B. Agaricus sejunctus. *Sowerb.* t. 126. *Fries Syst.* 1. p. 47. (Forma rudi et colore minus laeto est, quam noster fungus).

In sylvaticis ericetosis, *B.* in pinetis sicceis habitat. Stipes 2 unc. longus, $\frac{1}{2}$ fere glaber (in fungo Sowerbeano ultra unc. crassus et lutescens). Lamellae fragiles, 2 $\frac{1}{2}$ lin. latae, Pileus 2 $\frac{1}{2}$ unc. latus, (secundum D. Fries, var. albus, pallescens). Sapor amarus, quoad Conspect. in Lusatia mitis.

* *holosanthus*, pileo subcarnoso campanulato subluteo, medio squamuoso, lamellis latis luteis, stipite subincurvo albicante. — *Batt.*
p. 44. t. 19. f. L.

In sylvis Majani, autumno. Pedunculus rigidus, qui in fila sericea veluti scanditur, subalbidus. Sulci profundi, crebri et lutei. Corpus carnosum, pileoli fere nullum; cutis superior lutea, et circa acumen villosa. *Batt.*

Obs. Habitum Ag. luridi bene sistit, sed ab eo pileo ecarni, cest. differt.

302. *luridus*, subgregarius, pileo carnoso convexo virescente - subcinereo, disco obscuriore, lamellis angustis subcrassis lutescentibus, stipite solido squamuoso, pileo concolore.
Syn. fung. p. 321. *Schaeff.* t. 69.

In sylvis frondosis (circa Parisios quoque non infrequens) et in ericetis adest. Magnitudine

est communi et forma regulari. Stipes $1\frac{1}{2}$ - 2 unc. longus, unc. 1 fere crassus, aequalis aut deorsum parum incrassatus, durus, interdum cinerascens. Lamel. confertae, emarginato-adnatae, planae, 3 lin. latae, etiam albae, pallescunt. Pileus $1\frac{1}{2}$ unc. latus, non viscosus.

Obs. Variat sequente modo. Pileus nunc est glaberrimus, fere nitens, nunc minutissim squamulosus: squamulis nigricantibus, aut concoloribus. Lamel. albidae, etiam latae. Stipes nunc rectus, nunc incurvus, subinde flexuosus. Odor satis fortis, sed non ingratus, et sapor subamericans, aut adstringens, etiam virosus.
303. fucatus, pileo flexuoso virgato viscido luidio, lamellis emarginatis latis, stipiteque solido subsquamuloso flavescente-albis. *Fries p. 40.*

In Sueciae pinetis siccis, et ad vias (sylvaticas?) arenosas, frequens, hinc globulis saepe inquinatus. Stipes difformis, bulbosus, raro elongatus. Pileus 2 - 3 unc. latus, marginé tenuis. Lamel. 4 lin. latae, subconfertae. Sapor mitis. *l. c.* — Sapore miti et pileo viscoso ab antecedente solummodo differre videtur.

304. atro-virens, pileo tenui obscure viridi-olivaceo, squamulis minutis scabro, lamellis pallidis, stipite solido elongato nigricanteumbrino. *Syn. fung. p. 319. +*

Rarius in Germaniae fagetis repertus. Species parum dubia, cum ab aliis non reperta sit,

nec a me denuo visa. Habitum *luridi*, stipite modo longiore et pileo parum carnoso, nec non colore multo obscuriore ab eo discrepat.

* *prasinus*, pileo squamoso viscidō luteo-viridi, lamellis liberis luteis, stipite solidō crasso tuberoso. *Fries. Syst. p. 39. ad Schaeff. ic. t. 218. Comment. p. 90.*

In sylvis montosis muscosis in Germania.

Obs. Species quoque valde incerta, et praeter auctorem, et forte *Hall. Flor. Helv. p. 177.* a nullo recentiorum commemorata est. Secundum iconem, conformatio[n]e est *luridi*, sed stipes basi marginato-bulbosus pictus est, et pileus squamosus.

305. *flavorufus*, minor, pileo carnoso hemisphaericō subrepando flavorufo villoso, lamellis confertis lauis, primo albis, dein flavicanib[us], stipite subbrevi glabro cāndido.

Monomyces flavo-rufus. Battar. p. 41. tab. 15. fig. F.

In Italiae sylvis (in luco delle Grazie).

Obs. Hic fungus totum habitum Ag. *plutei* (forma communi) refert, ita ut verisimile patet, eum cum hac specie in eadem divisione esse locandum; color quidem non obstat, nam A. *Leoninus* etiam flavus est, sed autopsia hoc decidere debet.

306. *aurantius*, gregarius submagnus, pileo carnoso squamoso viscoso aurantio-flavo, lamellis confertis candidis, stipite solidō squa-

moso, apice albido. *Syn. fung. pag. 292.*
Schaeff. t. 37. Fries p. 39.

In Germaniae et Sueciae pinetis non infrequens, odore forti et sapore amaro, uti et colore, ac cortinae praesentia a consimilibus facile differt. Stipes transversim squamulosus, apice excepto, pileo concolor, crassus aequalis. Pileus ad tactum humidus, planiusculus, 2 - 3 unc. latus.

307. *vaccinii*, pileo carnosio umbonato piloso-squamoso rufo, lamellis adnatis albido-rutilis, stipite elongato fibrilloso rufo. *Syn. fung. p. 293. Schaeff. t. 25. Fries l. c. p. 52.*

Agaricus rufus. Ic. et Descr. fung. Fasc. 1. p. 6. t. 2. f. 1 - 4. A. impuber. Batsch. El. cont. 1. p. 155. t. 23. f. 6.? (mala).

Cresc. in montosis pinetosis, locis magis humentibus. Stipes 3 - 4 unc. longus, $\frac{1}{2}$ crassus, cavus, subcortinatus. Lamel. latiusculae, emarginatae, juniorum albae, in vetustis saepe rufo-maculatae. Pileus subumbonatus, 2 - 3 unc. latus, carne spongiosa, amara.

* *imbricatus*, pileo sicco squamuloso umbrinorufo, margine pallidiore pubescente, lamellis albido-rutilis, stipite farcto subsquamoso, apice albo-pulverulento. *Fries l. c. Ejusd. Obs. 1. p. 27.*

308. *decorus*, luteus, pileo carnosio explanato subdepresso, squamulis nigricantibus scabro,

lamellis confertis adnexis dein liberis, stipite aequali farcto. Fries Syst. p. 108.

Agaricus flavo-virens. Ejusd. Obs. Mycol.
1. p. 25. (ubi stipes *subfistulosus* describitur).

"In truncis cariosis Pini, in Smolandiae sylvis copiose. Aug. — Oct. Elegantia nulli cedit. Stipes variat fibrillosus, squamulosus et apice albo-farinaceus, demum cavus, 1 - 2 unc. longus, 2 lin. et ultra crassus incurvus. Pileus subfragilis, interdum irregularis, 2 - 5 unc. latus."

309. *ectypus*, *gregarius*, pileo carnoso plano-convexo sordide flavo, disco minute squamu-
loso, lamellis adnatis distantibus pallidis, sti-
pite cavo fibrilloso, deorsum olivaceo-fusco.

Fries L. c. p. 108 et 109. +

In pratis uliginosis circa Ferrojo, in Suecia, vulgaris dicitur. Singulari Naturae lusu, dicit autor. Ag. *melleum* (*polymycen*) exacte refert, modo differt squamis obsoletis, annuli vestigio nullo et odore aniseo, dein vero nau-
seoso (forsitan interea idem fungus). Stipes 2-
5 unc. longus, 3 - 5 lin. crassus. Pileus dein
subdepressus, filis tenerimis, e centro radiatis,
instar fuliginis conspersus, 3 - 4 unc. latus. La-
mellae primo albae, dein pallescentes et rufo-
maculatae e sporidiis copiosis subfarinaceae (uti
in *melleo*).

310. *hordus*, subcespitosus, pileo fragili sicco
virgato lurido, lamellis emarginatis latissimis

stipiteque farcto aequali candidis. Fries l. c.
p. 47.

In nemorosis praecipue Scaniae. Valde af-
finis Ag. *sejuncto* Sow. Stipes validus, 3 - 6 unc.
latus, glaber. Lamel. ventricosae. Pileus con-
vexus, 3 - 4 unc. latus, opacus. Sapor mitis.
L. c.

311. *felleus*, subsolitarius, pileo carnoso com-
pacto planiusculo viscoso subspadiceo, lamel-
lis confertis subdentatim decurrentibus albis,
stipite elasticō squamuloso, pileo concolore.

Non rarus, sero autumno, in sylvis circa
Parisios, colore obscure brunneo, odore forti
et sapore amarissimo insignis. Pileus glaber,
obsolete umbonatus, $2\frac{1}{2}$ unc. latus. Lamel. sub-
angustae. Stipes aequalis, subexcavatus, indu-
ratus, 3 unc. longus, 3 lin. crassus.

312. *phaeochrous*, pileo carnoso flexuoso fus-
co - rufescente, fibrillis adpressis, lamellis sub-
liberis, primo albidis, demum subrufescen-
tibus, stipite solidō squamuloso subalbicante.

In caldario supra pulverem coriarium re-
pertus sub finem hyemis. Pileus 3 unc. et plus
latus, in medio satis carnosus: carne compacta;
sed in ambitu tenuis. Lamel. latitudine medio-
cri, sporulis albicantibus obiectae. Stipes com-
pressus, 2 unc. longus, $\frac{1}{2}$ crassus, radiculis den-
sis fibrillosis. Sapor virosus.

313. *aestuans*, pileo umbonato sicco flavo - ru-
fescente, versus marginem fibrilloso, lamel-

lis emarginatis luteis, stipite striato farcto concolore. *Eries Syst. 1. p. 47.*

In colliculosis muscosais sub abjetibus densis, in Suecia, gregarie crescit. Elegans, sapore maxime urenti. Similis *A. sulphureo*. Lamellae fere liberae, $\frac{1}{2}$ unc. latae. Pileus leviter carnosus, junior glandiformis, dein explanatus, fragilis, 3-4 unc. latus. Stipes subventricosus, 3 unc. longus, 3-6 lin. crassus, attenuatus. *Fr. 314. sulphureus*, subgregarius olens, pileo carnoso subumbinato flavescente (subinde rufescente) glabro, lamellis remotis emarginatis, sublineatim decurrentibus, stipite sublongo aequali sulphureo. *Syn. fung. p. 322. Bull. t. 168. Sowerb. t. 44.* (mediocris).

Autumno non infrequens in sylvis, praesertim arenosis. Pileus demum subdepressus, 3 unc. fere latus, interdum planus, nec umbo-natus. Lamellae crassiusculae, subventricosae, distinctae. Odor subfortis, nauseosus, interdum non ingratus, a b. Sowerby cum Hyacintho comparatus. Sapor substypticus.

* *coronarius*, solitarius odoratus, pileo carnoso umbonato subrugoso alutaceo-pallido, aut dilute sulphureo, lamellis rotundato-adnexis latiusculis, stipite elongato albido subradicato. *Syn. l. c. p. 323.*

In pinetis hercynicis provenit. Odor sat suavis, fere ut in Philad. *coronario*. Antecedenti affinis, forte tamen distinguendus, ut spe-

cies. *Fungus suecicus* mihi ignotus, quā ex D. Fries, habet stipitem rigidum, apice subpruīatum, lamel. caudidas, fragilis, et pileum $1\frac{1}{2}$ -2 unc. latum, planum, intus album.

315. *cerinus*, gregarius flavo - *cerinus* opacus, pileo carnoso convexo - plano, glabro, lamellis confertis adnexis, stipite brevi solido glabro. *Syn. fung. p. 321. Fries l. c. p. 89.*

Hab. in Germaniae et Sueciae sylvis pineis. Magnitudine mediocris. Stipes sat firmus, substriatus, aequalis, aut deorsum attenuatus, deīnum saepius nigrescens; unc. 1 longus. Lamel. planae, angustae. Pileus 2 unc. fere latuś, (variat fuscescens Fr.) carne alba amaricante, Sporulae albae.

316. *sebaceus*, parvulus subcaespitosus, pileo subcarnoso laeviter convexo, glabro, humido subcerino, sicco albido, lamellis distinctis albicantibus, stipite firmo concolore, basi villo denso connexo.

Repertus, Octobri, sub nonnullis arboribus acerosis in Viridario Monceau. Recens, aëre praesertim humido, sebo liquefacto, quoad colorem, non assimilis. Sapor fastidiosus, subadstringens. Stipes $1\frac{1}{2}$ unc. longus; ultra lin. crassus. Lamel. subtenues, lin. 1 latæ. Pileus unc. 1 paullo latior.

317. *Liquiritiae*, pileo carnoso convexo aureo glabro, lamellis confertis fulvo - cinnamomeis,

stipite cavo fibrilloso, pileo subconcolore.
Syn. fung. p. 306.

Ad truncos pineos in Hercynia provenit.
Stipes $1\frac{1}{2}$ unc. longus, 2 lin. crassus. Pileus
unc. 1 latus, disco saepe nitens. Sapor primo
dolcis, dein amaricans. Nec cortina, nec annu-
lus a me observatus, hinc ab A. *astragalino*
Friesii diversus videtur.

* *sapineus*, solitarius vel subcaespitosus pileo
carnoso lutescente, lamellis affixis albido - fla-
vis, passim fulvo - cinnamomeis, stipite sub-
solido striato pallido. Fries' Syst. p. 239.

In Sueciae truncis pineis, nestate ad serum
autumnnum usque. Stipes fibrilloso - striatus, ba-
si albido - villosus, 2 unc. circiter longus. Pi-
leus 1 - 2 unc. latus, laevis aut rimoso - squamo-
sus, carne pallida subamara. l. c.

Obs. Admodum variat ex auctore, et for-
san a sequente non diversus, cum quo sapore
et pileo saepius rimoso - squamoso convenit.
Cum antecedente etiam multa gaudet affinitate,
praesertim ratione coloris.

318. *picreus*, gregarius subcaespitosus, pileo
glabro cinnamomeo, lamellis emarginatis, lu-
tescente - ferrugineis, stipite glabro rubigino-
so. Syn. fung. p. 315. Icon. fung. 1. p. 14.
t. 4. f. 7.

Ad truncos, praesertim pineos, quoque
crescit. Stipes cavus, $2\frac{1}{2}$ unc. longus, subprui-
nosus, demum compressus. Pileus $1\frac{1}{2}$ - 2 unc.

latus, in diene adiutis plenō - subdepressus; interdum maculis concoloribus aut squamulis spuriis variat.

In Sueciae sylvis, ericetis, ad vias et in campestribus graminosis. Major, firmus, habitu Boleti (in Obs. l. c. cum Hydnō imbricato comparatur). Stipes inaequalis, rufescens. Pileus obtuse umbonatus, rimuloso - squamosus, in umbrosis totus pallescit. Nonne mera prioris var., a quo caractere minoris momenti separandus videtur?

319. *buxeis*, submagnus, pileo late campanulo - lato pallescente fulvo pilis sparsis hirsuto, lamellis lutescentibus, stipite cavo flexuoso glabro, pileo concodore.

Fungus pileolo desuper lacero et veluti filamentoso, fulvi pallescentisque coloris, substantia et lamellis buxeis, pediculo fistuloso, superne pilei parte subconcolore. Mich. Gen. p. 158. t. 74. f. 2.

Mense Octobri in Montis Senariae sylvis, in Italia.

320. *litopus*, subparvus, pileo gibboso minutim squamuoso flavicante, lamellis confertis albidis, stipite tenui longo flexuoso, squamuulis erectis hispido. — Battar. p. 45. t. 20. f. H.

Autumno circa Sabinianum. Pedunculus longus, exilis, rigidus cavus, externe villosus, cuticula lutea obductus. — Ex ic. basi tumi-

dus, 4 unc. longus, 2 lin. crassus. Pileus 1½ unc. fere latus.

321. *erinaceus*, gregarius submagnus, pileo subcarnoso late umbonato fibroso-squamoso opaco subspadiceo, lamellis confertis emarginato-affixis griseo-cinnamomeis, stipite longo glabro subfuliginoso.

Sub arboribus rarissime repertus. Stipes 3 unc. fere longus, 3-4 lin. crassus, striatus, tenuiter lanatus. Lamel. 2-3 lin. latae, primo subfulagineae. Pileus planus, 2-3 unc. latus, umbo subgloboso instructus, et fibrillis rigidis squamaeformibus distinctus. Sapor parum vitiosus; sed odor est dulcis, pyrinus, verum in aliis speciminiibus fere cantharidum.

322. *mamillanus*, pileo subcarnoso, circum umbonem crassum dilatatum impresso, cristalino, lamellis griseo-cinnamomeis latis affixis, stipite glabro subbulboso, apice incrassato, pileo concolore.

Rarius in sylvis. Sapor acris valde ingratus. Stipes solidus, subdurus, 2 unc. longus. Pileus appланatus, 2-3 unc. latus.

323. *incisus*, subparvus, pileo parum carnoso umbonato squamoso spadiceo, lamellis distinctis ferrugineis; stipite subbrevi cavo glabro.

Syn. fung. p. 311.

In sylvis rarer ad terram. Stipes vix ultra unc. 1 longus, lin. 1½ crassus, aequalis. Pi-

lēus campanulato - hēmisphaericus, squamis adpressis, margine saepe incisus.

324. *phaeolepis*, gregarius parvus, pileo subcarnoso obsolete umbonato rimoso-squamoso spadiceo, lamellis latiusculis rotundato-subadnexis aquose cinnamomeis, margine subfarinaceis, stipite brevi subconcolore farinaceo.

In sylvula quercina (Romainville) rarius repertus. Stipes vix unc. 1 longus, lin. 1 aut magis crassus. Lamellae secedentes. Pileus disco in umbonem incompletum prominet, campanulatus, in squamas obsoletas rimosus, $\frac{1}{2}$ unc. latus. Sapor subvirosum. Cortina non observata.

325. *phaeocomis*, subsolitarius parvulus, pileo subhemisphaerico obtuso squamoso: squamis diisci fasciculatis erectis, spadiceo, lamellis toto-adnexis concoloribus, stipite tenui ca-vo fibrilloso subconcolore.

In quercketis, autumno, minus raptor. Stipes unc. $1\frac{1}{2}$ fere longus, lin. 1-2 crassus. Lamellae latae, a stipite facile secedunt. Pileus 1-6 lin. latus, carne molli. Haec cum antecedentibus speciebus concoloribus accuratius examinanda.

326. *ambiguus*, gregarius parvulus, pileo carnosno umbonato fibroso-squamoso brunneo, lamellis confertis uncinato-adnexis griseis, stipite brevi farinaceo solido concolore.

In

In quercetis rarissime. Stipes $\frac{1}{2}$ unc. longus, subdurus, nudus. Pileus $\frac{1}{2}$ unc. latus, indorus. Ab A. rimosa, colore et lamell. adhaerentia distat.

327. *aridus*, parvus subsolitarius obscurae brunneus opacus, pileo convexo squamoso; squamis fasciculatis, stipite brevi subincurvo squamuoso.

Agaricus lanatus. Sowerb. t. 417. (bona).

Rarissime in Anglia et Gallia, ad ramos dejectos, aestatis fine sese propagat. Substantia sicca. Stipes solidus, aequalis, 4-6 lin. longus, lin. 2 crassus. Pileus $\frac{1}{2}$ unc. latus, primo globosus. Lamel. concolores.

328. *cincinnatus*, subgregarius, pileo subcarnoso convexo-plano villoso-squamoso fuscō, lamellis adnexis stipiteque solido squamoso fusco-violaceis. Fries Syst. 1. p. 256. A. cristatus. Scop. Carn. p. 449.

In Sueciae sylvis frondosis. Stipes gracilis, $\frac{1}{2}$ unc. longus, fibrilloso-squamulosus. Lamel. ventricosae, secedentes. Pileus obsolete umbonatus ultra $\frac{1}{2}$ unc. latus.

329. *calamistratus*, pileo campanulato subcarnoso stipiteque solido basi caeruleo fuscis squamoso-squarrosis, lamellis adnexis, primo albidis, demum ferrugineis. Fries l. c.

In Sueciae pinétis sabulosis, saepe uliginosis, frequens. Odor fortis. Stipes durus, subradicatus, intus rubescens, 2 unc. plerumque

Sectio tertia.

N

longus, & lñ. crassus. Lamellæ accedentes, margine albicantes. Pileus obtusus, primo infractus, dein explanatus, i - g. unc. latu. Fr. 330. *lacerus*, pileo subcarnoso fibrilloso-squamoso murine aut umbrino, lamellis adnexis ventricosis stipiteque solido fibrilloso subalbidæ concoloribus. *Fries I. c. p. 257.*

Agaricus maritimus. Ejusd. Obs. 2. p. 41.

Agaricus rimosus, B. vialis. Syn. fung. p.

310. *Consp. fung. p. 164.*

In Germaniae pinetis, in Suecia ad rivulorum margines, limum exsiccatum, et in arenosis maritimis, aestate et autumno. Stipes tenax, rarius aequalis, deorsum attenuatus, intus rubescens. Pileus convexus, obtusus, dein subrimosus et squarroso-squamulosus, saepe inquinatus. *I. c.*

331. *rimosus, solitarius et subgregarius, pileo umbonato longitudinaliter fibrilloso sericeo cervipo, demum rimoso, lamellis toto-adnexis griseo-pallidis, stipite aequali farcto subfarinaceo pallescente. Syn. fung. p. 310. Bull. t. 599. Sowerb. t. 343.*

Agaricus aurivenius. Batsch El. fung. t. 20. fig. 107. (mediocris).

Vulgaris in sylvis, locis tamen magis aperitis, graminosis. Stipes subtenuis, albicans aut griseo-pallens. Lamel. confertae, primo albae, dein griseo-argillaceae, pulverulentæ, margine albicantes. Pileus ab initio campanulatus,

dein planus, in speciminitibus luxuriantibus etiam depresso, et tunc valde rimosus et incisus evadit; nunc opacus, nunc nitens, acetate praesertim juniore: Seper amaricans, aut stypticus.

Obs. Haec species valde ludit pilei forma et colore; uti e sequentibus varietatibus apparet:

a. *pallide rufus*; pileo campanulato-conico fibrilloso-squamoso, lamellis griseis toto-adnexis, stipite striato solido, ex albido rufescente.

Stipes 3-4 unc. longus, intus queque rufescens. Pileus elasticus.

b. *santalinus*, major; pileo campanulato, acute umbonato striato-rimuloso rufo-cinnabino, lamellis subcinnamomeis, stipite elongato, deorsum incrassato, pileo subconcolor.

Stipes 3-4 unc. longus, 3-4 lin. crassus. Pileus $1\frac{1}{2}$ unc. latus et altus, fere glaber, sed obsolete squamuulosus, epidermide tamen longitudinaliter rimoso, siccus suberens.

c. *pullulans*, subcespitosus fragilis, pileo subumbonato fibrilloso-squamoso rufescente, lamellis fusco-griseis (aqueo cinnamomeis) toto adnexis, stipite incurvo, extus intusve rubescente globo.

Ad latus asserum e terra quasi pullulans repertus, mense Augusto. Stipes ob locum naturali fere decumbens, etiam valde fragilis, fi-

brossa, ad. 3 unc. longus, 4 lin. crassus, spics albicans. Pilea 2-3 unc. longus, carne spongiosa rubescens. Odor fortis. *d. dehiscentia*, submagnus, pileo subcarnoso umbonato rimoso-facero, umbrino, lamellis sublineatim decurrentibus griseo dilute-cinnamomeis, stipite longo striato subrufescente. Rastus in sylvis. Ag. rimosa var. vulgaris duplo fere major. Stipes durus, infra terram subbulbosus, glaber.

Obs. In varietate, quae communiter aere offert, stipes plerumque crassitudine aequalis, farctus est, sat tenuis, pileo multo dilutior, pallescens; subinde albicans, subfarinaceus. Lamellae quidem toto adnexae; sed facile a stipite secedunt; plerumque griseo-argillaceae, pulvere (sporum) copioso obtectae, exsiccando margine albicantes. Pileus 2-2½ unc. latus, junior campanulatus, dein planus, obtuse umbonatus, et in valde evolutis aut luxuriantibus etiam depresso est; et tunc magis rimosus et incisus, colore plerumque griseo-cervino, aut fusco-lu-

tescens.

* *pleocephs*, gregarius parvulus, pileo hemisphaericō obsoleto umbonato sericeo crustalino, lamellis albido-griseis, subargillaceis horizontalibus, stipite brevi subfarinaceo concolor.

Hanc subspeciem, a *rimosa*, ut puto, distingue distinctam, inveni in terra culta in vicinitate

is tamen sylvulas (Vincennes, propè Parisios) cuius stipes erat $1\frac{1}{2}$ unc. fere longus et 2 - 3 lin. crassus, duriusculus. Lamellae smarginato-adnexae, colore omnino antecedentis, sed situ diversae, et nigro-punctatae. Pileus non rimosus, et sub lente velutinus.

332. *fuscogriseus*, parvulus, pileo planiusculo umbonato fuscescente - griseo: squamis appressis concoloribus, lamellis confertis adnatis subventricosis niveis, stipite brevi aequali tenui nitente subfuligineo.

In sylvula Vincennes. Stipes subdurus, $1\frac{1}{2}$ unc. longus, 2 lin. crassus, subfibrillosus. Pileus unc. 1 latus.

333. *squarrulosus*, pileo campanulato subumbonato squamuoso cervino, lamellis latiss horizontalibus toto-adnexis ex argillaceo subcinnamomeis (margine albicantibus), stipite brevisculo cavo subfibrilloso albicante.

In sylvis rarius ad terram. Stipes ultra unc. longus, $1\frac{1}{2}$ lin. crassus. Lamell. totam fere pilei cavitatem explent. Pileus 3 - 4 lin. altus, 4 - 6 lin. latus, in valde adultis margine subincisus, et squamae squarrosae evadunt. Et haec species affinitatem habet cum *rimoso*, sed pilatus in superficie non dehiscit.

334. *dulcamarus*, mediocris, pileo subcarnoso hemisphaerico umbonato cervino: squamulis pilosis appressis, lamellis confertis toto adnexis ex argillaceo dilute olivaceis, stipite

longitudine mediocri farcta. *Syn. fung. p.*

325. *Ic. pict. fung. Fusc. 3. t. 15. f. 2.*

In Germaniae pinetis, rarius. Stipes glaber, aequalis, basi tomentosus, uncialis. Lamellae sat: latae. Pileus unc. 1 fere latus, umbo carnosus et crasso distinctus, in ambitu ferre ecarnis est.

335. *cervicolor*, gregarius, pileo subcampanulo-

- lato acute umbonato viloso cervino, lamel-
lis sordide albis, stipite elongato fibrilloso
subspadiceo. *Syn. l. c. Ic. pict. fung. Fusc.*

2. p. 19. t. 8. f. 4.

In fagetis occurrit. Stipes farctus, fibrilosus, apice squamulosus, 2 - 3 unc. longus, a lin. crassus. Pileus unc. 1 fere latus. Sapor uti in priore; etiam, uti ille, cortina orbatus a me reperitus est.

336. *pilipes*, caespitosus fusco-argillaceus, pi-

leo conico-laevi glabro, lamellis confertis li-
beris, stipite aequali toto piloso. *Sowerb.*
t. 249. Fries. Syst. 1. p. 154.

In Anglia, ad Agaricos putridos repertus.
Stipes 2 unc. longus. Lamel. adscendentes. —
Pileus subcarnosus, obtusus, uncialis.

337. *trachelinus*, fuscus, pileo convexo fibrili-
lis liberis strigoso, lamellis adnatis distanti-
bus crenatis, stipite basi floccoso radiosus.
Fries. l. c.

Ad terram humidam, in rivulorum alveis
exsiccatis, locis umbrosis, solitarius vel grega-

rius. Stipes filiformis, junior tenax, totus villosò-squamulosus, basi strigoso-radiatus. Lamel. ventricosae, margine, sub lente, flocculose. Pileus tenuis, humidus striatus, siccus laevis. l. c.

338. *farinaceus*, *gregarius*, pileo subcarnoso, dein subdepresso, carnéo - rufescente squamuloso, lamellis distinctis incarnato-roseis farinaceis, stipite longo rigido, pileo concole. *Syn. fung.* p. 453. *Sowerb.* t. 208. *Flor. Dan.* t. 1249.

Agaricus amethystinus. *Bull.* t. 507. f. 1.

Ag. carneus et *rubellus*. *Schaeff.* t. 303. et 304.

Ag. rosellus et *subcarneus*. *Batsch.* *El. Cont.* 1.

p. 125. t. 19. f. 99. et 100. (juniores). *Ag. lac-*
catus. *Fries* p. 107. var. a.

Vulgaris, provenit per totum autumnum in sylvaticis, locis praesertim apertis, graminosis. Color in pileo, qui magnitudine est mediocri, variat pro aere sicco vel humido, dilutior aut opacior, imo aliquando livide rufescens: pileo tunc striato. Pileus subhemisphaericus, subtenax, saepius umbilicato-depressus, rarius umbo-natus, squamulis nunc sat densis, nunc obsoletis et fere evanidis obsitus. Lamellae sporulas copiosas albo-farinaceas in fungo adulto et exsiccatu secernunt. Sapor ingratus.

339. *conformis*, major subfragilis, pileo tenui depresso glaberrimo alutaceo-helvolo, lamellis tenuibus confertis subdecurrentibus palli-

dis, stipite glabro rufescente, radiculis fibrilosis.

Rarius mihi obvius fuit inter folia putrescentia. Forma et colore fere cum praecedente convenit, sed discrepat pileo laevissimo, ad tactum molli, lamellis densis, nec farinaceis, toto adnexis, stipite paullo crassiore farcto (deinde forte cavo), nulloque sapore, nisi parum raphanoideo distinctus.

340. *bacillaris*, solitarius, pileo submembranaceo - coriaceo flexili glabro fuscente - livido umbilicato, lamellis subdecurrentibus carneopurpurascensibus, nonnullis dichotomis, stipite longissimo substriato, deorsum incarnato.

Unicum huc usque, autumno praeterito, inveni specimen, ex quo tamen differentia hujus cum *A. farinaceo* elucebat, et vix ut varietas monstruosa considerari debet. Crescebat sub Betulis, inter gramina pinguia, mense Octobri.

Stipes (in specimine reperto) longitudine fere spithamea fuit, basi 4 lin. crassus, ibique albo - villosus, sensim attenuatus, cavus, pileo concolor. Lamel. subangustae, confertae, ad latera plicis transversis subprominulis distinctae, nonnullae simpliciter dichotomae. Pileus 2 unc. latus, margine laevis, zonis & obsoletis notatus, substantia rigida, sat tenax. Odor subraphanoides.

341. *succulentus*, subparvus, pileo subcarni-

fragili aquoso, lamellis confertis planis vel subdecurrentibus pallide incarnato-rufis, stipite breviusculo fibrilloso concopore.

Inventus initio Novembris in sylvis. Stipes cavus, aequalis, basi tegmine villoso terrae adnatus, $1\frac{1}{2}$ unc. altus, 2 lin. crassus. Lamel. angustae (lin. 1), tenues, non farinosae. Pileus obsolete umbonatus, pellucidus, demum plano-subdepressus, 1 - 2 unc. latus.

342. *demissus*, rufescens, pileo convexo submembranaceo striato, lamellis subdecurrentibus latis purpureis, stipite farcto brevi. Fries, p. 157.

In terra nuda montis sylvaticae, in Smolandia. Stipes glaber fusco-rufescens, uncialis fere. Lamel. distinctae, triquetrae. Pileus obtusus, demum leviter umbilicatus, 4 - 5 lin. latus.

343. *tetricus*, majusculus, pileo carnoso appalnato obtuse umbonato glabro subumbrino, lamellis confertis tenuibus, plurimis dichotomis albo-griseis, stipite subbreyi impure albicante.

In sylvula Romainville (prope Parisis) repertus. Stipes $1\frac{1}{2}$ unc. longus, 4 lin. crassus, aequalis, fragilis, demum cavus. Lamel. fere toto-adnexae, primo albae, dein dilute griseae vel gilvae. Pileus 3 unc. latus, circa umbonem, qui globuliformis et 3 - 4 lin. latus erat, rugulosus, margine fornicatus seu deflexus. Odor subanisatus.

dis, stipite glabro rufescente, radiculis fibrilosis.

Rarius mihi obvius fuit inter folia putrescentia. Forma et colore fere cum praecedente convenit, sed discrepat pileo laevissimo, ad tactum molli, lamellis densis, nec farinaceis, toto adnexis, stipite paullo crassiore farcto (deinde forte cavo), nulloque sapore, nisi parum raphanoideo distinctus.

340. *bacillaris*, solitarius, pileo submembranaceo - coriaceo flexili glabro fuscente - livido umbilicato, lamellis subdecurrentibus carneopurpurascens, nonnullis dichotomis, stipite longissimo substriato, deorsum incarnato.

Unicum huc usque, autumno praeterito, inveni specimen, ex quo tamen differentia hujus cum *A. farinaceo* elucebat, et vix ut varietas monstruosa considerari debet. Crescebat sub Betulis, inter gramina pinguia, mense Octobri. Stipes (in specimine reperto) longitudine fere spithamea fuit, basi 4 lin. crassus, ibique albo - villosus, sensim attenuatus, cavus, pileo concolor. Lamel. subangustae, confertae, ad latera plicis transversis subprominulis distinctae, nonnullae simpliciter dichotomae. Pileus 2 unc. latus, margine laevis, zonis & obsoletis notatus, substantia rigida, sat tenax. Odor subraphanoides.

341. *succulentus*, subparvus, pileo subecarni

fragili aquoso, lamellis confertis planis vel subdecurrentibus pallide incarnato-rufis, stipite breviusculo fibrilloso concolor.

Inventus initio Novembris in sylvis. Stipes cavus, aequalis, basi tegmine villoso terrae adnatus, $1\frac{1}{2}$ unc. altus, 2 lin. crassus. Lamel. angustae (lin. 1), tenues, non farinosae. Pileus obsolete umbonatus, pellucidus, demum plano-subdepressus, 1 - 2 unc. latus.

342. *demissus*, rufescens, pileo convexo submembranaceo striato, lamellis subdeurrentibus latis purpureis, stipite farcto brevi. Fries, p. 157.

In terra nuda montis sylvaticae, in Smolandia. Stipes glaber fusco-rufescens, uncialis fere. Lamel. distinctae, triquetrae. Pileus obtusus, demum leviter umbilicatus, 4 - 5 lin. latus.

343. *tetricus*, majusculus, pileo carnoso appallato obtuse umbonato glabro subumbrino, lamellis confertis tenuibus, plurimis dichotomis albo-griseis, stipite subbreyi impure albicante.

In sylula Romainville (prope Parisios) repertus. Stipes $1\frac{1}{2}$ unc. longus, 4 lin. crassus, aequalis, fragilis, demum cavus. Lamel. fere toto-adnexae, primo albae, dein dilute griseae, vel gilvae. Pileus 3 unc. latus, circa umbonem, qui globuliformis et 3 - 4 lin. latus erat, rugulosus, margine fornicatus seu deflexus. Odor subanisatus.

* * * * *. Color pilei griseus, cinereus, nigricans.
Lamellae non incarnatae, vel rubellae.

* Pileo squamoso et sericeo.

344. *Myomycetes*, gregarius; pileo carnoso umbonato squamoso griseo, lamellis subtruncato-adnexis stipiteque glabro albis, aut cinerascentibus. *Syn. fung.* p. 345-346.

Agaricus terreus. *Sowerb.* t. 76. *Schaeff.* t. 64. (mediocris). *Ag. argyraceus*. *Bull.* t. 423. f. 1. et t. 513. f. 2. (colore modo dilutiore differt.)

Non infrequens in sylvis, etiam in gramniosis, sub arboribus. Magnitudine communis. Stipes subsolidus, 2 unc. plus minusve longus; rarius squamosus et subbulbosus. (*Syn. l. c.*) Pileus, cum lamellis latiusculis, fragilis. Oder et sapor subfortis, ingratus.

B. albescens, minor, pileo circa umbonem subdepresso, minute squamuloso exalbido subfuligineo, lamellis subcrenatis albis, stipite tenui glabro, deorsum subfuligineo.

In viridario quodam, sub nonnullis Pinibus proveniens, repertus. Priore triplo fere minor, nec pileus ita manifester squamosus: umbone rotundato. Stipes duriusculus. Substancia firmior. Sapor fastidibilis, adstringens. Odor non peculiaris.

y. madreporius, rigidus fragilis, pileo cinereo-fusco-fibroso, stipite farcto pruinato niveo, lamellis dilatatis griseo-livescentibus. *Batsch.*

El. fung. Cont. 2. p. 53. t. 37. f. 203. (In pinetis.)

d. albogriseus, pileo subnitido albo - griseo, umbo rimoso - squamuloso, lamellis toto adnexis stipiteque glabro albis.

In sylvaticis. Stipes interne sericeo - nitens, 2 - 3 unc. longus. Pileus 1½ unc. latus, subdepressus. Odor ac sapor ingratus.

* *myosmus*, oolidus firmus, pileo sicco glabro subsquamuloso fusco - livido, lamellis emarginatis subdistantibus albidis, stipite solidq; inaequali (primo ventricoso). *Fries Syst. 1. p. 44. A. Myomyces.* (exclus. nonnullis synonymis.)

Agaricus fusiformis. *Schum. Saell. p. 318. Flor. Dan. t. 1729. A. saponaceus.* *Fries Obs. 2. p. 101.*

In Daniae ac Sueciae pinetis et fagetis.

"Valde variat. Odor murinus. Stipes compactus, dissectus hinc inde testaceo - rubens, extus fibrillosus, passim squamosus. Pileus subirregularis, 2 - 4 unc. latus, colore variat." Pileus, secundum Schumacher l. c., est sericeo - villosus, alutaceo - luteus, vertice rufus, dein subglaber, fusco - striatus, disco, aut uno latere rufo - maculatus. Lamel. pallidae. Stipes crassus, fusiformis, 4 unc. longus.

Obs. Ex descriptionibus allatis constat, hunc fungum non eundem esse, ac antecedentem. D. Fries quoque commemorat, var. (A.

albo-umbrinus. Schum. p. 337.) *lamellis luteis* distinctam, cuius "caro alba, fungo disseco, vero tota purpurascit, odor Raphanistri subaromaticus, et sapor haud ingratus." Schum. l. c. 345. *limniscius*, *submagnus*, *pileo carnosō applanato* (non *umbonato*), *subrepando villoso-cinereo*, *lamellis latis crassis albis*, *stipite sublongo cavo aequali*, *externe fibrilloso-crispato cinereo*.

Myomyces pedunculo lemniscato. Battar. p. 48. t. 17. f. D.

In sylvis Majani, in Italia, autumno prostat. Sapor farinaceus. Stipes rigidus, lemniscatis seu crispatis fibris externe compositus, et tenui medulla repletus. B. — Sepore farinaceo, pileo non *umbonato*, lamel. crassis a prima specie separandus videtur.

346. *Meleagris*, *gregarius*, *pileo planiusculo*, demum inciso, *squamis sparsis subnigrescentibus*, *lamellis (liberis?) subangustis albo-griseis*, *stipite solidō nigro*, *deorsum subin-crassato*, *radice densa fibrosa*. Sowerb. fung. t. 171.

Cresc. in caldariis super pulverem coriarium. Magnitudine et habitu cum A. *Myomyci* convenit, junior fungus totus niger. Ab auctore cum A. *clypeolario* Bull. comparatus, sed carne compacta differt. Radiculae subreticulatae. Exsiccando totus, stipite parte inferiore excepta, e caeruleo rubescit. (*Quoad ic.*)

347. *obscurus*, *parvus*, pileo subcarnoso convexo umbonato fuliginoso squamoso, lamellis latiusculis piano-adscendentibus olivaceo-fuligineis, margine dilutioribus, stipite solido longo fibrilloso. *Syn. fung. p. 347. Cont. Conspr. fung. p. 174.*

In Germaniae pinetis montosis lectus. Stipes pileo concolor, intus subrubescit, 3 unc. longus, 2 lin. crassus. Lam. crassiusculae. Pileus vix unc. latus.

348. *microlepidus*, *subsolitarius majusculus*, pileo sicco carnoso - membranaceo pallide fuligineo: umbone subobsolete obscuriore, squamulisque minutis obtecto, lamellis apice adnexis subtruncatis latis albis; stipite longo utrinque subincrassato glabro albido.

Provenit aestate post pluvias ad pedes arborum. Stipes aliquando spithameus, $\frac{1}{2}$ unc. crassus, solidus. Lamel. 4 lin. latae. Pileus 3 unc. latus, fere ecarnis, demum incisus. Sapor substypticus.

349. *subacidus*, pileo submembranaceo hemisphaerico subdepresso - umbilicato dilute livido, disco squamulisque minutis nigrescentibus, lamellis distinctis latissimis oblique truncatis candidis, stipite sublongo glabro albicante.

Rarus in sylvis ad terram. Stipes 3 unc. longus, 2-3 lin. crassus. Lamel. adnexae, dividiam unc. fere latae. Pileus 2 unc. et ultra

latus, elasticus, non umbonatus, sed subumbilicatus. Sapor acescens.

350. opicus, pileo obtuso sicco squamuoso griseo, lamellis emarginatis distantibus canis, stipite fibrilloso - squamoso cinereo. Fries

Syst. 1. p. 43. Ejusd. Obs. 2. p. 112.

In sylvaticis mixtis, autumno. Stipes 1½ unc. fere longus, 2-3 lin. crassus, fragilis. Lamel. ventricosae. Pileus obsolete umbonatus, ad 1½ unc. latus, junior sublaevis. Fr.

**gaussapatus, pileo obtuso repando sericeo-fibrilloso cinereo, lamellis emarginatis confertis griseis, stipite solidi fibrilloso candido. Fries l. c.*

Inter nemoria gramina, in Suecia. Stipes aequalis, 1-2 longus. Pileus leviter carnosus, junior campanulatus, 2-3 unc. latus: oris primo tomentosis. Lamel. liberae, 2 lin. latae. Odor et sapor nullus. loc. cit. Priori, etiam A.

myomyces, satis affinis videtur, tamen pileo non umbonato (?), margine ab initio tomentoso, lamel. liberis et saporis defectu discrepat.

351. relicinus, gregarius, pileo carnoso, conico expanso squarroso - tomentoso, stipiteque solidi fibrilloso fuligineis, lamellis adnexis lutescentibus. Fries l. c. p. 256.

In Sueciae sylvis abiagnis, inter Sphagna non raro, Jul. — Sept. Stipes 2 unc. longus 2 lin. crassus. Lamel. confertae, demum olivaceo-fuligineae. Pileus junior conicus, obtusus

sus, adultus expansus, uncialia. Fr. — An vere distinctus ab *A. lacero*?

352. *plumosus*, pileo subbarnoso hemisphaerico, stipiteque solido tenui longo squarroso-squamosis murinis, lamellis subliberis albidis. Fries. Bolt. fung. p. et t. 33.

Hab. in Angliae sylvis. Stipes aequalis, lin. 1 - 2 crassus. Pileus 1 $\frac{1}{2}$ una. latus.

** *Pileo glabro.*

353. *graveolens*; pileo carnoso crasso glabro fuligineo-cinereo subhemisphaerico, lamellis confertis emarginato-adnexis sordide albis, stipite solido subvilloso albido. Syn. fung. p. 361.

In locis graminosis crescit.

Ponderosus est, nec non sapore odoreque fortis distinctus. Stipes magnitudine mediocris, compactus, obsolete fibrillosus. Lamel. plano-ascendentes, confertae, aquose fuligineae, quarum plures breviores sunt. Pileus ultra 2 unc, latus, substantia compacta, 3-4 lin. crassa.

354. *adustus*, magnus carnosus, pileo dein subdepresso stipiteque glabro fuliginoso, lamellis crassis rigidis subpallescente-albis aut subglaucis. Syn. fung. p. 459. Consp. fung. p. 220. Fries Syst. 1. p. 60.

Agaricus nigricans. Bull. t. 370. f. a.

B. *elephantinus*, major albido-fuligineus, manus depresso, stipite brevi concolor, la-

med. crassis horizontalibus altis. Sowerby
t. 36. Bolt. t. 28. (In Anglia et Gallia).

Aestatis fine, praesertim post copiosas pluvias aestivales, in sylvis frondosis, etiam ericetis in tota fere Europa invenitur. Rigidus, inodorus, et subinsipidus, latitudine ultra palmari. Substantia compacta, rubescens; exsiccus. Stipes solidus, aequalis, crassus, brevis. Lamellae rigidae, emarginato adnexae, plures integrae. Color in omnibus partibus, ex albedo, griseo, pallescente variat, et in pileo lasso, aut exsiccando nigricat.

355. *consobrinus*, pileo carnoso subviscoso depresso griseo, lamellis pluribus dimidiatis candidis, stipite valido primo concolore, demum cinerascente. Fries. p. 60. Ejusd. Obs. n. p. 195.

Hab. in Sueciae abietinis. Sapor felleus acris (quo uti ob lamellas Russulis analogus). Pileus margine laevis, nec sulcatus, etiam olivaceo-griseus, 3 unc. latus. Lamell. nonnullae sunt farcatae, sed non venis convexae. Stipes aequalis spongiosus, unc. 1 altus.

356. *Millus*, pileo carnoso subumbonato fuscidente livido, lamellis circa stipitem solutis recurvatis, stipite aequali solidio strigosa. Fries. Sowerb. t. 184. +

Repettus hyeme in Anglia. Lamellarum forma, plane anomala, statum forsitan morbum indicat. Pileus glaber, demum depresso

et repandus, 2 - 3 unc. latus. Stipes fuscus, 2 - 3 unc. longus.

357. *canaliculatus*, pileo laevi glabro cinereo-livido, lamellis truncatis confertis luteis, stipite solido bulboso cinereo-striato. *Schum. Sacell. p. 331. Fries l. c. p. 46.*

Provenit in Daniae vagetis. Stipes brevis rapiformis albus, striis cinericeis. Lamellae angustissimae, sigmoideae; longiores postice truncatae, hinc canaliculam (spatium) circa stipitem efformant, seu a stipite remotae. Pileus carnosus, hemisphaericus convexus, primo globosus, 3 unc. latus. *Schum.*

358. *decastes*, subcaespitosus, pileo glabro inaequali cinereo, lamellis rotundatis albis, stipite solido albo pulverulento. *Fries l. c. p.*

49. *Ejusd. Obs. Myc. 2. p. 105.*

Habitat in Sueciae sylvis frondosis. Stipes aequalis ultra 3 unc. longus. Lamel. latiusculae, confertae, interdum emarginatae. Pileus saepe sinuatus, expallens, margine tenui. Fr. $\beta.$ *cinerascens*, gregarius, pileo convexo, primo albo, dein cinereo, lamellis liberis rotundatis griseis, stipite crasso laevi. *A. Mans. Flor. Agen. p. 580. Bull. t. 428. f. 2.*

In Galliae sylvis. Ex 4 - 5 individuis agrestis subcaespitosus. Stipes 2 - 4 unc. longus. Pileus totidem latus. Lamel. secedentes. *l. c.*

359. *nitratus*, rigidus nigrescente-umbrinus, pileo subcarnoso convexo-plano, lamellis *Sectio tertia.*

O

ventricosis distantibus subadnexis, stipite cavo subdifformi. *Syn. fung. p. 356.*

B. *A. murinaceus*, pileo subcarnoso difforme rimoso - squamuloso cinereo, lamellis collinitis distantibus stipiteque cavo difformi cinerascentibus. *Fries l. c. p. 176. Bull. t. 520. Sowerb. t. 106.*

Myomyces sulcis undulatis. *Battarr. p. 48. t. 19. f. A.?*

Rarior adest in locis graminosis montosis et muscosis. Stipes sublaevosus, unc. incrassatus. Lamell. in meo fungo pruinatae, et ex Sowerby osculatae; secundum Fries, crassae, albidæ, dein cinereæ. Pileus saepe rimosus primo campanulatus, subtenuis, saepius rimosus. Varietates numerosæ hujus speciei adesse dicitur, omnes tamen odore nitroso ad typum reduci possunt.

360. *tumidus*; pileo carnoso convexo - plano cinereo, lamellis distantibus latis candidis, stipite longo tumido. *Syn. fung. p. 350. Fries p. 48.*

Provenit rarius in Germaniae locis arenosis et in sylvis. Stipes plerumque irregularis, subventricosus, solidus, substriatus. Lamel. $\frac{1}{2}$ unc. latae. Pileus subinsipidus 3 - 4 unc. latus.

361. *multicolor*, magnus, pileo carnoso convexo - plano cinereo - fuligineo, lamellis subadnexis pallidis, stipite subbulboso fibrilloso - candido. *Syn. fung. l. c.*

In Germaniae sylvis, passim. Stipes farctus, 4 unc. longus, 1 crassus. Lamel. distinctae, rotundato - adnexae, unc. 1 latae. Pileus 4 unc. latus.

362. *amplus*, caespitosus, pileo subcarnoso convexo glabro nigrescente - fuligineo, lamellis confertis toto - adnexis aquose cinereis, stipite longo crassissimo glabro albo. *Syn. fung. p. 360.*

In pinetis, prope Gottingam, nascitur. Ab aliquibus a precedente non specie distinctus aestimatur, satis tamen differre videtur, stipite ad 6 unc. longo, et unc. 1 crasso, lamell. subdecurrentibus, quasi serrulatis, ad 3 lin. latis. Pileo 4-6 unc. lato, ita ut ad maximas Agarici species merito referri possit.

363. *humilis*, gregarius, pileo carnoso latissimo fuscescente, disco subdepresso obsolete squamuoso, lamellis confertis aquose cinereis, stipite brevissimo sursum incrassato cinerascente. *Syn. p. 360.*

Sero autumno locis provenit graminosis. Stipes subfarinaceo - tomentosus, solidus, unc. 1 longus, 4 lin. crassus. Lamel. subdecurrunt. Pileus compactus, 3-4 unc. latus, margine subrevoluto.

364. *pullus*, gregarius durus, pileo carnoso convexo - plano nigricante - livido, lamellis confertis adnexis stipiteque solido candidis. *Syn. fung. p. 349.*

Passim in sylvis. Stipes durus, 3-4 unc. longus, $\frac{1}{2}$ unc. crassus. Lamel. lanceolatae. Pilus 4 unc. latus, substantia subcompacta, demum subapplanatus. Sapor subdulcis.

Fungus parum dubius et forsitan non satis ab Ag. *pileolario* diversus. An A. Schumacheri. Fries, p. 87. alia species aut varietas?

365. *fumosus*, gregarius rigidus, pileo carnoso glabro, dein planiusculo, nigrescente-fuligineo, lamellis confertis adnexis stipiteque solidido fuligineo-albidis. Syn. fung. p. 348. *Ic. pictae* fung. fasc. a. p. 16. t. 7. Fries. Syst. p. 88-89.

Hab. in Germaniae et Sueciae sylvis frondosis et acerosis. Pileus 2-3 unc. latus, substantia rigida cartilaginea, subdifformis, secundum D. Fries: dein fit. cinereo-lividus; etiam occurrit rimoso-squamulosus et subexcentricus. Ab eodem autore quoque describitur *l. c. var. (Ag. polius)* 40-50 stipitibus basi in corpus carnosum connatis. Saporem mei fungi inveni amaricantem, qui in *Corresp. fung.* p. 175, si omnino ejusdem speciei, *mitis* indicatur.

* *virgatus*, pileo umbonato sicco griseo-nigro-virgato, lamellis emarginatis latis canis, stipe farcto striato albido. Fries *l. c.* p. 48. *Ejusd. Obs. 2.* p. 113.

"In Sueciae ericetis, sub pinibus et betulis frequens dicitur. Sapor felleus. Stipes 3 unc. longus, $\frac{1}{2}$ unc. crassus, aequalis, vel basi tube-

rosus. Pil. 2-4 unc. latus." — Antecedenti valde cognatus videtur, sed pileo umbonato striis nigris variegato, discrepat, etiam cum sequente comparandus.

366. *atrocinerous*, pileo carnoso obtuse umbonato cinereo, umbone nigrescente, lamellis albidis aquose emarginato-adnexis, stipite solo brevi glabro. *Syn. fung. p. 348.*

Hab. in Hercyniae pinetis. Stipes $1\frac{1}{2}$ unc. longus, 1 crassus, intus fibrosus. Pileus unc. 1 latus. Odor et sapor non ingratus.

367. *nycthemerus*, pileo carnoso obsolete umbonato e nigrescente demum fuligineo, lamellis horizontalibus emarginato-adnexis niveis, stipite pileo dilutiore, apice albicante et farinaceo,

Inveni hanc speciem Octobris fine in sylva Romainville, prope Parisios. Stipes, sublente inspectus, squamulis farinaceis, praesertim apice, obtectus.

Fungi magnitudo erat mediocris.

Pileus glaber. Lamel. confertae.

368. *cartilagineus*, pileo convexo cartilagineo margine sinuato pulverulento fusco-nigro, lamellis liberis cultratis (lanceolatis) albo-griseis, stipite crasso farcto albido fuscoque lineato. *Bull. — Vent. Hist. des Champ. p. 596. t. 589. f. 1. +*

In sylvis habitat solitarius. Stipes 3-4 unc. altus, unc. 1 crassus. Lamel. latae, distantes.

Pileus semiorbicularis, 3 - 4 unc. latus, carne crassiuscula nivea. *l. c.* — Haecce subdubia, uti videtur, species nunquam sese mihi obtulit, saltem sub tali forma, quali depicta est.

369. *umbrinus*, subcompactus elasticus, pileo carnoso late umbonato nigrescente - umbrino, lamellis confertis albis, dein subgriseis, stipite mediocri aequali albido - griseo.

In sylvis prope Parisios rarius inveni. Stipes 2 unc. longus, $\frac{1}{2}$ fere crassus, basi paullum latior, intus subcavo - floccosus. Lamel. subangustae, lanceolatae, 2 - 3 lin. latae. Pileus 3 unc. fere latus, in medio subumbonato crassus, intus albus, compactus. Sapor parum stypiticus. Forsitan tamen edulis.

370. *bafonius*, pileo rugoso umbrino subnigrescente, lamellis alutaceo - pallidis, stipite longo subtomentoso pileo concolore. *Syn. fung. p. 359.*

In Hercyniae pinetis crescit. Stipes 3 unc. longus, 2 lin. crassus. Lamel. subdecurrentes, subnitentes. Pileus obsolete umbonatus, unc. 1 latus.

371. *nitens*, *gregarius*, pileo subcarnoso convexo fuligineo - griseo, juniore nigricante subviscoso, lamellis latiusculis distantibus albis (subglauco - cinerascentibus), stipite subbrevi pileo concolore. — *Batsch El. fung. t. 33. f. 192.*

Ab auctore prope Jenam lectus in plano

montoso sterili, tecto gramine brevi, herbis et muscis siccis; etiam similibus in locis apricis cum inveni sub finem autumni,

Stipes elasticus, glaber, unc. $1\frac{1}{2}$ longus, 3 lin. crassus, in nonnullis individuis subcompresso, longitudinaliter canaliculatus. Lamel. crassiusculae, tantisper decurrent. Pileus $2 - \frac{1}{2}$ unc. latus, subtenax. Sapor acescens. Fungi juniores fere toti nigrescunt et subglutinosi erant.
 372. *compressus*, pileo subcarnoso planiusculo irregulari nigrescente-fusco, lamellis distantibus albis, stipite cavo compresso subconcoleore. *Syn. fung.* p. 363. *Sowerb.* t. 66. *Fries* p. 167. †

Hab. in Angliae et Sueciae graminosis, Jun. — Novembr. Stipes $2 - 3$ unc. longus, subtortus, fissilis. Lamell. rotundatae, fere liberae, latiusculae. Pileus $2 - 3$ unc. latus, pellucidus.

373. *cuneifolius*, pileo subcarnoso glabro fuligineo-livido, demum rimoso, lamellis ventricosis albis, stipite cavo deorsum attenuato, spice pruinoso pallido. *Fries Syst.* p. 117.

Agaricus cinereo-rimosus. *Batsch. El. Cont.* 2. t. 37. f. 206. *Ag. ovinus*. *Bull.* t. 580. a. b. ex auctore praecitato.

Locus graminosis sterilibus provenit. Species parva, fragilis, odore farinæ. Stipes raro aequalis, pallidus (ex Batsch. niveus et sericeo-nitens, subfibrosus). Lam. latissimæ, truncata-

tae subdecurrentes. Pil. unc. 1 fare latus, variat colore fusco, livido.

B. spurcus, pileo latiore subumbonato fusco, lamellis arcuato-affixis, stipite duplo longiore aequali glabro albido. *Fries l. c.*

In Scaniae nemoribus graminosis, campestribus.

374. *melaleucus*, pileo obtuse umbonato planiusculo fragili nigrescente-fuligineo, lamellis confertis subadnexis latiusculis albidis, stipite elongato basi incrassato glabro livido. *Syn. fung. p. 355. Fries Syst. 1. p. 114,*

In Germaniae et Sueciae pinetis, locis subhumidis praesertim et deustis. Stipes 2-3 longus, tenuis, basi subincrassatus. Lamel. emarginatae, subinde serratae. Pileus 2-3 unc. latus, siccus expallens, griseus, carne aquoso-spongiosa.

B. porphyroleucus, pileo campanulato-expanso fuligineo-purpurascente, lamellis albidis, stipite farcto fibrilloso. *Fries l. c. p. 115.*

Locis montosis, inter gramina. Firmior antecedente. Stipes albidus, 4 lin. crassus.

B. polioleucus, pileo griseo-livido, lamellis sorride albis, stipite subfarcto brevi, apice albidu-pruinato. *Fries, l. c.*

In regionibus depressis, campestribus, locis graminosis. Stipes 2 unc. longus, aequalis, 2-3 lin. crassus. Lamel. latae.

375. *humilis*, *gregarius*, pileo carnoso latissi-

mo fuscescente, disco subdepresso, lamellis confertis aquose cinereis, stipite brevissimo farcto subincrassato tomentoso - pulverulento.

Syn. fung. p. 360.

Provenit serius, locis graminosis. Stipes farctus, uncialis, 4 lin. crassus. Lamel. subdecurrunt (rotundatae ex Fr.) Pileus compactus, saepius obsolete rimuloso - squamulosus, 3-4 unc. latus, margine subinvoluto; in fungo suecico, etiam repandus et nonnunquam umbonatus, coloreque variat nigricante, fusco, livido, pallido, flavescente, fragili, et stipite fibrilloso; nisi aliae species aut varr. notabiles cum hac confusae sint.

B. oreinus, pileo convexo glabro fusco-livido, lamellis liberis albis, stipite solido pallido, apice albo-pulverulento. *Fries Syst. 1. p. 52.*

Ejusd. Obs. 2. p. 111. †

In montibus ericetosis Hallandiae in Suecia. Minimus, sed sat firmus, stipite unciali, basi incrassato, pileo obtuso unciali. *I. c.*

376. brevipes, subgregarius, pileo carnoso convexo plano subrepando fuligineo, seu dilute umbrino (juniore nigrescente), margine dilutiore, lamellis confertis toto-adnexis impure albis, stipite farcto brevissimo glabro subexcentrico. — *Bull. Hist. p. 594. t. 521. f. 2.*

Hab. autumno subsero ad vias, in ambulacris sub arboribus. Stipes $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ unc. longus, $\frac{3}{4}$

unc. crassus, aequalis, pileo concolor. Lamel. densae, lanceolatae, tenues, interdum obsolete decurrent. Pileus 3 unc. latus, medio satis carnosus, ceterum substantia tenui. Totus fungus fragilis, subhumidus, odore parum ingratus, et sapore subadstringens.

$\beta?$ *curtipes*, pileo obtuso laevi griseo, lamellis adnatis confertis albis, stipite solido brevi, extus intusque fusco. Fries Syst. 1. p. 88.

In Scania campestris, locis graminosis. Octobr. — Nov. Stipes vix uncialis, 2 - 3 lin. crassus, rigidus, testaceo - fuscescens, subinde fibrillosus. Lamel. latiusculae, ob formam pilei subdepressam, parum decurrent. Pileus 2 - 3 unc. latus. l. c.

377. *testudineus*, subsolitarius magnitudine mediocris, pileo carnoso convexo, dein appalato glabro subgriseo - fuscescente, lamellis emarginatis subadnexis, stipiteque farcto brevi albicantibus. Tab. XXIII. fig. 1 et 2.

Ad terram inventus. Stipes satis crassus, aequalis, subfibrillosus, apice farinaceo - flocculosus. Lamel. confertae, subcrenatae, in pilei ambitu latiores. Pileus ad summum 2 unc. latus, opacus, interdum latus fere depresso: margine erecto. Sapor subvirosum.

378. *molybdeus*, subparvus, pileo carnoso hemisphaerico griseo - plumbeo, lamellis confertis densis ex albo sublivescentibus sublibe-

ris, stipite solido aequali brevi subfarinaceo fuligineo-albo.

Eodem in loco lectus ac antecedentis, a quo tamen non paucis notis aberrat. Stipes clasticus, duriusculus, intus nitens, unc. 1 - 1½ alatus, 2½ lin. latus. Lamel. confertae, aquoso-griseae, rotundatae, secedentes, 2½ lin. latae. Pileus biuncialis fere, carne compacta, ad ambitum fere ecarnis. Odor nullus sed sapore gratus Ag. campestris, hinc ab Ag. *fumoso* vel *humili*, nec non a priore diversus aestumari debet.

379. *myochrous*, magnitudine medioeris subparvus, pileo carnoso convexo-plano griseo, lamellis subemarginatis adnexis, nonnullis ex basi simpliciter dichotomis, stipite brevissimo solido deorsum subtenui.

Raro in sylvis. Stipes vix uncialis, lin. 1 - 2 crassus, griseus. Lamel. subangustae, ultra lin. latae. Pileus unc. 1½ latus, carne compacta immutabili, pallescit praesertim ad marginem. Odor nullus et sapor non ingratus.

stilbopus, parvulus, pileo hemisphaericō umbonato plano nitente-murino, lamellis confertis subemarginatis remotis nigris, stipite sublongo aequali tenui griseo-nitente.

In sylvis. Species sat elegans. Stipes 2 unc. longus. Pileus unc. 1 latus, exsiccando praesertim nitet.

380. *leucophaeus*, magnitudine mediocris, pileo subcarnoso planiusculo fuligineo-nigres-

cente disco late, sed obsolete umbonato obscuriore, lamellis densis latiusculis candidis, stipite solidō subelongato glabro fuligineo, basi tuberoso.

In sylvis, hortis etc. non raro. Stipes plerumque biuncialis, a lin. crassus, elasticus, demum subtortus, sed parum sensibile. Lamell. subventricosae, planae, sed lineatim subdecurrent, incolorantes. Pileus unc. $1\frac{1}{2}$ latus, parum modo carnosus, ad tactum mollis. Sapor subraphanoides, aut parum adstringens. Variat: lamellis emarginato-adnexis, stipite aequali apice minutim squamuloso et major, pileo subgriseo et stipite fere albido.

Obs. An huc trahendus Agar. Placenta Batsch. *El. fung.* t. 5. f. 18.? Nec plane differt Ag. *adstringens* Syn. *fung.* p. 350 et 351.; sed in pluribus individuis et diverso tempore collectis, lamellas dein rubescentes, ut in ceteris *Hyporhodiis*, nunquam inveni, hinc praevius eum hoc loco enumerare vellem, vix tamen ut speciem distinctam; nam praeter colorationem lamellarum, quod ab aliis causis pendere potest, de cetero parum differt ab A. *adstringente*.

381. *trochoeus*, subparvus, pileo convexo-plano obscure griseo subnigrescente, lamellis angustis subdecurrentibus ex albido griseis, stipite farcto subfurfuraceo-squamuloso. Tab. XXVII. fig. 4. (junior) et Tab. XX. fig. 3. (adultus).

Crescit ad sepes hortorum, in dumetis. Junior tubaeformis, stipite tunc sursum incrassato, qui in adultis aequalis est. Lamel. confertae, etiam totae albae. Pileus carnosus, uncialis.
 382. *tephrophillus*, pileo submembranaceo minute umbonato griseo, lamellis planis subliberis cinereis, stipite longo fistuloso, basi villoso, pileo concolore.

In sylvis passim, Octob. Stipes elasticus, saepius compressus, 3 unc. longus, vix lin. crassus. Pileus unc. 1 latus, planus, applanatus. Lamel. subconfertae, 1½ lin. laetae.

383. *obolus*, pileo laevi livido, lamellis adnatis confertis stipiteque aequali striato dilutioribus. Fries Syst. 1. p. 89.

In Sueciae pinetis ericetosis subgregari crescit. Stipes 2 - 3 unc. longus, 2 lin. crassus, glaber, lividus. Lamel. planae, distinctae, albo-lividæ. Pileus convexo-planus, obtusus, 1½ unc. latus. Fr.

384. *subpulverulentus*, solitarius parvus, pileo plano-depresso opaco subpulverulento griseo, lamellis adnexis latiusculis candidis, stipite substriato mediocri pileo concolore.

In horto botanico Parisiensi sub pinubus lectus. Stipes 1½ unc. longus, 2 lin. crassus. Lamel. subconfertae, convexae. Pileus 1½ unc. latus, laevis.

385. *leptocephalus*, totus dilute cinereus, pileo tenui subumbonato repando sulcato, la-

mellis crassiusculis obscurioribus, stipite subbrevi glabro. Syn. fung. p. 381. Ic. et Descr. fung. Fasc. 2. p. 48. t. 12. f. 4.

In Germania ad truncos provenit. Pileus submembranaceus opacus, medio subcarnosus, unc. 1 latus. Lamel. subemarginato-adnexae, obscure cinereae, nitidae, margine albicantes. Stipes cavus, & unc. longus, & lin. fere crassus. Odor nitrosus, et sapor ingratus.

* *caesi*s, parvulus, pileo carnoso obsolete umbonato, lamellisque rotundatis leviter adnexis caesiis, stipite cavo subfuligineo purpurascente.

In sylvis rarus adest. Stipes & unc. fere longus, $1\frac{1}{2}$ lin. crassus. Lamel. & lin. latae, non venis connexae (?) Pileus $\frac{1}{4}$ unc. latus, opacus, laevia, non pellucidus, qua de causa non ut mera Agarici *rosei* Bull. varietas habendum est hic fungus, et ab A. *janthino* Batsch (var. *rosei* seu *puri*) valde diversus, forsitan quoque a var. ♂ in *Synopsi* p. 359., cuius lamellae albae sunt, differt.

¶¶¶¶¶ *Pileo carnoso aut subcarnoso violaceo, purpurascente, aut decolorando fuscescente, subincano. Lamellis etiam violaceo-purpurascensibus, passim albis, fuscescentibus, sporulis plurimisque albicantibus obtectis.*

386. *bicolor*, pileo carnoso convexo violaceo-fuscescente, margine involuto tomentoso, la-

mellis subliberis stipiteque crasso bulboso tomentoso violaceis. *Syn. fung. p. 281.*

Agaricus violaceus. Sowerb. t. 209. *Flora Dan. t. 1133.* *A. personatus.* Fries, p. 50. *A. bulbosus.* Bolton t. 147.

Nascitur in sylvis, graminosis, passim in hortis; in Europa boreali non infrequens. Stipes brevis, validus, uncialis, junior magis villosus. Pileus pulvinatus, plerumque 2-3 unc. latus, sed interdum satis extensus, ex D. Fries colore variat violaceo, lilacino, hepatico, livido et albido. Laniel. 2-3 fin. intactae, etiam incarnatae, confertae, rotundatae.

Obs. Primo obtutis uni alterive speciei & divisione *Corthariae* ob colorem et habitum (quod etiam de sequente vales) refert, sed vel omnino destitus est et spotulas albidas, nec ferrugineas habet.

387. *nudus*, (*nutabilis*), pileo carnoso hemisphaericо violaceo, fuscescente, glabro, lamellis subemarginato-adnexis, stipiteque fibriloso-farinaceo violaceis. — *Bull. t. 439.*

Consp. fung. p. 152. *Fries Syst. 1. p. 52.*

Autumno vulgaris in sylvis acerosis et frondosis, etiam in hortis, praesertim sub pinibus, provenit. Forma et colore variabilis, nonnunquam pileus totus depresso evadit, interdum umbonatus invenitur. Stipes aequalis, aliquando etiam bulbosus; in Suecia totus glaber occurrat. Pileus, aere sicco praesertim, rufescit,

margine glabro, nec involuto, uti in antecedente. Sequentes varietates adnotari merentur.
caeliochrous, solitarius, stipite bulboso, lamellis albicantibus.

Inter muscos, semel inventus. Vulgariter paullo minor. Stipes subelongatus, fere glaber. *β. aggregatus*, caespitosus fragilis, pileo applanato subdepresso rufescente, lamellis primo dilute purpurascens, dein pallentibus, stipite brevi subcrasso, basi tuberosa tomentosa, subspadiceo. Inveni, mense Decemb. sub fruticibus, ubi multa individua, stipitibus basi subcohaerendibus caespitem efficiebant densum. Stipes 1. - 1½ longus, ¼ unc. crassus, glaber, sed basi tomento sat denso seu compacto, colore gilvo-vestitus. Lamellae rotundato-adnexae, conformatae. Pileus glaber, 2 - 3 unc. latius, humidus valde fragilis. Odor fere aniseus, sed sapor fastidibilis.

388. sordidus, caespitosus, pileo obtuse umbonato glabro umbrino-fusco, lamellis rotundatis dilute violaceis, stipite solidissimo laevi subbulboso. Fries p. 51. Schum. Saell. 2. p. 341.

In Dania repertus, locis stercoreatis. Stipes 2 unc. longus et ultra, 3 - 4 lin. crassus, pileo concolor, apice dilatatus. Lamel. liberae: Pileus carnosus, demum explanatus, subrepandus, margine subinvoluto obscuriore, carne dilute violacea. S.

389. *purpureus*, subparvus, pileo carnoso convexo - plano violaceo - purpureo, lamellis emarginato - adnexis confertis candidis, stipite brevi aequali, pileo concolore.

A. purpureus, pileo hemisphaericō purpureo, lamellis trifidis albīs, stipite purpureo. *Bolton p. et t. 41.* (bona).

B. ionides, stipite pleno nudo striato; pileo roseo - vinoso; lamellis falcatis, basi elongato - rostratis plerumque liberis. *Bull. -- Vent. Hist. des Champ. p. 557. t. 533. f. 3.*

Autumno, circa Parisios, in sylvis non rara est pulchra haec species, plerumque solitaria, sed aliquando 2 - 3 individua aggregata inventantur. Stipes solidus, subtenax, uncialis, 3 lin. crassus. Pileus ab initie hemisphaericus, demum planiusculus, tunc obsolete umbonatus, 1½ unc. latus. Lamel. subdecurrunt niveae. Odor et sapor virosus.

390. *carneus*, solitarius parvulus, pileo subcarnoso rubescente, lamellis toto adnexis candidis, stipite firmo glabro, pileo concolor. -- *Bull. L. c. p. 666 t. 603. f. 1.*

B. carneus, pileo subcarnoso laevi carneo - rubro, lamel. adnexis candidis, stipite subfascato brevi squamuoso. *Fries p. 130.* (In pictoris).

In sykvis rarissime crescit. Stipes colore paulo dilutior, uncialis. Pileus obscure incar-

Sectio tertia.

P

natus, subincurvatus, demum applanatus, carne firma, niveo. Species subdabia.

391. *geophilus*, gregarius parvus, pileo campanulato dilute violaceo fuscescente, lamellis adnexis argillaceo-fuscescens (subcinnamomeis), stipite aequali tenui, pileo concolor. *Syn. fung.* p. 340. *Sowerb. fung.* t. 324. *Bull. Hist.* p. 546. t. 569. f. d. (colore subvariat).

Autumno in sylvaticis subhumidis ad terram, saepe in consortio Ag. *argillacei* adest, a quo constanter differt celbre, paulloque minor est. Stipes $\frac{1}{2}$ unc. longus, lini. 1 - $1\frac{1}{2}$ crassus, cortina fugacissima aliquando cinctus. Lamellae suberectae, secedentes. Pileus parum carnosus, $\frac{1}{2}$ uncinatus, expallens, etiam rufescens uti Ag. *nudus*: — Vix celbre multo dilutiore, lamell. planis emarginato-adnexis, primo griseis, dein aquose cinnamomeis. Sequens varietas tamen seorsum adnotari meretur:

B. polychroa, solitarius, paleo carnoso umbonato planipuculo fibrilloso fusco-griseo, umbo umbrito, lamellis consertis teto-adnexis purpureo-griseis, stipite farcto fibrilloso dilute purpureo.

In umbrosis rarius. Stipes subincurvus, 1 - 2 unc. longus. Lamell. planae, nec adscendunt, latiusculae, juniores aquose purpureae, adultae margine albantes. Pileus juniori

rinus, subcanescens, non violaceus. Sapor substypticus.

392. *incurvus, solitarius, pileo carnoso umbonato dilute violaceo, lamellis emarginato - annexis caesio - violaceis, stipite subtomentoso radicato, basi incurvo. Syn. fung. p. 342. Ic. et Descr. fung. p. 23. t. 7. f. 5.*

Inter folia decidua crescit Ag. *phylophilii* ad instar. Stipes basi pallidus, 2 - 3 unc. longus, et totidem lineas crassus. Pileus subumbonatus, glaber, subflexuosus, 1 - 2 unc. latus.

B. monochrous, totus dilute violaceus, pileo obtuso (vix umbonato), lamellis toto - adnexis, stipite subsericeo, basi incurvo.

Circa Parisios repertus. Lamel. dente subdecurrunt.

393. *eumorphus, pileo carnoso subhemisphaericamente canescente dilute violaceo, dein fuscescente, lamellis subdecurrentibus violaceo - agarriaceis, stipite elongato albido - violaceo. Syn. fung. p. 340.*

In Germaniae fagetis. Stipes fragilis, 3 unc. longus, 3 lin. crassus. Lamell. horizontales, serrulatae. Pileus forma grata distinctus, 3 unc. fere latus, mollis.

394. *amethysteus, pileo subcarnoso firmo subdepresso purpureo - violaceo, demum canescente, lamellis distantibus violaceis, dein ferrinaceis, stipite cavo longo fibrilloso conco-*

lore. *Syn. fung.* p. 465. *Bull.* t. 570. f. 8.

Sowerb. t. 187. *Schaeff.* t. 13. *A. laccatus.*

Provenit in sylvaticis umbrosis, aut ad terram, aut in truncis cariosis, subsolitarie.

Ag. farinaceo, cui cognatus, multo rarer est, a quo etiam differt, praeter colorem pulchre violaceum, pileo non squamuoso, et substantia tenaciore. Stipes longitudine variat, plerumque tamen 4 - 5 unc. longus, nunc crassitudine ubique aequalis, nunc superne attenuatus, nunc totus farctus, aut apice excavatus, basi incurvo-flexuosus villoque purpureo foliis siccis adhaeret. Lamellae crassae, violaceo-caerulecentes. Pileus fere ecarnis, sed non fragilis, aliquando striatus, et subpellucidus, unc. 1 - 1 $\frac{1}{2}$ latu s .

B. ioides, solitarius totus violaceo-purpureus, pileo hemisphaericō convexo, non umbilicato glaberrimo, lamellis confertis emarginato-adnexis, stipite elongato aequali fibrilloso-farinaceo.

Semel a me repertus in sylvis autumni initio. Stipes farctus, elasticus, 3 unc. longus, 2 - 3 lin. crassus, basi subincrassatus. Pileus laevis, rigidus, unc. 1 $\frac{1}{2}$ latus, 4 lin. altus, siccus expallescit. — Ab antecedente, quocum colore et habitu convenit, differt pileo glabro, lamellis, quae etiam subtepandae.

y? purpurellus, exiguus, pileo minuto umbo-nato pallido canescente, lamellis subemargi-

natis purpureo-violaceis, stipite brevi fibriloso pallescente.

Et hunc fungum, forsitan specie diversum adhuc unica vice solummodo legi. Stipes 1½ unc. longus, lin. 1 crassus, aequalis. Lamel. satis latae. Pileus magis carnosus, glaber, 4 lin. latus.

†††††. *FIMBRILLA*. *Pileus subcarnosus. Lamellae, plurimum, basi venoso-conjunctae, margine fimbriis seu floccis dentiformibus appendiculatae.* (Calodontes Fries Syst. 1.)

395. *pelianthinus*, pileo striato convexo livido purpurascente, lamellis arcuato-adnexis purpureis nigro-dentatis, stipite aequali fistuloso. Fries l. c. p. 110.

Agaricus denticulatus. Bolt. t. 4. f. 1. Syn. fung. p. 423.

Hab. in Anglia, Gallia et Suecia, in quer-
cetis. Stipes firmus, glaber, albicans, 2 - 3 unc.
longus. Lamell. subdistinctae, ad latera nigro-
punctatae, margine fimbriis nigris dentatae. Pi-
leus semiglobosus, fragilis, expallens.

396. *crenulatus*, pileo carnoso subviscido stria-
to purpurascente - badio, lamellis crenulatis
latissimis, stipite fistuloso. Fries. Schum.
Saell. p. 293.

In Daniae pinetis muscosis crescit. Stipes
sublongus, aequalis, subfibrosus, basi attenua-
tus. Lamel. adnatae, triquetrae. Pileus 1 - 2
unc. latus, carne purpurascente. Schum.

* *denticulatus*, pileo subcarnoso viscoso umbrino, lamellis latis rotundato-adnatis denticulatis, stipite longo aequali fusco. Schum. p. 327.

Iisdem in locis, in Dania, occurrit. Stipes 4 unc. longus, 2 lin. crassus, fibrosus. Lamel. laxae, umbrinae. Pileus 2 unc. latus, primo convexus, dein explanatus subdepressus umbrino-badius, carne fusco. Schum. — Ab antecedente vix specie diversus videtur.

397. *pristoides*, pileo campanulato obtuso incarnato-livido, lamellis decurrentibus pallidis, margine purpureo, stipite fistuloso stri-goso, basi incrassato. Fries, p. 113. +

Prov. in Sueciae truncis abietinis. Simillimus Ag. *rubro-marginato*, sed pileus laevis, stipes firmus et lamel. ut in congeneribus. Fr.

398. *marginellus*, (Persoonii), pileo subcarnoso campanulato albido-umbrino, lamellis arcuato-adnexis, margine fimbriato-umbrino, stipite subtuberoso piloso. Syn. fung. p. 309.

In Germaniae truncis abietinis. Stipes nitidus, $1\frac{1}{2}$ unc. longus, lip. 1 crassus. Pileus $\frac{1}{2}$ unc. latus.

399. *Schumacheri*, pileo carnoso campanulato laevi olivaceo-fusco, lamellis attenuato-adnexis, pallide virescentibus, margine aurantiaco, stipite strigoso.

A. *marginatus*. Schum. p. 298. A. *aurantio-marginatus*. Fries l. c. p. 113.

Hab. in Daniae et Sueciae pinetis. Stipes
fusiformis, basi ventricosus. Lamellae ventrico-
sae.

* * * * * *Chlorophanus*. Pileo glabro, pa-
noram carnosus, ascendente, tenuis, distans.
ad eum differt in lamellis, versu, in stipite, in capite
illarum alternatis, et venoso - convexis. Plerumque
terrestres, viscosi, subserotini, locos gremi-
nos, muscosos et subhumidos, inhabitant.
Cultiva.

* * * * * *Pilea cingulata*. Invenitur in
aeris irrigatus, pileo campanulato, lavidis, hu-
midis (subviscoso), lamellis distinctis arcua-
tis, stipiteque elongato albidis. Ita syno fung.
Fries. Alliaceae, venosa, in arboribus rufi.

A. irrigatus, pileo campanulato, laevi, utri-
piusque aequali, viscoso - lavidis, lamel. distinc-
tis, formicatis albidis. Fries Syst. p. 103.

In pinetis Gotianis, et in Sueciae pratis.
Stipes cavus, 2 unc. longus, 3 lin. crassus. La-
mellae subdecurrentes, 2 - 3 lin. latae. Pileus sub-
umbonatus, unc. latus. Ag. exo. 10, 10, 10, 10, 10
xix. Ag. virginea proximus exo. 10, 10, 10, 10, 10
non ita decurrentes, nec pileus planus depresso
et margine striatus fit, ut in nominato fungo.

* * * * * *unguinosus*, pileo campanulato obtuso la-
vini stipiteque inaequali glutinosis lavidis, la-
mellis adnatis venoso - convexis albis. Fries

10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10
In Scaniae metioribus graminosis, humi-
dis. Stipes cavus, utrinque subattenuatus, in-

terdum flexuosus, biuncialis, 3 lin. crassus. Lamel. ventricosae, distantes. Pileus ultra uncialis. l. c.

** *Pilea flavescente, virescens.*

401. *sciaphanus*, subtestaceus, pileo convexo obtuso humido, margine striato, lamellis decurrentibus distantibus, stipite cavo aequali laevi. *Fries p. 102. Flor. Dan. t. 1825. f. 2.*

In Sueciae et Daniae graminosis. Affinis *A. pratensi* (*ficoides*) dicitur, nihilominus est medius inter *A. psittacenum* et *Idetum*, qui vix ullam habent affinitatem cum specie citata, nisi loco natali. Color sordide fulvescens. Pileus leviter carnosus et viscosus, uncialis. Stipes 1½ unc. longus. *Fr. luteo pallidus.*

402. *laetus*, pileo convexo-plano viscoso flavo, lamellis distantibus decurrentibus incarnatis, stipite longa subtenace, pileo concolore. *Syn fung. p. 334. Fries l. c.*

In pratis montosis provenit. Stipes dilato fulvus, apice purpurascens, pariter viscosus. Pileus subcarinosus, exsiccando striatus fit, vix unc. latus.

* *Cauvinii*, gregarius parvus glutinosus carneofuscus, pileo plano tenace subumbilicato, lamellis distantibus subdecurrentibus, stipite cavo.

In Galliae (Mans) graminosis. Pileus 2-3 unc. latus. Stipes 1½ longus, vix lin. crassus. Ex pluribus speciminiibus siccis a D. Cauvin

transmissis, quae aqua humectata, colorem indicatum praebuerunt. Habitum antecedentis, an ejus var.?

403. *psittacinus*, gregarius parvulus totus viscosus, pileo umbonato stipiteque flavo viridiisque vario, lamellis aureis. *Syn. fung.* p. 336. *Schaeff.* t. 301. *Sowerb.* t. 82.

A. chamaeleon, carne viridiuscula vel rosea, pileo luteo et sensim virescente, lamellis adnexis, pileo concoloribus. *Bull. Acad. Vent. Hist.* p. 562. t. 545. f. 1.

Hab. inter gramina, in sylvis et ericetis. Stipes elasticus, apice praesertim viridis. Lamellae leviter adnatae, crassiusculae, juniorum etiam virides, s. prasinac. Pileus exsiccando saepius etiam nigrescit.

404. *ceraceus*, totus laete flavus humidus, pileo fragili subcarnoso convexo-plano, lamellis emarginato - adnexis dilutioribus, stipite demum cavo fissili. *Jacq. Misc. austr.* 2. p. 105. t. 15. f. 2. *Sowerb.* t. 20. (stipite nimis longo.) *Grevill. Flor. Edinens.* p. 877. ? (Stipes inaequalis. Lam. decurrentes).

A. ceraceus, pileo convexo-plano viscoso substriato luteo, lamellis adnato-decurrentibus distantibus stipiteque subinaequali flavus. *Fries Syst.* p. 102. ? (Ob lamellas, cet. differt).

A. chlorophanus, pileo submembranaceo convexo striato viscoso stipiteque aequali laevi

*flavis, lamellis adnexis albidiioribus. Fries p. 105.
Ceratocerasus videtur. Inter muscos.*

*B. laceratus, luxurians, stipite denuo fisco et
inflexo. Syn. fung. p. 387. narr. Weiss. Bol-
ton. t. 68. Capitulum oblongum oblique
Grescit in graminosis, ericetosia, adversu-
ras sylvarum. Juniores, aut durante aere humili-
do, magis viscosi sunt. Lamell. distinctae. Pi-
leus unc. 1 latus, in juvenili fungo aliquando
umbilicatus.*

*405. obrusseus, aureo r. luteus, pileo expanso
laevi sicco flavo-lucido, lamellis adnatis ven-
tricosis, stipite crasso compresso. Fries p.
104. Battar. p. 51. t. 19. f. D.*

*In nemoribus graminosis. Stipes & unc. fe-
re longus, non crassus, cavus. Lamel. crassae,
transversim venosae. Pileus fragilis, saepe in-
aequalis, humidus, 2-4 unc. latus. Fr.*

*406. conicus, pileo acute conico subviscoso
(longitudinaliter striato) aurantio aut flaves-
cente, lamellis erectis liberis flavidis, stipi-
te longo aequali concolore. Syn. p. 535.
Schaeff. t. 2. Fries, p. 103.*

*Agaricus croceus. Bull. t. 524. f. 3. A. au-
rantius. Bolton. t. 67. f. 2. Sowerb. t. 381. A.
Hyacinthus. Batsch. El. t. 7. f. 28. (Havescens).*

*In pratis sylvaticis, muscosis fere ubique.
Species sat pulchra; sed mutabilis praesertim in
colore; aliquando tota fere nigrescit; (vid.
Schaefferi ic. f. 9. et Bull. ic. cit. fig. M. et N.)*

Stipes lutescit, dein subtortuosus. Lamel. ventricosae, in pilei ambitu latiores, etiam flavescente-lividae. Pileus fragilis, rufo-aurantiacus, dilute flavus, fuligineo-pallidus, etiam spadiceus a me visus, fractus lactescit succo flavo. 407. *coccineus*, gregarius nitens, pileo hemisphaericо subviscoso coccineo, lamellis distantibus venose convexis flavescentibus et subglaucis, stipite compresso coccineo. *Syn. fung.* t. 334. *Schaeff.* t. 302. *Fries* p. 105.

Agaricus coccineus. *Bull.* t. 570. fig. 2. *A. kermesinus*. *Flor. Dan.* t. 715. *A. miniatus*. *Scop. carm.* p. 442.

In pratis, locis graminosis apricis, passim in sylvis, crescit. Magnitudine variat, parum et colore; siccus expallens, etiam pileo depresso obvenit, nec non umbonato. Sequentes, ut videtur, merae varietates, commemorari interea merentur:

a. *fulvus*, pileo umbilicato stipiteque compresso fulvo, lamellis distantibus subdecurrentibus aurantiis. *Obs. Myc.* 2. p. 50.

b. *discolor*, minor, flavo-coccineus, pileo hemisphaericо disco plano, lamell. arcuatissimis toto adnexis albis, stipite subviscoso elongato coccineo.

Elegans. Stipes tenax, $1\frac{1}{2}$ unc. longus. Lamel. subdecurrent, demum flavescent. Pileus 4 lin. latus. Inter muscos repertus in sylvis. Fortitan *A. coccineus*, junior.

y. umbilicatus, minor, pileo umbilicato ligneo-flavo, lamel. subdecurrentibus, stipite tortuoso tenuisculo subtenace.

Obs. D. Fries in suo libro saepius citato sequentes ab *A. coccineo* diversas considerat, quas breviter transscribere vellem, ut ab aliis examinari aut confirmari possint:

* *puniceus*, pileo campanulato obtuso lobato aurantio-coccineo, lamellis adfixis adscendentibus flavis, stipite crasso ventricoso, basialbo. *Fries. Syst.* p. 104.

A. aurantius. *Flor. Dan.* t. 833. f. 1. (erronea). *A. rigidus*. *Bolton.* t. 43. (mala). *A. coccineus*. *Bull. t. 202.* (multo minor). *Nota*, haec figura a Bulliardo ipso in *Ej. Hist.* p. 560. cum tab. 570. f. 2. *A. coccineo* conjungitur.

Stipes, quoad auctorem, apice saepe squamuosus, flavescens, aut pileo concolor. Pileus humidus subviscosus, dein siccus, expallens. Lam. variant albo-flavae et basi purpurascentes (ut in *coccineo*, a quo solummodo ob stipitem removetur).

* *miniatus*, pileo convexo sicco, demum umbilicato stipiteque subfarcto aequali tereti miniatiss., lamellis simpliciter adnatis distinctis lutescentibus. *Fries. L. c. p. 105.*

A. glutinosus. *Flor. Dan.* t. 1009. f. 2. *A. flammeus*. *Scop. Carn.* p. 443. *Fungus parvus coccineus*. *Vaill. Botan.* p. 66. (qui a Bulliardo ad *A. coccineum* allegatur).

In sylvis, locis graminosis, frequentur tamen paludosis. Medius inter coccineum et laetum. Stipes biuncialis, lin. 1 crassus, laevis - spicem demum cavus. Pileus vix unc. 1 latus; non vere viscosus, expallens. Lamel. non venis convexae, flavo-miniatæ, etiam luteæ. — An A. coccineus, junior? aut var. A. conici?

††††††† Mycena. Pileus membranaceus aut subcarnoso - membranaceus, margine plerumque sulcato - striatus, uplurimum conico - campanulatus, cum lamellis exsiccus marcescens. Stipes fistulosus, generatim elongatus. Lamel. plerumque adnatae).

* Pileo roseo, rubro, purpurastente, et rufescente.

408. *purus*, & *roseus*, subsolitarius major, pileo carnoso - membranaceo campanulato, margine ruguloso - sulcato, lamellis distinctis emarginato - adnexis, basi venis conjunctis, stipite elongato glabro nitido. *Syn. fung. p. 339. Flor. Dan. t. 1612.*

Agaricus roseus. Bull. Hist. p. 473. t. 162 et 507. Flor. Dan. t. 1675. f. 1. Sowerb. t. 72. A. incarnatus. Relhan.

Frequens autumno in sylvis frondosis, ericetis muscosis, ad terram, inter folia decidua. Color quidem incarnato - roseus, sed etiam albescat. Pileus passim flavescit, etiam applanatus est, in aliis umbonatus. Lamel. faciliter a stipe secedunt, in nonnullis sublineatim decur-

runt. Stipes plerumque albicans, salem pileo
multo dilutior, basi villosus.

Obs. Sequentes, utpote solummodo colo-
re diversi, sed lamellis basi dentato - venosis
convenientes ut subspecies tamen adnotari et
describi merentur.

γ. janthinus, purpurascens expallens, pileo sub-
umbonato, margine striato, lamellis attenu-
to - adnexis, stipite glabro striato. *Fries l. c.*

In muscosis abiegnis, raro. Stipes sursum
attenuatus, basi fibrillosus. Pileus nunquam (?)
convexus, demum expansus, margine fissa.
Lam. venis convexae. *l. c.*

δ. pinitellus, subgregarius minor, pileo conve-
xo - plano carneo - purpurascente, lamellis la-
tis incarnato - griseis, stipite laevi aut sub-
striato purpurascente.

Fere semper sub pinibus habitantem eam
vidi. An idem ac var. *γ.* Stipes longitudine
mediocris, opacus, fragilior. Variat pileo la-
mellisque subcaesus.

ε. fuliginascens, pileo campanulato subumbo-
nato e fuligineo subnigrescente, lamellis al-
bis nitidis, stipite mediocri crassiusculo e fu-
ligineo purpurascente.

Prope Parisios in sylvis rarissime obvenit.
Habitu omnino Ag. *rosei*, sed colore differt
paucioque minor est. Pileus humectatus stra-
tus fit. An lamellae etiam inter se venis conne-
xae sint, in adversariis meis non adnotaveram.

? griseus, minor, pileo planiusculo umbonato griseo, lamellis distinctis connexis (venis connaxis) albis, stipite purpurassente griseo.

Pileus $\frac{1}{2}$ unc. latus. Lamell. 2 lin. latae, dente decurrentes. Stipes 2 unc. altus, vix lin. crassus.

Obs. 2. Ex D. Fries, qui facultatem habuit icones cl. Schumacheri inspicere, etiam varietates A. *rosei*, sunt sequentes; 1. A. *lilacinus*, dilute lilacinus, lamel. rotundatis liberis, stipite subclavato striato. Schum. p. 293. 2. *purpurascens*, sordide purpureus, pileo subcarneo, lamellis adnato-decurrentibus, stipite longo-fibroso sortili. Schum. l. c. 3. *dilutus*, pileo carnoso umbonato violaceo, margine substriato, lamellis latissimis subarcuatim attingentibus concoloribus, stipite utrinque dilatato obscure violaceo. Schum. p. 295. In sylvis locis humidis, in Dania. — Color nimis recedit, et in lamell. venose conjunctae sint, non memontur. Hi fungi ulterius examen omnino mentur.

409. *Zephirus*, *gregarius* *fragilis*, pileo obtuso albo-incarnato, margine striato, lamellis adnatis linearibus albis, stipite striato squamu-losu*s* dilacino. Fries l. c. p. 147. Ej. Obs. 2. p. 16. A. *spinipes*. Sow.

In hortis, alnetis, fagetis ac pinetis, in Suecia, vulgaris, Jul. — Nov. Stipes basi incurva, et lanatus, apice albo-squamulosus.

Lamel. secedentes, saepe venis connexae. Pil. tunc. 1 latus, etiam livido roseus, disco fuscescens. loc. cit. Stipite squamuloso ab A. roseo praeципue differre videtur.

410. *Adonis gregarius*, pileo membranaceo campanulato albido, roseo laevi, lamellis unicialis albido - roseis, stipite elongato laevi glabro arhizo. *Fries Obs. 2. p. 160.* *Ejusd. Syst. 1. p. 152.* (Excl. viridulo.)

A. *Adonis exiguum*, stipite fistuloso nudo, pileo subcampanulato, lamellis angustissimis liberis, nec basi adnexis. *Bull. Hist. d. Champ. p. 445. t. 560. f. 2.*

In sylvis, ad terram, plerumque solitaria. Stipes subaequalis, plerumque nivens, aliquando dilute roseus, aut ferrugineo-lateritius. Lamel. numerosae, angustissimae, non basi aduncae, nec apice latiores, liberae. *Bull.* Lamel. alternae, distantes, uncinato-affixae. *Fr.*

Obs. Differentia adest praesertim in lamellis inter fungum gallicum et sueicum. Ceterum species mixta et dubia videtur, a qua omnino separanda var. *viridis* pileo striato, etc. diversa.

411. *sertulatus*, fasciculatus majusculus, pileo acute conico laevi utrinque roseo, stipite fistuloso aequali luteo. — *Mich. Gen. p. 193 t. 78. f. 3.*

In resectis tabescientibus truncis oritur, in Italia, veris tempore. M. Habitu et magnitudine

dine A. teneri. Plura individua, ultra duode-
na, in fasciculum acervata et e ramo prodeun-
tia icon exhibet.

412. *variegatus*, subgregarius, pileo subcamp-
nulato carnoso subumbonato albido lineolis
vel lituris rubicundis variegatus, lamellis de-
currentibus stipiteque elongato albis. *Syn.*
fung. p. 392.

A. *Tentatula*, exiguus stipite fistuloso, pi-
leo subalbido semiorbiculari lineato, lamellis
curvilineis, basi declivibus. *Bull. L. c.* p. 449.
t. 56b.

In sylvarum locis herbosis. Pileus primo
suborbicularis, demum complanatus, in nonnullis
umbilicatus, in aliis mammosus, lineatus
seu veluti striatus, 2 - 5 lin. latus, carne cras-
siuscula. B.

413. *strobilinus*, coccineus, pileo acute umbo-
nato, margine striato, lamellis adnatis, mar-
gine obscuriore, stipite firmo; basi albo-stri-
goso. *Fries*, p. 150. *Syn. fung.* p. 393.
Consp. fung. p. 197.

Agaricus coccineus. *Sowerb.* t. 197. A. ro-
saceus. *Schum.* p. 291.

In Angliae, Germaniae et Sueciae pinetis
ad strobilos, ramulos et acus, frequentior in fa-
getis umbrosis ex D. Fries. Stipes firmus, so-
lidus, deorsum subincrassatus, lana densa ob-
situs et caudatus. *Consp.*

414. *rosellus*, roseus, pileo obtuse umbonato
Sectio tercia. Q

striato, lamellis adnatis, margine obscuriore, stipite tenui, basi albo - viloso. *Fries l. c.*
Syn. fung. p. 393. Consp. l. c.

In Germaniae et Sueciae pinetis, subhumidis. Pileus 2 lin. latus, campanulatus, papillatus. Lamel. arcuato - adnexae, Stipes filiformis, pallescens, aut secundum Consp. dilute rosellus. $\beta.$ *rhodellus*, gregarius, pileo campanulato obtuso laevigato pallide roseo, lamellis distinctis adnexis dilutioribus, stipite mediocri caudato, pileo concolore.

An huc Ag. fistulosus. *Bull. t. 518. f. P.?*
 Prope Parisios, inter folia arida. Pileus 4 lin. latus, 3 altus, umbone obtuso. Stipes 2 uncifere longus, lin. 1 crassus, cauda pilosa.

415. *phyllologena*, subgregarius, pileo tenerimo campanulato brevi umbonato albido - incarnato, lamellis adnexis angustis albis, stipite mediocri sublivido, basi abrupto.

Aestatis fine in umbrosis ad folia putrescentia (circa Parisios). Fungi juniores livide pururascentes et stipites in minus adultis livido-fuliginei, in exsiccatis fusco-pururascentes; longitudine semiunciales, $\frac{1}{2}$ lin. crassi, aequales. Lamell. lineares, distinctae, non venose convexae, plures integrae. Pileus 4 lin. latus, dein magis expansus, umbone tunc subobsolete, ecarnis, glaber, exsiccatus magis rubescit, sed opacus.

416. *stipularis*, tenellus, pileo convexo laevi,

lamellisque distantibus integris roseis, stipite capillari flavescente. *Fries Syst. p. 160.*

Cresc. in Sueciae nemoribus humidis ad stipulas. Stipes uncialis, subflaccidus, lente pubescens. Pileus demum depresso, 1-2 lin. latus. Lamel. suberectae, latiusculae, plerumque sex. l. c. Solummodo differre videtur ab *Ag. rugato* colore.

417. *filicinus*, pusillus totus roseus, pileo campanulato laevi, lamellis distantibus adnatis subdecurrentibus stipite tenui glabro, basi tumida strigosa. *Tab. XXVIII. fig. 6. (b. len-te aucta.)*

Agaricus filicinus. Sprengel Syst. Veg. 4. p. 438. A. rosellus. Wither. Arrang. p. 237. A. pterigenus. Fries l. c. Ejusd. Obs. 1. p. 43.

Proven. in Suecia et in montibus Vogesorum in Filicum stipibus et inter muscos. Stipes tomento strigoso patulo plerumque insidens. Pileus, ex Fries, dein umbilicatus et lamel. adnato-deurrentes. Species pulchella.

418. *juncicola*, tenellus, pileo convexo (hemisphaeric) striato rufescente, lamellis distantibus albidis integris, stipite capillari fusco. *Fries l. c. Michel. gen. pl. t. 80. f. 9.*

In foliis putridis Junci articulati, gregarius. Stipes glaber, $\frac{1}{2}$ unc. longus. Pileus dein subdepresso, lin. 1 latus. Et hicce fungillus, praeter colorem, ab *A. aciculare Hoffm.* vix differt.

419. *sanguinolentus*, tenuis, pileo striato rubello, lamellis atropurpureo-marginatis, stipite succum rubellum stillante. *Fries*, p. 149.
Consp. fung. p. 196.

In Germania et Suecia, inter Sphagna aliquaque mustos palustres et in locis uidis sylvaticis provenit sparsus. Stipes debilis, 2-4 unc. longus. Lamell. latiusculae, dilute purpurascentes, linea atropurpurea margine pictae. Pileus late campanulatus, ad umbonem usque striatus, subpurpurascens, margine saepius quoque atropurpureo. *Consp.*

* *cruentus*, solitarius, pileo primum conico, dein expanso obtuso rufo-badio, lamellis confertis linearibus albido: margine concolor, stipite succum rubellum stillante. *Fries l. c.*

Terrestris inter fol. abietina. Medius inter antecedentem et sequentem, cuius var. videtur, loco natali praesertim diversa. Stipes sat firmus, 2-3 unc. longus. Pileus 3-4 lin. latus ac altus, margine integerrimo. *Fr.*

420. *Haematopus*, caespitosus submagnus, pileo carnoso - membranaceo ex albido rufescente, lamellis adnexis albido, stipite tenui subrufescente laticem rubrum stillante. *Syn. fung.* p. 379. *Consp. fung.* p. 192. *Fries, l. c.*

In Germania et Suecia ad truncos abietinos et fagineos. Stipes basi strigosus, 2 unc. longus. Lamel. subfimbriatae ex *Syn.* Pileus

hemisphaericus, et secund. Fries etiam albidus, margine saepius dentato. Totus fungus succum crebrum intense purpureum promit. *Consp.*

421. *rubro-marginatus*, pileo obtuso striato rubescente - livido, lamellis adnatis albidis purpureo - marginatis, stipite rigido glabro (exsucco). *Fries l. c. p. 150. Ejusd. Obs. 1.*
p. 42. + (Conf. A. pristoides).

In sylvis abiegnis et in alnetis ad strobilos et ramos non raro, in Suecia. Habitu Ag. *galericulati*. Stipes laevis, saepe incurvus. Pileus campanulatus. Lamel. demum griseae, distantes, dente decurrentes. *l. c.*

* * *Pileo fuscesecente, livido, griseo-cinereo aut colore obscuriore.*

422. *alliaceus*, solitarius terrestris, pileo campanulato fuscescente substriato, lamellis albidis, stipite elongato glauco-nigrescente radicato, basi strigoso. *Syn. fung. p. 375. Obs. Myc. 2. p. 54. Jacq. Flor. Austr. t. 82. Flor. Dan. t. 1251. Fries Syst. 1. p. 140. Consp. p. 190.*

Hab. in Europ. boreali plerumque inter folia faginea, rarius ad ligna et passim in pinetis, aestate et autumno. Stipes rigidus, procerus, pruinato-velutinus, in lignis, si provenit, radicem longam exserit (*Consp.*) Pileus dein planiusculus, subumbonatus, laevis vel obsoletus striatus, tempore humido fuscescens, sicco ex-

pallens, latitudine unciali. Odor fortis, alliaceous.

An lamellae revera liberae sunt, uti profert D. Fries? In specimine exsiccato mihi adnatae apparuerunt.

423. galericulatus, α . *clypeolatus*, caespitosus, pileo campanulato umbonato livido-fuscescente sicco, lamellis uncinatis albis (passim subincarnatis), stipite laevi, basi strigoso caudato. *Syn. fung.* p. 376. *Obs. Mycol.* 2, p. 57. *Schaeff.* t. 52. *Flor. Dan.* t. 1790.

Agaricus campanulatus. *Linn.* *Ag. mamilaris*. *Hoffm. Nomencl. fung.* t. 4. f. 1. *A. pseudo-clypeatus*. *Bolt.* t. 154. *A. fistulosus*. *Bull.* t. 518. f. 2. (var. *communis*).

Ad truncos provenit, caeteris major et umbone satis magno distinctus. Differt ab *A. radicato*, cui, magnitudine minore excepta, non dissimilis, pileo non viscoso, lamellis haud subdecurrentibus et radice strigosa.

B. aestivus, solitarius terrestris, pileo umbonato cinereo-livido dilutiore, lamellis candidis lationibus, stipite breviore subradicato: radice arcuata pilosa. *Obs. Mycol.* 1, p. 9. *Syn. fung.* p. 378.

Aestate jam provenit in pinetis ad terram quidem, sed stipite adhaeret ramulis subjacentibus, terra folisque acerosis tectis; hic 2 ad $2\frac{1}{2}$ unc. longus, 2 - 3 lin. crassus, satis firmus et

laevis. Pileus magis carnosus et latior est quam in var. α , coloreque dilute griseo.

γ . *Senecio*, pileo brevi campanulato obtuse umbonato pruinato - canescente plicato - striato, lamellis subdistantibus albidis, stipite longo radicato pileo concolore. (Rarius in sylvis obvenit.)

δ . *lutescens*, pileo carnoso - membranaceo hemisphaericо vix umbonato sublutescente, lamellis albidis subincarnatis, stipite firme radicato pileo concolore,

Ad terram aut ad latera truncorum satis frequens observatur, medio autumno. Pileus vix striatus, non campanulatus, plerumque obtusus. — An huc forsitan trahendus *Ag. proliferus* Sowerb. t. 169. ? numerosa sobole insignis, et in Anglia, intra terram sabulosam progerminans, repertus.

ε . *vulgatus*, cespitosus minor, pileo campanulato obtuso subumbrino, stipite subaequali.

Agaricus galericulatus, Sowerb. t. 165. (optima.)

Sero autumno ad truncos locis sylvaticis umbrosis. Distinctam forte speciem sistit, cum vix umbonatus sit, et multo minor quam var. α ; sed lamellas easdem habet. Fungilli juniores fere nigricant.

ζ . *Myurus*, stipite elongato toto villoso caudato, pileo campanulato laevi ochraceo-fusco.

Hoffm. Fung. subterr. p. 5. t. 3.

In Hercyniae fodinis columnis ligneis semiputridis gregatim adnasci amat. E compacta, brevi, ac tomentosa radice plures fasciculati et inter se connexi villoque intertexti egrediuntur stipites, teretes, apice nudi, reliqua parte tecti villosa hirsutie, flexuosi et in unum latus inclinant. Pileus dilute fuscus, seu ochraceo-ferrugineus, in carneum tendens, junior cylindricus, adultus conum obtusum admodum dilatatum format; senescens in campanulataam figuram explicatur, umbone hinc inde prominulo. Lamellae prope stipitem decurrunt, colore ex albido levissime carneae. Hoffm. — Certis caracteribus a specie sub diu crescente differt, sed hoc forte a loco alieno dependet.

Obs. Datur adhuc varietas laete ferruginea. Bull. t. 518. f. F. E. magnitudine et forma prioris, a me nondum reperta, et alia tota alba: *A. cucullatus*. Fries Obs. 1. p. 147.; nec non altera stipite radicato flavo-coccineo notabilis *A. epigaeus*. Obs. Mycol. 2. p. 58. Syn. fung. p. 377. Fatendum interea est, plures alias sic dictas varietates a nonnullis auctoribus extra modum supra hanc speciem accumulatas esse, praesertim a Bulliardo, qui non solum diversas species in una tabula (518.) sub nomine *A. fistulosi* conjunxit; sed ut mera synonyma plurimas legitimas species adponere non dubitavit.
 424. *areolarum*, cespitosus numerosus, pileo campanulato fuligineo, umbone subumbilica-

to umbrino, lamellis emarginato-adnexis albis, stipitibus subradicatis cohaerentibus dilute badiis, basi tomentosis.

Inveni singularem hanc speciem in horto quodam, ad latera areolarum lignearum, mense Octobri. Individua numerosissima, fere centena, cespitem efficiebant dense stipatum, odorem fortem exhalantia, saporeque fastidibili distincta. Pro cetero Ag. galericulato non dissimilis, sed lamellarum cohaesio paullo diversa. Stipes leviter striatus, subnitens.

Obs. Fungua Vaillantii (*Botan. t. 12. f. 3. et 4.*) verisimiliter idem fuerit; nam ut propriis ejus verbis utar, dicit *l. c. p. 73.* Il naist aux planches pourries des plates bandes; il en vint jusqu'à 20 ou 30 en un seul paquet. Le pedicule est chatain-foncé par le bas; il soutient un chapeau chatain-clair, tirant sur le roux sur les bords, dont le bout s'enfonce en manière de petit nombril.

425. *rhizogaeus*, terrestris sparsus, pileo campanulato umbonato fuligineo-nigricante: ambitu albo-fuligineo, lamellis niveis, basi oblique emarginato-attenuatis adnexis, stipite elongato aequali albo-fuligineo subcaesioque, radice subfusiformi.

Autumnī initio in sylvis aut ad earum margines in ipsa terra, nec ad truncos aut ramulos dejectos provenit. Stipes 3 unc. longus, lin. 1 fere crassus, basi subfibrillosus, ejusque pars ra-

dicalis, brevi-fusiformis, per materiam viscosam, quam forte exsudat cum terra circumdante ita agglutinatur, ut haec nec aqua separari possit. Pileus 4 lin. altus et latus, leviter striatus.

426. *atro-albus*, pileo laevi nigricante, margine lamellisque liberis albicantibus stipite basi tumido strigoso. *Fries* p. 141. *Bolton* t. 137.

Cresc. in Anglia et Suecia ad terram et ad stipites locis umbrosis, saepe uidis, Aug. — Nov. Solitarius aut gregarius, sat firmus. Stipes 2-3 unc. longus. Pileus obtusus. *Fries*.

β. hyemalis, caespitesus truncigenus serotinus, stipite radicato, basi primo valde tumido, pileo intense nigro, dein versus marginem lido-caeruleo.

Agaricus atro-albus. *Consp. fung.* p. 192. Truncis putridis praesertim abietinis innascitur, locis umbrosis humidis, Novembr. Decembr., unde vitam per hyemem pluviosam producens, etiamnum invenitur Mart. — Aprili. *Consp.* — De lamellis nihil dicitur.

427. *stenopodium*, pileo campanulato umbonato fuscescente, lamellis simpliciter adnatis subangustis, stipite longissimo aequali basi stri-goso brevi caudato.

Agaricus filopes. *Bull.* t. 320. videtur.

Prov. passim ad terram. Stipes fere spithameus, sed vix lin. crassus, apice tamen paulo tenuior, pileo concolor. Pil. 3-4 lin. ad $\frac{1}{2}$ unc.

latus, hemisphaericus aut campanulatus. Lamel.
in fig. Bull. etiam adnatae et versus pilei marginem latiores.

428. *filipes*, *pileo campanulato obtuso striato*
livido-fusco, lamellis liberis ventricosis al-
bis, stipite longo laevi, radice pilosa. Fries
l. c. p. 142. (A. filipes), excl. Syn. Bull. +

Agaricus membranaceus. Hoffm. Nomencl.
fung. p. . t. 6. f. 1. A. pilosus. Batsch. El.
fung. t. . f. 2. ex Fr.

Cresc. ad terram locis humidis sylvarum.
Stipes longus et ultra tenuis, albo-lividus vel
fuscus. Pileus junior conicus, dein campanula-
tus, colore varius $\frac{1}{2}$ unc. fere latior. l. c. La-
mell. ex fig. Hoffmanni prope stipitem multo
latiores, uti lamellis liberis convenit.

429. *uranzius*, *pileo striato obscure violaceo, la-*
mellis uncinatis albis, stipite flaccido laevi
arhizo atro-cyaneo. Fries Obs. 2. p. 156.

Buxb. Cent. IV. t. 8. f. 2.

Inter folia decidua, Aug. Novembr., in
Suecia. Stipes filiformis, aequalis, tenax, era-
dicatus, 2 - 3 unc. longus, junior atro-cyaneus.
Pileus campanulatus, junior atro-cyaneus, dein
violaceus, demum expallens, lilacinus, 3 - 4 lin.
latus. l. c.

430. *polygrammus*, *subgregarius, pileo coni-*
co-campanulato subcinereo, lamellis adnexis
albis, stipite rigido striato-sulcato nitente.
Syn. fung. p. 377. Bull. t. 395. Ejusd. A. fi-

stulosus t. 518. f. h. Sowerb. t. 222. Flor. Dan. t. 1615. f. 1.

Satis communis autumno reperitur ad terram, in sylvis, ubi tum solitarius, tum gregarius crescit. Stipes elongatus, etiam basi incrassatus et strigosus, variat colore argente-caesio, et livido. Pileus firmus, $\frac{1}{2}$ unc. latus, rarissime totus niveus.

431. atro-cyaneus, pileo obtuso stipiteque brevi subpruinatis striatis nigricantibus, margine (pilei) lamellisque subadnexis albidioribus. *Fries p. 147. Batsch. El. Cent. 1. p. 101. t. 18. f. 87.*

A. *Batschii*, solitarius atro-cyaneus, pileo cucullato striato, margine lamellisque dilutioribus, stipite mediocri striato. *Fries Obs. 1. p. 47.*
In graminosis locisque umbrosis ad terram.

"A. atro-albi formam minimam refert. Stipes vix radicatus, aequalis, obscure cyaneo-violascens, 1-2 unc. longus. Lamel. cyaneae, margine albido. Pileus non umbonatus, 3 lin. magnus, dein expallens cinerascit."

432. avenaceus, pileo obtuso fuscescente, lamellis adnatis linearibus candidis, margine fusco, stipite laevi fragili splendente. *Fries T. c. p. 150.*

In Sueciae fagetis, inter fol. decidua. Gregarius, elegans, fragilis. Stipes radicatus, basi fibrillis laxis pilosis, cinereus, triuncialis. Pi-

leuis campanulatus, caesio - lividus leviter striatus, 4-6 lin. altus. *l. c.*

B. vitreus, pileo obtuso lineato - striato fusco - livido, lamellis adnatis linearibus albidis, stipite substriato livido splendente. *Fries p. 140.*

In Sueciae pinetis locis humidis. *Gregarrius*, exsuccus, fragilis. Stipes deorsum fibrilosus. Pileus campanulatus, etiam caesius. Lam distinctae, margine concolore. *Fr.*

433. *plexipes*, pileo umbonato substriato fuligineo, lamellis attenuatis albis, stipite e fibris implexis striato - sericeo livido. *Fries l. c. p. 140.* *Michel. t. 79. f. 8. ex Fr.* *A. inodus.* *Schüm. p. 270.*

In fegetis, circa truncos, locisque graminosis. Stipes vix radicatus, 3 unc. circiter longus, 1-2 lin. crassus. Lamel. ventricosae, fere liberae, etiam glaucescentes. Pileus subrugosus, 1-2 uncialis. *l. c.*

434. *rancidus*, oolidus firmus cinereus, pileo umbonato laevi, lamellis ventricosis cinereis liberis, stipite radicato laevi. *Fries p. 141.*

In Suecia ad truncos, etiam in pinetis vel pratis muscosis, ad terram. Odore farinace recentis. Stipes rigidus, radios fusiformi villosa. Pileus disco carnosus, late et obtuse umbonatus fuligineus, sed mucore peculiariter albus. *Fr.*

435. *alcalinus*, oolidus, pileo obtuso striato cinereo, lamellis adnatis ex albo glaucis, et

pilee laevi aequali firmo, basi villoso. Fries p. 142. Ejusd. Obs. 2. p. 15.

Ad terram et truncos ubique in Suecia. Odore nitroso et sapore ingrato distinguitur; forma A. galericulati, sed tenuior, colore variabilis pilei nigricante, rufo, flavo-livido, pallide, stipite luteus, cinereus, etiam adest var. tenuis, tota albida. Fr.

436. *laevigatus*, subgregarius terrestris, pileo campanulato obtuso laevi albo-cinereo, lamellis toto-adnexis albidis, stipite non radicato basi piloso-fibrilloso. Syn. fung. p. 380.

Agaricus metatus. Fries Syst. 1. p. 144? excl. Syn. Flor. Dan.

In pinetis ad terram, sero autumno. Stipes rigidus, biuncialis, pallens. Lamell. distinctae. Pileus $\frac{1}{2}$ unc. magnus, cinerascens, et in Suecia variat, argillaceus, flavus et incarnato-pallidus.

437. *exasperatus*, fragilis tenerrimus, pileo dein planiusculo fusco-griseo obsolete striato, disco papillis elevatis, lamellis confertis emarginato-adnexis subincarnatis, stipite longo subfarinaceo griseo. †

Rarissime in sylvis ad terram, hucusque semel mihi obvius prope pagum Meudon. Stipes subradicatus, basi strigosus, 4-5 unc. longus, 2 din. crassus. Lamel., ob pileum, subconvexae. Pileus laevis, in adultis planus, disco

obscurior. An forsan *Pratellae* species? e longinquo interea habitu *A. galericulati* est.

438. *amygdalinus*, gregarius, pileo campanulato ruguloso - sulcato sordide gilvo, umbo ne crassiusculo prominente dilute brunneo, lamellis adnexis rectis albidis, stipite medio-cri ligneo - pallido subnitido, basi strigoso.

Prope Parisios, in sylvula Meudon, sub pinibus, sero autumno, inter folia acerosa, ubi plurima individua simul crescunt, sed singulum solitarie. Forma sat grata. Odor peculiaris, ferre ut in Amygdalo amaro, et sapor virosus. Stipes firmulus, $\frac{1}{2}$ unc. longus, $\frac{1}{2}$ - 1 lin. crassus. Lamel. uncinato - adnexae. Pilens conico-campánulatus, basi ultra 4 lin. latus, $\frac{1}{2}$ unc. altus, subnitrans, umbo ipse conspicuus, $1\frac{1}{2}$ lin. altus et latus.

439. *griseus*, sparsus solitarius terrestris, pileo campanulato obtuso obsolete striato, lamellis distinctis uncinato - adnexis albis, stipite aequali abrupte caudato basi fibrilloso.

A. griseus, pileo conico - explanato umbo-nato opaco plicato, stipite elongato, basi affixa fibrilloso. Batsch. El. fung. Cont. 1. p. 87. t. 37. f. 30. ? (icon satis convenit, sed locus naturalis in sylva abiegnā diversus).

Inveni meum fungum in graminosis, terrae aut quisquiliis adnatum, ad latera sylvarum, autumno. Stipes 3 - 4 unc. altus, sed tenuis $\frac{1}{2}$ lin., colore nuna argenteo - albicans, praesertim

a. medio ad apicem nunc subumbritus imprimis deorsum, exsiccando flacidus. Lamel. subangustae. Pileus aequalis, 4.-5 lin. altus et latus.

440. erasus, pileo hemisphaerico griseo-expalente, lamellis emarginatis dente decurrente stipiteque laevi basi compresso dilutioribus.

Fries p. 145.

In Sueciae pinetia junioribus montosis. Stipes junior flocculosus farctus, attenuatus, glaber, albido-cinereus, 3 unc. longus. Lamell. 2 lin. latae, albido-griseae. Pileus junior subinde papillatus, dein explanatus et subdepresso, humidus striatus griseus, siccus laevis, crenosens, uncialis. *Fr.*

441. leptorrhizus, pileo planusculo, circa umbonem subdepresso fuligineo-griseo; umbo parvo subumbriño; lamellis toto-adnexis subventricosis obscure cinereis, stipite elongato laevi caudato-radicato: radice tenuissima.

Rarius ad terram in sylvis provenit. Stipes, una cum radice, 5 unc. longus, lin. 1 $\frac{1}{2}$ orassus. Lamell. subserratae, fuligineo-cinereae, exsiccando margine albescunt. Pileus uno fere latus, junior hemisphaericus, uncialis fetidus. Fungillus satis pulcher, forma pilei et lamel. colore ab *A. galericulata* discrepans.

442. eriorrhizus, subparvus fasciculatus, pileo campanulato, dein hemisphaerico fuscescente, lamel-

lamellis simpliciter affixis dein griseis, stipite aequali tenui radice albo-lanata.

Ad terram inter muscos, stipulis etc. Stipes basi lana alba conjuncti, una cum parte tomentosa 3 - 4 unc. longi, $\frac{1}{2}$.lin. crassi, pileo coecoloris. Lamel. confertae, in pileo marginé latiores. Pileus $\frac{1}{2}$ unc. latius, demum appannatus, exsiccatus fere umbrinus, subfarinaceus.
(Ex specim. sicco.)

442. pruinatus, subgregarius parvulus, pileo campanulato subpapillato toto fere sulcato obscurè umbrino, lamellis distantibus toto adnexis albido, stipite brevi radicato pruina to, pileo coecolor exsucco.

Species pulchella parce crescit, autumno, ad terram, passim in truncis carie emollitis. Pileus 4 lin. ad $\frac{1}{2}$ unc. altus, glaber, sed pruina tenui obtectus, fuligineo-nigricans. Lamel. pro fungi parvitate, crassiusculae, lanceolatae, subfarinoso-glaucæ. Stipes $1\frac{1}{2}$ unc. longus, $\frac{1}{2}$ - 1 lin. crassus. Sulci in pileo tumiduli, etiam bifidi, ad apicem prolongati.

443. galepus, subsolitarius terrestris, pileo campanulato glauco-nigrescente, lamellis subdistantibus adfixis albido-cinerascentibus, stipite succo lacteo scatente. *Syn. fung.* p. 379.
Obs. Mycol. s. p. 56. *Flor. Dan.* t. 1550. f. 2.

In sylvis acerosis et frondosis; inter muscos et graminis. Stipes tenuis, aequalis, obscure cinereus, patulo nigricans; aliquando ultra

Sectio tercia.

R

medium pilis longis obsibus. Lamel. angustae, uncinato-adnexae; albæ; petiæ cinereæ. Pileus pruinatus, var. sordide albæ, apice nigritans, glauco-cinereus, aut totus cinereus; latitudine 4-5 lin. Stipe 4-5 lin. longo tenui, basi villoso subexsucco.

Syn. fung. p. 380.

Agaricus galericulatus, y. Fries p. 144 (excl. *Syn. Michelii*):

Solitarius plerumque crescit, foliis canaliculatis que dejectis arcte adhaeret, villo strigoso. Stipes subfuligineus, satis longus, sed vix lin. etasatus, subrepens, exsuccus aut lactescens, pro tempestate aut loco sicco aut humido. Lamellæ toto, sed non uncinato adnexae. Pileus valde tenuis, brevis, 4-6 lin. latus, campanulato-subhemisphaericus, nunc griseus, nunc albidus, papillæ saepius spadicea, etiam caesius, lamellæ basi subvenosis.

444. *epibryus*, pusillus, pileo campanulato vix umbonato griseo, lamellis uncinato-adnexis stipiteque filiformi basi strigoso albis.

Super trunco muscoso, autumno. Stipes ultra unc. longus, aequalis. Pileus vix 2 lin. latus, opacus, in nonnullis individuis quasi sericeo-fibrillosus.

445. *quisquiliaris*, minutus sparsus, pileo subcampanulato obsolete papillato fuscescente

opaco, lamell. adnatis distinctis latiusculis, stipite sublongo inaequali filiformi lutescente fuscō; pileo 1 - 1 $\frac{1}{2}$ lat. 1 - 1 $\frac{1}{2}$ alt. 1 - 1 $\frac{1}{2}$ diam.

Mascatur in sylvis inter teneros rāmulos dejectos, stipulas, foliaceo., supra quae se tamen erigit stipite sat longo 2 - 3 - 4 unc., sed vix 1 lin. crasso; basi non radicata, villosa-fibrillosa. Pil. lin. 1 - 1 $\frac{1}{2}$ latna, unicolor opace fuscus, passim ad lutescentem mergens. Lamel. parum modo decurrent albido-pallens.

corticola, sparsa mainata fuscescens, pileo hemisphaerico obtuso, sicco striato-pliato, lamellis uncinato-affixis leviter decurrentibus, stipite brevi incurvo glabro. *Syn. fung. op. 394. Fries p. 159. 1830. ed. 1.*

Agaricus corticalis. *Bull. t. 519. f. 1. a. b.*
Schwerby. t. 243. 1830.

Vulgaris ad cortices muscosas arborum vestiarum, autumno et durante h̄yeme. Ad minimas species attinet. Pileus vix plus lin. latitudo aliquando subumbilicatus, plerumque opacofuscus, interdum albido-palleus, et secundum Fries, quod a nemine adnotatum invenio, etiam occurrit, incaeruleatus et cyaneus. Stipes plerumque unc. longus, aequalis.

Obs. In *Conspectu fungorum*, p. 198. historialia hujus specie breviter, sed exacte, enarrata est sequenti modo: Cortices amat vetustos muscosos arborum frondosarum, *Tilie*, *Quercus* etc. quos copiose incolit, sed difficilior in-

dagata. Non enim tantum inter Lichenes et Muscos semidebetescit, sed etiam, postquam inter ipsos imbræ laete viguit, paucis jam horis serenis alapeia marcidæ adeo corrugata immunitur, ut oculum minus attentum facilissime fugiat.

447. *speireus*, pileo planiuscule striato cinerascente, disco fusco densum depresso, lamellis decurrentibus candidis, stipite albido. *Fries*
Obs. Myc. 1. p. 90.

"Ad trunços muscosos Quercos, et Fagi. Affinis Aga galericulato et supino; crescendi modus Ag. corticolæ. Stipes subradicatus, tenax. Lamel. subconnexæ, distantes, ianiores planæ (hinc non uncinatae). Pileus obtusus, junior convexus, 3 lin. latus."

448. *setipes*, pileo convexo striato fusco; lamellis decurrentibus albidis (griseis in ej. Obs.), stipite longo faiformi griseo. *Fries* p. 159. *Ej. Obs. 2. p. 163.*

In umbrosis roridis, inter frutices Rubi Idaei. Paradoxa species, Ag. corticolæ forte proxima. Stipes basi fibrillosus, tenax 3-4 unc. longus. Lamel. valde decurrent. Pileus obtusus, leviter striatus, passim pubescens. *L.*

449. *supinus*, minutus, pileo obtuso striato griseo, lamellis subliberis ventricosis, stipiteque brevi incurvo albis. *Fries* p. 142. +

Agaricus pusillus. *Hoffm. Nomencl. p. 200.*
t. 6. f. 5. Ag. griseus. *Flor. Dan. t. 1551. f. 2.*

Gresc. uti antecedens ad truncos vetustos Fagi inter Lichenes et Muscos. Stipes uncialis, subtenax, secund. Hoffm. fuscocensa. Pileus campanulatus, etiam fuscescens. Hinc solummodo lamellis, ut dicitur, liberis a priore dif- fert.

*** *Colore, praesertim pilei, virescente, pallido, flavescente aut citrino.*

450. *amictus*, *gregarius*, pileo obtuso striato livido - virente, lamellis liberis linearibus cinereis, stipite filiformi villoso - pulverulento, basi glabro. *Fries Syst. 1. p. 141. Hall. Helv. nr. 2394.*

Hab. in sylvis fagineis passim, etiam in pinetis. Stipes longissimus, lividus, radice longa, tortuosa, fere glabra. Lamel. cinereae, margine pallidiores. Pileus elegans, 3 - 6 lin. latus, variat caesius et pruinatus. *loc. cit.*

451. *chloranthus*, pileo obtuso striato viridi, lamellis adnexis albis, stipite laevi glabre virente. *Fries l. c. p. 152. Flor. Dan. t. 1614. f. 2.*

In Sueciae et Daniae nemoribus gramineis, Aug. — Sept. Stipes aequalis uncialis, basi pubescens, eradicatus. Lamel. rotundatae, sedentes, et, ut stipes albido - virentes. Pileus subcucullatus, disco carnosulus, 3 - 4 lin. altus. *Fr.*

452. *viridulus*, pileo campanulato striato virescente, lamel. uncinato - adfixis albis, stipite

pileo cencolore. A. *Adonis* Bull. t. 560. fig.
P. Q. R.

Prov. in Gallia ad ramos putrescentes, nec ad terram. Colore, pileo striato membranaceo, lamellarum forma, nec non loco natali; ab Ag. *Adonis* satis discrepat.

453. *elegans*, pileo campanulato umbonato lividente-flavo, lamellis vilute croceis, latere caesio-purpureis, stipite laevi rigido. Syn. *fung.* p. 391. *Conspect. fung.* p. 196. Fries p. 149.

Hab. in Germaniae et Sueciae pinetis, occurrit quoque in sylvis mixtis, inter folia arida. Stipes pileo subconcolor, biuncialis fere. Lamel. adnatae subcrassae. Pileus obtusus, subrepandus, margine flavicans, striatus, medio lvidus, demum subapplanatus.

Obs. Ex D. Fries. Ag. *foeniculaceus* et *congener*. Schum. Flor. Saelland. p. 287 et 288. idem fungi essent; interea, praeter colorum diversitatem, inter se differunt praesertim in stipe, qui in illo utrumque subincrassatus est, superne pallidus, inferne fusco-umbrinus pilisque strigosis aurantiis cinctus; in hoc subbrevis est, superne fusco-umbrinus, inferne flaves- cens ac tomento flavo-ferrugineo vestitus. Odore foeniculaceo convenient. (Schum.)

454. *cimmerius*, pileo substriato flavo-fusco, lamellis adnexis ventricosis croceis: margine

pallido, stipite flaccido, basi fibrilloso. Fries
l. c. p. 150.

Prov. in Sueciae fagetis. Magis gracilis est quam praecedens. Lamellae latiores et margine albo distinctae. Pileus subhemisphaericus, minor. Stipes 3 unc. longus. l. c.

455. *epipterygius*, subgregarius, pileo campanulato membranaceo obtuso laevi aut ruguloso subviscoso caesio-cinereo, lamellis distantibus uncinatis ut plurimum albicantibus, stipite flavo viscoso. Syn. fung. p. 382. Fries; p. 155. Sowerb. t. 92. (A. nutans).

Non est rarus autumno pluvioso, ad ramos, stipites, quoque ad terram in sylvaticis, etiam ex Fries in pratis crescit. Stipes 3-4 unc. longus, ultra lin. crassus, aliquando vix viscosus, basi fibrillosus. Lamel. distinctae, albae, etiam caesiae et subincarnatae. Pileus junior stipitem dentatim arcte cingit, demum dentibus evanescentibus, margine sulcatus, $\frac{1}{3}$ - $\frac{2}{3}$ unc. lat. colore var. flavo, rufo, cinereo.

Obs. Agaricus flavipes. Schaeff. t. 31. Syn. fung. l. c. mera antecedentis aut sequentis var. videtur.

456. *lineatus*, sparsus terrestris, pileo campanulato lineato opaco sicco griseo-flavescente, lamellis crassis distantibus albidis, stipe brevissimo subtenace lutescente. — Bull. t. 522.

Hab. ad terram inter muscos et tenuia gra-

miná. Stipes subnitens, fistulosus, unc. 1½ longus, ½ lin. crassus. Lamel. totae adnexae, passim venose conjunctae, cum tinctura rosea, rarissime eas margine subnigricantes vidi. Pileus 4 lin. latus, 3 altus, etiam flavus.

457. *luteo-albus*, pileo umbonato striato stipiteque tenui luteis, lamellis adnatis albi.

Fries p. 152. Bolt. t. 38. f. 1.

In Anglia et Suecia in pinetis inter muscos. Stipes filiformis, subflexuosus, 1-2 unc. longus. Lam. latae distinctae. Pileus acute campanulatus, 3-4 lin. magnus.

458. *citrinellus*, gregarius minutus, pileo papillato striato stipiteque brevi subviscosa citrinis, lamellis uncinatis albis. *Fries, l. c. Syn fung. p. 384. Ic. et Descr. fung. p. . t. 11. f. 3. Flor. Dan. t. 1614. f. 1.*

In pinetis ad terram, passim ad strobilos. Stipes basi fibrillosus, unc. 1 longus. Pileus hemisphaericus, subumbonatus, 2-3 lin. latus.

459. *ochraceus*, gregarius major, pileo tenui campanulato sublaevi dilute ochraceo, lamellis distantibus adnexis stipiteque albis.

A. *pumilus*, fragillimus, stipite fistuloso molli, pileo aquoso sulphureo nec striato, lamellis niveis falcatis liberis. *Bull. Hist. d. Champ. p. 452-453. t. 563. f. 3.*

Crescit pura haec species, sero autumno, aut ad basin arborum locis excavatis cariosis praesertim Ulmi, aut ad truncos muscosos; ob

diversum hunc locum stipes longitudine parum differt: in speciminiibus terrestribus enim non nunquam ad 3 unc. elongatas, sed in truncigenis, aere libero expositis, plus minusve uncialis; glaber, sed basi fibrillosus, cavus. Pileus ecarnis, valde fragilis, subpapillatus, acute campanulatus, magnitudine a loco variat, a 3 lin. usque ad 5 - 6: margine tunc saepius inciso, recens laevis, sed in exsiccatis sulcatus est.

β3 rhizeus, solitarius, pileo conico-campanula-
lato umbonato laete ochraceo, lamellis toto
adnexis albis stipite mediocri concolore, ra-
dice fusiformi.

In trunco putrido semel inventus, in quo
radice fusiformi penetrat. Lamel. lineares, an-
gustae. Stipes cum radice 3 - 4 unc. longus. Pi-
leus valde fragilis $\frac{1}{2}$ unc. fere latus.

Obs. *A. galericulatum* ob formam tantum
refert, cum sequente colore convenit; hinc du-
bius adhuc est.

460. hypnicola, pileo hemisphaerico subpapil-
lato dilute ochraceo vel subcitrino, lamellis
adnexis stipiteque filiformi albis.

Autumno ad margines sylvarum, locis um-
brosis inter *Hypnum purum*, praecipue adest.
Stipes $1\frac{1}{2}$ unc. longus, aequalis, vix $\frac{1}{2}$ lin. cras-
sus, basi villoso-fibrillosus, sed non caudatus,
exsiccatus pallescens, subnitens. Pileus $1\frac{1}{2}$ a lin.
latus, ecarnis, recens fere laevis, exsiccatus

subtiliter striatus, usque ad ejus apicem, striis non prominentibus.

**** Colore albo.

461. *muscigenus*, tenellus albus, pileo hemisphaerico laevi, lamellis adnatis subconfertis linearibus, stipite setaceo flaccido. Fries p.

143. Schum. Saell. p. 307.

Ad truncos muscosos. Aug. — Novembr. solitarius aut gregarius. Stipes subradicalis, uncialis. Pileus primo globosus, demum convexo-planus, 1 lin. latus.

462. *naematopus*, solitarius aut gregarius candidus, pileo campanulato papyraceo sulcato ruguloso, lamellis distinctis crassiusculis, stipite longo filiformi, deorsum subvilloso.

In foliis siccis. Pileus natura est secca, valde tenuis, 2-3 lin. latus, e contrario, lamellae satis crassae, adscendent. Stipes ultra unc. longus, filo vix crassior.

463. *terrenus*, parvulus totus candidus, pileo campanulato laeviusculo papillato, lamellis distinctis latiusculis toto-adnexis, stipite brevi.

Ad terram nudam rarissime. Stipes unc. 1 longus, $\frac{1}{2}$ lin. crassus. Lamel. adscendentes, lin. 1 fere latae. Pileus vix striatus, glaber, 2-3 lin. latus. An vera Mycena?

464. *Hoffmanni*, candidus, pileo conico-campanulato papilla fuscescente notato, lamellis

convexis liberis, stipite sublongo aequali glabro.

A. papillatus, stipitatus albus, papilla fuscocrescente notatus, lamellis convexis, stipite filiformi concolore. Hoffm. Nomencl. fung. p. 217. t. 3. f. 2.

Ad stipulas, in fol. putrescentibus inter muscos, Octobr. Pileus striatus, margine inflexo, subtiliter denticulato. Lamel. latiusculae, distinctae, liberae, prope stipitem convexae; *H.* — Sequente, ex icone, major, ac papilla distincta versicolore, nec non loco natali, certis ab hoc differre videtur, etiam lamel., ex b. autore, liberae.

465. *lacteus*, totus albus, pileo campanulato obtuse striato, stipite sublongo basi hirsuto.

Syn. fung. p. 394. Consp. fung. p. 198.

Cresc. in pinetis ad terram, foliis acerosis, vel ramulis affixus. Lamel. adnatae, adscendunt. Var. pileo obsolete *papillato* (Ag. β. *pithyus* Syn. l.c.), de quo autores Consp. fung. dicunt: Stipes 1-2 unc. longus, gracilis, basi radiculis albis sericeis densis in orbem fere radiatis, expansis acibus adhaerens.

β? *flavescens*, pileo subumbonato albo-flavescente, lamellis adfixis distinctis, stipiteque subrigido laevi albis. Fries, p. 152. (*A. lacteus.*) Exclus. synonymis.

In ericetis ad terram, etiam in pinetis Seneiae occurrit. Gregarius, varius, in ericetis a-

rhizus, in pinetis et inter folia putrescentia, subradicatus. Pileus dein expansus 3-7 lin. latus. Lamel. secedentes liberae. Stipes 1 $\frac{1}{2}$ -3 unc. longus, lin. vix crassus. l. c.

466. *carneolus*, solitarius, pileo campanulato fragili ruguloso ex albido subincarnato, lamellis distinctis albis, stipite subtenui villosulo pileo concolore.

In sylvis rariis, inter folia sicca, sub quibus stipes basi incurvatus, etiam ultra medium fere villo denso, sed tenui obiectus, longitudine fere 3 unc., sed filiformis. Pileus valde fragilis, junior apice fuscescens, 2-3 lin. altus.

467. *leucopilus*, sparsus subsolitarius majusculus, pileo campanulato - subtereti umbonato albo, lamellis uncinato - adnexis, stipite sublongo basi strigoso. — Mich. gen. t. 73. f. 5.?

In sylvis frondosis ad ramulos dejectos Octobr. Forma sat grata distinctus, totus albus, color tamen in pileo cum tinctura fuliginea mixtus. Stipes 3 unc. longus, ultra dimidiatis lin. crassus, basi radicante crassiore. Lamel. sublatae. Pileus 4 lin. ad $\frac{1}{2}$ unc. longus, 3-4 lin. latus, tenuis, sulcatus, obtuse, sed fere obsolete, umbonatus.

468. *albo-caesius*, gregarius pusillus, pileo hemisphaericō laevi pallide caesio, lamellis distantibus arcuato - adnexis subdecurrentibus, stipiteque tenui, sicco fragillimo albis.

In pratis, inter graminea ad foeniseum destinata. Stipes 1*½* unc. longus, $\frac{1}{2}$ lin. aut plus crassus. Lamel. subangustae, deinceps subdecurrentes. Pileus opacus, nonnunquam obsoleto papillatus, humectatus etiam leviter viscosus, lacteo-caesius, 3 lin. magnus.

469. *vulgaris*, gregarius pusillus, pileo demum subumbilicato papillato subviscoso cinerascente, lamellis uncinatis albidis, stipite viscoso crassiusculo. *Syn. fung. p. 394.*
Ic. pict. fung. 4. p. 47. t. 19. f. 3. consp. fung. p. 198. *Fries p. 156.*

In Europae borealis pinetis ad terram, autumno pluvioso. Stipes etiam cinerascens, basi strigosus, 1*½* unc. longus, 1-2 lin. crassus. Pileus primo convexus, demum planus, medio subdepressus, humidus subviscosus, albo-griseus, passim subrufescens, 1 unc. latus.

470. *rорidus*, solitarius, pileo campanulato dein umbilicato, lamellis decurrentibus candidis, stipite tenui flaccido glutinoso. *Fries Syn. p. 156. Ej. Obs. 1: p. 84 et 85.*

In Sveciae pinetis, locis praecipue umbrosis roridis, fol., ramulis et surculis diversatum plantarum adhaestens, vere, et autumno. Totas candidas. Stipes capillaris, uncialis, glutine denso obtectus. Pileus sublaevis, siccus, junior subosticis, 2-3 lin. latus. *L. c. p. 471.* *torquatus*, albus, pileo obtuso plicato glabro, lamellis collario adnatis venose con-

...tis, stipite longo capillari fuscescente. Schumach. Saelland. p. 268. Flor. Dan. t. 1670.

In fol. dejectis fagineis. Pileus $\frac{1}{2}$ lin. latns. Stipes 1 $\frac{1}{2}$ unc. fere longus, apice subdilatatus. Schum.

Obs. A. D. Fries sequens fungillus huc trahitur, qui potius var. sequentis videtur:

** *acicularis*, pileo hemisphaerico albo, lamel- lis paucis latiusculis, stipite setaceo albido- griseo. Hoffm. Nomencl. fung. p. 225. t. 5.*

Cresc. autumno supra folia putrescentia, praesertim faginea, et magis ad eorum nervos provenit, quam in reliquis partibus.

***** *ANDROSACEUS*. *Pileo sicco-membranaceo, passim carnosulo, sublaevi. Stipite gracili subcorneo, fuso-nigricante.*

477. epiphyllus, gregarius albicans, pileo con- vexo, demum subumbilicato; lamellis sim- plicibus integris ramosisque, stipite filiforme, fuscescente. Syn. fung. p. 469. Fries Syst. p. 139.

Agaricus umbellifer. Bolt. t. 39. A. Squamu- lula. Batsch. p. 92. t. 17. f. 84. (mala). So- werbi. t. 93. (parva-rudis). Merulius Squamu- lis. Wither. p. 151.

Adnascitur fol., praesertim fagineis, rati- quercinis, passim in pericarpis exsiccatis Fag- adest. Stipes, praesertim junior, albidus et vil- losulus; etiam in adultis aliquando albus, in-

non

nonnullis spadiceus. Lamel. subdecurrunt, distantes. Pileus parum irregularis, aliquando papillatus, 1 - 2 lin. latus.

Obs. A. Mucor. Batsch. t. c. f. 82. Fries p. 155. hujus, aut sequentis, speciei statum, ni fallor, nascentem offert, cum ejus stipitem, in individuis nondum evolutis, basi torulo cinctum observavi.

B. epixylus, gregarius, pileo orbiculari albo, lamellis paucis, apice divaricato-ramosis, stipe elongato dilute fuscescente, basi subtumido.

Agaricus rugatus. *Flor. Dan.* t. 1194. f. 1.[?]
A. lacteus. *Bull.* t. 601. f. 2. non valde differt.

Innascitur ramulis dejectis in sylvis, non equidem rarus. Stipes 1½ unc. longus, filiformis, sed satis firmus, glaber. Lamellae numero 8 - 12, angustae, valde distantes, apice plerumque divisae. Pileus lin. 1 aut magis latus, paullo crassior, quam in epiphylo et vix deprimitur.

478. *androsaceus*, gregarius, pileo convexo laevi albido-fuscescente, lamellis adnatis simplicibus dimidiatisque, stipe glaberrimo elongato demum spadiceo.

Agaricus epiphyllus. *Bull. Hist. d. Champ.* p. 543. t. 569. f. 2. *Flor. Dan.* t. 1552. *Bolt.* t. 32.

In Europae regionibus, magis caldioribus, frequentius provenit, sed praeamat folia arborescentia.

S

rum frondosarum, tamen in Suecia, quoad observationes D. Friesii, etiam occurrit in fol. Pinii *sylvestris* et Juniperi, et in ipso cortice variarum arborum. His in locis, ubi communis est, jam appareat media aestate in fol. queruginis, sed autumno paullo sero vix amplius reperitur.

Stipes flacidus, filiformis, omnino glaber, subnitens brunneus, sed nunquam niger a me repertus, uti alicubi indicates. Sed saepius divisus, decumbens et sterilis observatur, et hoc in statu Ceratonemati Hippotrichod. Myc. p. 49. non male refert. Habitu, pro caetero, cum A. epiphylo convenit, a quo lamellis simplicibus differt.

479. *perforans*, pileo planiusculo ruguloso pallidente, lamellis confertis adnatis simplicibus dimidiatisque, stipite pubescente nigricante. — Hoffm. Nomencl. p. 215. t. 4. f. 2. Fries p. 138.

Agaricus androsaceus plurium auctorum Schaeff. t. 239. Sowerb. t. 94. Syn. fung. p. 468. Forte et ipsius Linnæi, nam in Flor. Suec. p. 440. dicitur: frequens in fol. Pinii habitat, stipite nigro, etc. Quidquid sit, hic solummodo in fol. Pinii *Abietis* crescere dicitur.

Antecedente paullo major est, et pileo magis carnosus ac ruguloso differt. Stipes rigidus, aequalis, deorsum pubescens, nigro-badius, apice dilutior. Odor subingratus.

* *Splachnoïdes*, pileo submembranaceo convexo striatulo, lamellisque adnatis simplicibus albis, stipite elongato glabro roseo - rubro. *Flor. Dan. t. 1678. f. 1.*

In foliis Pini *Abietis*, in Dania repertus.
Stipes setiformis. Pileus subumbilicatus.

480. *stipitarius*, pileo planiusculo umbilicato albido, lamellis leviter adnexis, stipite subfistuloso fibrilloso spadiceo. *Fries. p. 138. †*

In Scania campestri circa radices Salicum, etiam in aggeribus ad stipulas putrescentes. Gregarius et subcaespitosus. Stipes tenax, 1 - 2 unc. longus, vix lin. crassus. Lamellae albae, secedente - liberae. Pileus 4 - 5 lin. latus, sublente squamuoso - velutinus. *Fr.*

481. *Rotula*, gregarius et caespitosus, pileo hemisphaericō umbilicato sulcate, lamellis collario adnexis, stipite glabro nigrescente. *Syn. fung. p. 467. Sowerb. t. 95.*

Meralius collariatuſ. *Wither. Agaricus nigripes. Flor. Dan. t. 1134. f. 1. A. Androsaceus. Bolt. t. 569. f. 3.*

Autumno frequens tam in foliis, quam in ramulis aridis et in truncis offenditur. Antecedentibus major, sed praesertim lamellis omnibus aequalibus basi unitis, et a stipite distantibus facile dignoscitur. Stipes non raro prelirus observatur, vid. *Sowerb. is. cit.*

482. *venosus*, major, pileo convexo - plano umbilicato subumbriño, lamellis annulato - ad-

nexis subglaucis pallidioribus, stipite pruina-
to - velutino spadiceo. *Syn. fung.* p. 467.
Icon. pict. Fasc. 4. p. 46.

Merulius foetidus. *Sowerb.* t. 21. A. fo-
tidus. *Fries.*

Hab. in Germania, Anglia et Suecia ad ra-
mos et in truncis caesis. Stipes plerumque com-
pressus, $1\frac{1}{2}$ unc. altus, lin. 1 crassus, cornutus.
Lamel. collarium non ita distinctum exhibit
ut in antecedente. Pileus submembranaceus, te-
nax, ad apicem usque striato - venosus, unc. 1
magnus, campanulatus. Odor ingratus.

483. *Hudsoni*, sparsus epiphyllus, pileo con-
vexo albido - rufescente, pilis strictis subni-
grentibus horrido, lamellis distantibus al-
bis, plerumque integris, stipite nitente - ba-
dio sparsim piloso et glabro. *Syn. fung.*
p. 390.

Agaricus pilosus. *Huds. Flor. Engl.* p. 621.
Sowerb. t. 164. *Decand. Flor. Gall.* 2. p. 164.

Prov. in Anglia et Gallia, sero autumno in
fol. deciduis Ilicis Aquifolii. *A. epiphylo* paul-
lo major et stipes multo longior est. Setulae
in pileo aciculaeformi longae et strictae.

* *setosus*, gregarius minutus epiphyllus, pileo
hemisphaericō obtuso fuscescente glabro, sti-
pite longo filiformi undique pilis patulis di-
stantibus hirto. — *Sowerb.* t. 302.

Huc usque in Anglia rarius repertus supra

fol. Fagi sylvat. Stipes uncialis, pileo concolor. Pileus aciculaeformis. Ex ic.

***** *Galeozus*. *Pileo membranaceo-carnoso*, laevi aut striato. *Stipite fistuloso aut cavo*, glabro vel pruinato-fibrilloso. *Color plerumque lucescens, rubiginosus*. *Fungilli muscophili*, aut in graminosis crescentes. (Galera. Fr.)

484. *Hypnorum*, tener totus ochraceo-ferrugineus, pileo campanulato-sulcato, lamellis latiusculis distantibus, stipite flexili, apice pruinoso. *Syn. fung. p. 385. Batsch. El. fung. p. 117. t. . f. 96. Michel. Gen. pl. t. 80. f. 8.*

Agaricus campanulatus. Schaeff. t. 63. A. melinoides. Bull. t. 560. ad partem.

Aestatis fine et toto autumno, in sylvaticis apertis Hypnis humentibus immersus nascitur. Parvus, valde fragilis. Stipes $1\frac{1}{2}$ longus, pileo, 3-4 lin. lato, dilutior.

Obs. Sequentes iisdem in locis, sed magis uliginosis orientes, caracterès diagnosticos non satis distinctos offerunt, ut tanquam species propriae haberri possint.

1) *bryophilus*, pileo obtuse umbonato, lamelisque cinnamomeis, stipite longo fibrilloso pallescente. *Syn. l. c.*

Stipes subtenax. Lamel. ventricosae. Pil. $\frac{1}{2}$ unc. latus.

1) *Sphagnorum*, pileo hemisphaerico papillato ochraceo-pallido, lamellis latis aquose pallidis, stipite longo subtenace lutescente. *Syn. l. c.*

In paludosis montosis. Ceteris major. Stipes 3 unc. longus. Pil. obtusus, $\frac{1}{2}$ unc. latus. Lamel. demum subincarnatae fiunt.

2) *rubiginosus*, pileo sulcato campanulato, imbellisque ferrugineis, stipite longo rubigino-so subtenace. *Syn. fung. p. 385.*

4) *aquatalis*, pileo convexo-plano aquose melleo, lamellis latis pallidis stipite elongato glabro stricto concolore. *Fries Syst. 1. p. 267.*

5) *atrorufus*, totus astro-rufescens, lamellis paucis. *Michel, gen. p. 167. t. 75. f. 8. — Vernalis in Italiae sylvis crescit.*

6) *acicularis*, minutus aurantio-lutescens, pileo campanulato acute umbonato. *Schaeff. t. 222. Sowerb. f. 282.*

Muscis terrestribus adnascitur. Stipes $1\frac{1}{2}$ unc. longus, $\frac{1}{2}$ lin. crassus glaber. Pileus 2-3 lin. latus, $1\frac{1}{2}$ altus. A ceteris satis discedit.

485. *stagninus*, pileo hemisphaerico obtuso ferrugineo-badio-expallente, ambitu squamoso, lamellis decurrentibus, stipite longo, rubiginoso. *Fries l. c. p. 268.*

In Sueciae paludosis sylvaticis. Stipes aequalis, 4 unc. longus, basi villosus, relatus ex

autore Lamel. triquetrae, pilei colore. Pileus siccus, laevis, subochraceus, 3-6 lin.

* *bulbillus*, pileo hemisphaerico subumbonato viscido, lamellis latissimis repandis subdescurrentibus, stipite subbulboso: bulbo nigrescente. Schum. Sælt. p. 233. A: brunneus.

In Daniae paludibus turfosis. Distincta forsitan species, fungilli tenelli rarius bulbosi sunt. Stipes $2\frac{1}{2}$ unc. longus. Pileus unc. i latus, obsolete striatus. Schum.

486. *temulentus*, pileo convexo substriato ferrugineo, lamel. adnatis umbrinis, stipite tenace undulato, basi fibrilloso. Fries p. 263.

In Sueciae humidis sylvarum. Stipes ex albido ferruginascens. Pileus disco subcarnosus, siccus laevis ochraceus, fere uncialis. Lamell. primo ferrugineae. — Species vix hujus divisionis est; an *Pratella*, uti sequens?

lateritius, pileo quato-tereti striato incarnato lateritio, lamellis obscurioribus, stipite elongato albo-villoso rigido. Fries p. 265. Battar. p. 59. t. 28. f. F.

In humidis herbosisque Italiae locis. Pendunculus carnosus et cavus, albo-villosus. Pileus glandiformis subsulcatus, unc. i altus. Color carneus, seu lateritius B.

487. *tener*, pileo submembranaceo campanulato-copico laevi expallescente, lamellis confertis dilute cinnamomeis, stipite longo ae-

... quali. *Syn. fung.* p. 386. Schaeff. t. 77. Sowerb. t. 33.

Prov. locis praesertim graminosis, rarius in sylvia. Stipes tenuis, fragilis, subpulverulentus, ultra 2 unc. longus, vix lin. crassus. Lamel. liberae, pulverulentae. Pileus mollis, 3 - 4 linearis, margine subuplicatus. Color subferruginascens, aut pallidus.

B? *phaeotrichus*, solitarius, pileo subcarnoso conico rubiginoso, lamellis attingentibus (liberis?) concoloribus, stipite filiformi subradicato, inferne pilis longis fuscis obsito. Schum. p. 282. Ag. pilosus.

Inter folia putrida sylvarum Danicarum. Stipes fibrosus, intus fucus, 3½ unc. longus, 1 lin. crassus. Pileus ferme ½ unc. latus et altus, umbrino - cinnamomeus. Sch. Species distincta?

488. *pilosellus*, tener subferrugineus, pileo comito - campanulato subpiloso, lamellis latiusculis, stipite sublongo pubescente. *Syn. p. 387.*

In Germania rarius ad truncos putrescentes nascitur, quo jam differt ab *A. tenero*. Stipes tenuis, unc. 1 longus. Pileus obtusus, nec umbonatus, 3 lin. altus, 2 latus.

489. *melinoides*, subgregarius, pileo carnosulo orbiculari umbonato helvolo, lamellis totadicnis subventricosis, colore melleis, stipite subelongato cavo pallido.

Provenit pulchella hæc species in viis graminosis, roridis, autumno. Stipes $1\frac{1}{2}$, ramis aunc. longus, diametram lin. crassus, basi stipite villosa. Lamel., praecipue juniores, laete cinnamomeae-melleae nitidae et parum decurrent. Pileus 3 passim 4 lin. latus, primo campanulatus, obtuse umbonatus, passim papillatus.

490. *sparteus*, pileo campanulato obtuso laevi subcinnamomeo, lamellis adnatis, postice latioribus, stipiteque glabro pallidis. *Iries* p. 266.

In campis graminosis, in Suecia. Stipes laevis, $1\frac{1}{2}$ unc. longus. Pileus submembranaceus, laevis, expallens, 3 lin. latus, 5 altus. A priore, pileo non umbonato, lamel. colore et forma specificie distinctus videtur.

***** *CLADOPUS*. *Pileo subcarnoso. Stipite aequaliter ramoso-racemoso, ramulis (lateralibus) pileo abortiente terminatis.*

491. *Aueri*, pileo membranaceo umbonato subtomentoso sordide flavo, lamellis flavis, stipite ramoso-racemoso tenui. *Nees in Nov. Act. Soc. Nat. Curios.* p. 250. t. 6. f. 19.


Hab. in foliis quercinis semiputridis in Pannonia, prope Erlau et Ofen. *Dr. Sadler.*

Stipes sulcatus, pallide flavidus, supra basin in ramos aliquot elongatos divisus, qui omnes ramulis simplicibus alternis, rarius oppositis, fere ubique obsiti sunt; singulus capitulo tri-

gono & orbiculari solidō, colore fusco, terminatus. Rami vero principales pileos proferunt submembranaceos, umbonatos; & līn. latoe. Lamell. latiusculae, lutescentes (adfixae?) N. 492. *racemosus*, pileo membranaceo papillato griseo, lamellis albis, stipite simplici racemoso. *Syn. fung.* p. 389. *Disp. meth. fung.* p. 15. t. 3. f. 8. *Sowerby* t. 987.

In Germania et in Anglia Sclerotio lacunoso inhabitat singularis haec species, racemum Rubis aliquando simulans. Ramuli stipitis laterales capitulis hyalinis seu pileolis, sine dubio, non explicatis, terminati. Pileus terminalis & līn. est latus;

Tab. XXIII.



P. Dumeuil pinx.

I. Sturm sc.

Tab. XXXV.



P. Dumont pinx.

I. Sturm sc.


Tab. XXV.



J. Dumcoul pinx.

J. Sturm sc.

Tab. XXV.



P. Dumeïil pinx.

L. Sturm sc.


Digitized by Google



P. Diuncui pinae.

I. Sturm sc.


Tab. XXVIII.



P. Duménil pinx.


I. Sturm sc.

Tab. XXX.



I. Sturm sc.

Tab. XXX.



L. Sturm sc.

